


---

# Geometría en Olimpiadas de Matemáticas

---



por

---

**Jesús Jerónimo Castro**

---

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Ingeniería

*2018*



---

# **Geometría en Olimpiadas de Matemáticas**

---

**Jesús Jerónimo Castro**

**Jesús Jerónimo Castro**  
Facultad de Ingeniería,  
Universidad Autónoma de Querétaro.

# Introducción

---

Geometría Euclidiana es un tópico que se ha desarrollado desde hace algunos miles de años. Varias culturas en la antigüedad ya habían descubierto hechos geométricos interesantes y la Geometría gozaba de cierto prestigio entre las diferentes ramas de matemáticas conocidas. La mayor parte de los resultados que conocemos se deben a algunos matemáticos griegos. Era de esperarse que una rama de las Matemáticas que ha prevalecido por más de dos mil años sea considerada como parte importante de las competencias de Matemáticas. Esta afirmación es tan cierta que es una tradición que en la mayoría de los exámenes de Olimpiadas de Matemáticas dos de los seis problemas pertenezcan a la Geometría. México no es la excepción, de hecho se podría afirmar que el nivel de dificultad que se maneja en los problemas de las competencias mexicanas es alto y muy seguido se resuelven tales problemas, por parte de los estudiantes, de una manera elegante y creativa.

Hace más de 20 años, cuando inicié mi trabajo como entrenador de los estudiantes bajacalifornianos, surgió la inquietud de desarrollar un material de entrenamiento para Geometría que se apegara al nivel del estudiante que tradicionalmente se interesaba en participar en la Olimpiada Estatal de Baja California. El reto de escribir unas pequeñas notas que pudieran llevar de la mano a los estudiantes hasta el punto de resolver ciertos problemas de manera natural, fué muy grande y ambicioso. Al poco tiempo de iniciar este proyecto logré elaborar unas notas de unas 20 páginas donde hablaba principalmente de los ángulos en circunferencias y la semejanza de triángulos. Sin embargo, al ir experimentando con las notas y observar las deficiencias que claramente estas poseían (y que probablemente

siguen teniendo), fuí incrementando la cantidad de temas, agregando problemas y reorganizando temas y problemas. En muchas ocasiones, cambié la explicación de algunos temas varias veces, hasta llegar a una forma de exponerlos de manera que satisfacía la curiosidad de la mayoría de los estudiantes que las utilizaban. La experimentación, al igual que la escritura de las notas, me llevó un poco más de 15 años. Estas notas las he utilizado para entrenar desde selecciones estatales hasta selecciones nacionales para los diversos certámenes en los que México participa.

Por supuesto que las notas no son mágicas ni dan resultados positivos sin que se invierta una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, mi consejo de cómo utilizarlas es el siguiente:

Si sólo sabes de Geometría lo que has visto en los cursos de Secundaria, entonces debes iniciar con el tema de ángulos entre paralelas, ángulos en circunferencias y el Teorema de Tales. Trata de resolver la mayoría de los problemas de estas tres secciones. Después, estudia la parte que habla de triángulos semejantes y no te preocupes si no logras resolver todos los problemas de esta sección, cuando des la segunda vuelta a este tema quizá logres resolver los problemas que te faltaron. Después, estudia la parte del Teorema de Pitágoras y el tema de cuadriláteros cíclicos. Para la mayoría de las etapas estatales de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, con esto podrás defenderte bien.

Continuando con la preparación para el concurso nacional (de la OMM) estudia los temas: Potencia de un Punto, el Teorema de Ptolomeo, Áreas de triángulos y cuadriláteros y todos los del Capítulo 2. Muchos de los problemas que hasta ahora han aparecido en el concurso nacional, se resuelven con las ideas de los Capítulos 1 y 2, sin embargo, si quieres sentirte más seguro estudia los temas del Capítulo 3. Con esto ya tendrás la experiencia necesaria para resolver casi cualquier problema de Geometría del Concurso Nacional, de la Olimpiada Iberoamericana y la mayoría de los problemas de la Olimpiada Internacional.

Los temas del Capítulo 4 se pueden estudiar de manera independiente a los temas de los capítulos anteriores.

Es mi deseo, que estas notas puedan ser de utilidad para toda aquélla persona que quiera aprender a resolver problemas geométricos típicos en una Olimpiada de Matemáticas.

# Notación básica

---

La siguiente notación será utilizada:

$\triangle ABC$	el triángulo de vértices $A$ , $B$ y $C$
$ ABC $	área del triángulo $\triangle ABC$
$ ABCD $	área del cuadrilátero $ABCD$
$\overline{AB}$	el segmento de extremos $A$ y $B$
$AB$	la línea por los puntos $A$ y $B$
$AB$	la longitud del segmento $AB$
$\angle A$	ángulo de vértice $A$
$\angle BAC$	ángulo formado por $BA$ y $CA$
$\widehat{AB}$	el arco de $A$ a $B$
$m_A$	la mediana desde el vértice $A$





---

# Contenido

---

<b>Introducción</b>	<b>iii</b>
<b>Notación básica</b>	<b>v</b>
<b>1. Conceptos y teoremas básicos</b>	<b>1</b>
1.1. Ángulos entre paralelas. . . . .	1
1.1.1. Problemas . . . . .	4
1.2. Ángulos en circunferencias . . . . .	5
1.2.1. Problemas . . . . .	11
1.3. El Teorema de Tales . . . . .	13
1.3.1. Problemas . . . . .	18
1.4. Triángulos semejantes . . . . .	20
1.4.1. Problemas . . . . .	30

---

1.5. Teorema de Pitágoras . . . . .	33
1.5.1. Problemas . . . . .	38
1.6. Cuadriláteros cíclicos. . . . .	42
1.6.1. Problemas . . . . .	49
1.7. Teorema de Ptolomeo . . . . .	54
1.7.1. Problemas . . . . .	57
1.8. Potencia de un punto con respecto a una circunferencia . . . . .	59
1.8.1. Problemas . . . . .	67
1.9. Areas de triángulos y cuadriláteros . . . . .	71
1.9.1. Problemas . . . . .	80
<b>2. Puntos y rectas notables en el triángulo</b>	<b>85</b>
2.1. Las medianas y el gravicentro . . . . .	85
2.1.1. Problemas . . . . .	88
2.2. Las bisectrices y el incentro . . . . .	90
2.2.1. Problemas . . . . .	94
2.3. Las alturas y el ortocentro . . . . .	98
2.3.1. Problemas . . . . .	101
2.4. Las mediatrices y el circuncentro . . . . .	102
2.4.1. Problemas . . . . .	105
2.5. Circunferencias exinscritas . . . . .	106

---

2.5.1. Problemas . . . . .	112
<b>3. Temas selectos de Geometría</b>	<b>115</b>
3.1. Teoremas de Ceva y Menelao . . . . .	115
3.1.1. Problemas . . . . .	120
3.2. Teoremas de Euler y Simson . . . . .	122
3.2.1. Línea de Simson . . . . .	122
3.2.2. Línea de Euler . . . . .	123
3.2.3. Circunferencia de los nueve puntos . . . . .	124
3.2.4. Problemas . . . . .	125
3.3. Las simedianas . . . . .	126
3.3.1. Problemas . . . . .	131
3.4. Polígonos circunscritos a una circunferencia . . . . .	134
3.4.1. Problemas . . . . .	140
<b>4. Algunas estrategias en Geometría</b>	<b>143</b>
4.1. Prolongar segmentos . . . . .	144
4.1.1. Problemas . . . . .	148
4.2. Trazar perpendiculares y paralelas . . . . .	151
4.2.1. Problemas . . . . .	155
4.3. Trazar tangentes y cuerdas comunes . . . . .	158
4.3.1. Problemas . . . . .	162

4.4. Construir un ángulo . . . . .	165
4.4.1. Problemas . . . . .	169
4.5. Circunferencias auxiliares . . . . .	170
4.5.1. Problemas . . . . .	174
<b>5. Sugerencias para los problemas propuestos</b>	<b>177</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>209</b>
<b>Índice</b>	<b>209</b>

---


# Capítulo 1

## Conceptos y teoremas básicos

---

### 1.1. Ángulos entre paralelas.

Consideremos un par de *líneas paralelas*  $l$  y  $m$  en el plano. Ahora, supongamos que una línea corta a  $l$  y  $m$  y observemos los ángulos que ésta forma con ellas. Los ángulos mantienen las siguientes relaciones:




(a)  $\angle 1 = \angle 2$  y se llaman ángulos *opuestos por el vértice*,

- (b)  $\angle 1 = \angle 3$  y se llaman ángulos *alternos internos*,
- (c)  $\angle 1 = \angle 4$  y se llaman ángulos *correspondientes*,
- (d)  $\angle 2 = \angle 4$  y se llaman ángulos *alternos externos*.

Además, tenemos que  $\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$  y decimos que  $\angle 4$  y  $\angle 5$  son *suplementarios*. Aprovechando estas relaciones de ángulos podemos demostrar (justificar mediante argumentos válidos) el siguiente teorema básico:


**Teorema 1.1.1** *La suma de los ángulos internos de un triángulo es  $180^\circ$ .*

*Demostración.* Se traza un línea  $\ell$ , paralela a  $BC$ , por el vértice  $A$ . De esta manera obtenemos las igualdades de ángulos marcados en la figura. Como sabemos que un ángulo llano mide  $180^\circ$ , tenemos que  $\alpha + \theta + \beta = 180^\circ$ .  $\square$




Ahora veremos algunas aplicaciones de este teorema.


**Ejemplo 1.1.1** *En el triángulo  $\triangle ABC$ ,  $\angle CAB + \angle ABC = 110^\circ$ , y  $D$  es un punto sobre el segmento  $AB$  tal que  $CD = CB$  y  $\angle DCA = 10^\circ$ . Calcula el valor del ángulo  $\angle CAB$ .*




*Solución.* La suma de los ángulos interiores del triángulo  $\triangle ABC$  es  $180^\circ$ . Como  $\angle A + \angle B = 110^\circ$ , entonces  $\angle BCA$  debe ser  $70^\circ$ . Si  $\angle DCA = 10^\circ$ ,  $\angle BCD = 70^\circ - 10^\circ = 60^\circ$ . Además, el triángulo  $\triangle BCD$  es isósceles, con  $CD = CB$ , de modo que  $\angle DBC = \angle CDB$ . Ahora, la suma de los ángulos interiores del triángulo  $BCD$  es  $180^\circ$ , de donde  $\angle DBC = \angle CDB = 60^\circ$ . Por último, en el triángulo  $\triangle ACD$ , el ángulo exterior  $\angle CDB$  es la suma de los ángulos interiores opuestos  $\angle A$  y  $\angle DCA$ . Por lo tanto,  $\angle A = \angle CDB - \angle DCA = 60^\circ - 10^\circ = 50^\circ$ .



**Ejemplo 1.1.2** En la siguiente figura, ¿cuánto vale la suma de los ángulos  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  y  $e$ ?




*Solución.* Considerando el triángulo  $\triangle ABC$  obtenemos que  $a + c + f + g + d = 180^\circ$ , pero de los triángulos  $\triangle BCD$  y  $\triangle FED$  obtenemos que  $f + g = b + e$ . Por lo tanto,  $a + b + c + d + e = 180^\circ$ .




### 1.1.1. Problemas


**Problema 1.1** Encuentra cuánto vale el ángulo exterior  $\theta$  en la siguiente figura si son conocidos los ángulos  $\alpha = 62^\circ$  y  $\beta = 71^\circ$ .



**Problema 1.2** Encuentra cuánto vale el ángulo  $x$  en la siguiente figura.




**Problema 1.3** En la figura, los triángulos  $\triangle PAB$  y  $\triangle PCD$  son idénticos. Si el ángulo  $\angle APC = 67^\circ$  y el ángulo  $\angle CPD = 38^\circ$ , ¿cuánto mide el ángulo  $\angle BPC$ ?





**Problema 1.4** El trapecio isósceles  $ABCD$  es tal que  $AD = AB = BC = 1$  y  $DC = 2$ , donde  $AB$  es paralelo a  $DC$ . ¿Cuánto mide el ángulo  $\angle CAD$ ?



**Problema 1.5** Encuentra cuánto vale la suma de los ángulos internos de un polígono convexo<sup>1</sup> de  $n$  vértices.

## 1.2. Ángulos en circunferencias


Dado un ángulo y una circunferencia, podemos hacer una equivalencia entre el valor de este ángulo y los arcos que interseca sobre la circunferencia. La forma de calcular el valor del ángulo dependerá del lugar donde se encuentre el vértice y de la forma en que sus lados intersecten la circunferencia. Veamos cada uno de ellos y la manera de calcularlos:

**Definición 1.2.1** Un ángulo central es el que tiene su vértice en el centro de un círculo y su valor es equivalente al arco que interseca medido en radianes<sup>2</sup>, es decir  $\alpha = \widehat{AB}$ .<sup>3</sup>


<sup>1</sup>Una figura se dice que es convexa, si para cualesquiera dos puntos en ella, el segmento que los une está totalmente contenido en la figura.

<sup>2</sup>Un radián es la medida de un ángulo central que interseca un arco que tiene longitud igual a un radio de la circunferencia.


<sup>3</sup>Con  $\widehat{XY}$  denotamos al arco de la circunferencia entre los puntos  $X$  y  $Y$ .



**Definición 1.2.2** Un ángulo inscrito es el que tiene su vértice sobre la circunferencia y los lados que lo forman son cuerdas de la circunferencia. Su valor es equivalente a la mitad del arco que interseca, es decir  $\alpha = \widehat{AB}/2$ .




**Definición 1.2.3** Un ángulo semi-inscrito es el que tiene su vértice sobre la circunferencia y está formado por una línea tangente y una secante. Su valor es equivalente a la mitad del arco que interseca, es decir  $\alpha = \widehat{AB}/2$ .




**Teorema 1.2.1** El valor de un ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central que interseca el mismo arco.

*Demostración.* Probaremos esto para el caso cuando uno de los lados del ángulo coincide con un diámetro:



En la figura anterior, sean  $CB$  un diámetro,  $\angle ACB = \alpha$  (ángulo inscrito) y  $\angle AOB = \beta$  (ángulo central). Debemos probar que  $\alpha = \frac{\beta}{2}$ . Observemos que tanto  $OA$  como  $OC$  son radios de la circunferencia, entonces el triángulo  $\triangle AOC$  es isósceles, esto es  $\angle ACO = \angle CAO = \alpha$ . Sabemos que  $\beta = \angle AOB = \angle ACO + \angle CAO = \alpha + \alpha$ , por lo tanto  $\beta = 2\alpha$ .  $\square$

Ahora, faltaría demostrar lo anterior para los casos mostrados en las siguientes figuras. Esto puede hacerse fácilmente utilizando el caso que ya hemos probado, pero esto se deja como ejercicio.



Sin embargo, el vértice de un ángulo no siempre está en alguna de las posiciones antes mencionadas, por lo que debemos encontrar una forma de calcular la medida de un ángulo cuyo vértice esté dentro o fuera del círculo en cuestión.


**Teorema 1.2.2** *La magnitud del ángulo entre dos líneas que se cortan dentro de un círculo es equivalente a la semisuma de los arcos que cortan dichas líneas. Es decir*

$$\alpha = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}.$$

*Demostración.* Trazamos el segmento  $CB$  y de esta manera obtenemos el triángulo-

lo  $\triangle PCB$ . Como  $\alpha = \beta + \theta$  tenemos

$$\alpha = \frac{\widehat{AB}}{2} + \frac{\widehat{CD}}{2} = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}. \quad \square$$




**Teorema 1.2.3** La magnitud del ángulo entre dos líneas que se cortan fuera de un círculo es igual a la semidiferencia de los arcos que cortan dichas líneas. Es decir

$$\alpha = \frac{\widehat{AB} - \widehat{CD}}{2}.$$

*Demostración.* Se traza el segmento  $DB$ , formándose así el triángulo  $\triangle PDB$ . Como  $\theta = \alpha + \beta$ , tenemos que  $\alpha = \theta - \beta$ , entonces


$$\alpha = \frac{\widehat{AB}}{2} - \frac{\widehat{CD}}{2} = \frac{\widehat{AB} - \widehat{CD}}{2}. \quad \square$$



Ahora, veremos algunos ejemplos en los que se mostrará la utilidad de los teoremas anteriores.


**Ejemplo 1.2.1** Demuestra que el radio trazado hacia el punto de tangencia es perpendicular a la tangente.

*Demostración.* Sea  $A$  un punto sobre la circunferencia  $\Gamma$  y  $OA$  el radio trazado hacia éste. Por el punto  $A$  trazamos la recta  $\ell$  perpendicular a  $OA$ . Claramente  $\ell$  es tangente a  $\Gamma$ . En caso contrario, supongamos que  $\ell$  interseca a  $\Gamma$ , además de en  $A$ , en otro punto  $B$ . Como  $OB$  también es radio, tenemos que el triángulo  $\triangle OAB$  es isósceles, de lo cual tenemos que  $\angle ABO = \angle BAO = 90^\circ$ . Claramente esto es una contradicción, ya que entonces la suma de los ángulos del triángulo  $\triangle OAB$  sería mayor que  $180^\circ$ . Por lo tanto, la recta  $\ell$  es tangente a la circunferencia en el punto  $A$ .  $\square$



**Observación 1.2.1** Este problema pudo haberse resuelto fácilmente si prolongamos el radio hasta convertirlo en un diámetro de la circunferencia y después usamos que la medida de un ángulo semi-inscrito es equivalente a la mitad del arco que interseca. Sin embargo, la idea usada en la demostración que se muestra, tiene utilidad en muchos problemas de geometría.


**Ejemplo 1.2.2** Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ . Se traza una recta  $l$  que corta a  $C_1$  en  $C$  y  $D$ , y a  $C_2$  en  $M$  y  $N$ , de tal manera que  $A$  y  $B$  quedan en distintos lados de  $l$ . Demuestra que  $\angle CAN + \angle MBD = 180^\circ$ .



*Demostración.* Una recomendación muy útil cuando tenemos dos circunferencias que se cortan en dos puntos es *trazar la cuerda común*. Trazamos entonces  $AB$ . Tenemos que  $\angle ABD = \angle ACD = \alpha$ , ya que ambos son ángulos inscritos en  $C_1$  los cuales intersecan el arco  $\widehat{AD}$ . De la misma manera,  $\angle ABM = \angle ANM = \beta$ , ya que ambos son ángulos inscritos en  $C_2$ . Por otro lado, si hacemos  $\angle CAN = \theta$ , en el triángulo  $\triangle ACN$  tenemos que  $\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$ .  $\square$

**Ejemplo 1.2.3** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero el cual tiene sus cuatro vértices sobre una circunferencia. Las líneas  $AB$  y  $DC$  se intersecan en un punto  $Q$  y las líneas  $DA$  y  $CB$  se intersecan en un punto  $P$ . Demuestra que las líneas que bisectan los ángulos  $\angle DPC$  y  $\angle AQD$  son mutuamente perpendiculares.

*Demostración.* Sea  $H$  el punto de intersección de las dos bisectrices mencionadas. Sean  $Y$  y  $X$  los puntos donde la bisectriz del  $\angle AQD$  interseca a la circunferencia y sean  $E$  y  $F$  los puntos donde esta bisectriz interseca a los lados  $AD$  y  $BC$ . Probar que  $\angle PHQ = 90^\circ$  es equivalente a probar que el triángulo  $\triangle PEF$  es isósceles. Para probar esto utilizaremos una técnica que resulta muy útil al resolver problemas y a la cual denominaremos *ir hacia atrás*. La idea es suponer válido el resultado que queremos demostrar e ir observando que otros resultados también serían válidos. Se hace esto hasta que lleguemos a un resultado el cual sea fácil de demostrar o sea conocido por nosotros de alguna manera. Una vez hecho esto tratamos de regresarnos siguiendo los pasos en orden inverso. Aplicando esta técnica al problema tenemos lo siguiente:



$\triangle PEF$  isósceles  $\implies \angle PEF = \angle PFE \implies \widehat{DY} + \widehat{AB} + \widehat{BX} = \widehat{YA} + \widehat{AB} + \widehat{XC}$   
 $\implies \widehat{DY} + \widehat{BX} = \widehat{YA} + \widehat{XC} \implies \widehat{DY} - \widehat{XC} = \widehat{YA} - \widehat{BX}$ . Esto último es cierto debido a que  $QY$  es la bisectriz del ángulo  $\angle AQD$ . El regreso se lleva a cabo sin dificultad alguna en este caso.  $\square$


### 1.2.1. Problemas

**Problema 1.6** Demuestra que dos líneas paralelas cualesquiera que intersecan una circunferencia, cortan arcos iguales entre ellas. ¿Qué sucede cuándo una de las líneas es tangente a la circunferencia?

**Problema 1.7** Demuestra que el valor de un ángulo semi-inscrito es igual al valor de un ángulo inscrito que intersecte el mismo arco.

**Problema 1.8** Una circunferencia ha sido dividida arbitrariamente en cuatro partes y los puntos medios de los arcos obtenidos se han unido con segmentos de rectas. Demuestra que entre estos segmentos dos serán perpendiculares entre sí.

**Problema 1.9** En la siguiente figura  $PA$  y  $PB$  son tangentes a la circunferencia. Demuestra que  $PA = PB$ .




**Problema 1.10** Dos circunferencias son tangentes exteriormente en un punto  $A$ .  $BC$  es una tangente común externa. Demuestra que  $\angle BAC = 90^\circ$ .

**Problema 1.11** Uno de los lados de un triángulo inscrito en una circunferencia coincide con un diámetro. Demuestra que el triángulo es un triángulo rectángulo.

**Problema 1.12** Demuestra que la razón entre la longitud del lado de un triángulo y el seno del ángulo opuesto es igual al diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo.<sup>4</sup>

**Problema 1.13** Sea  $P$  un punto en el interior de un cuadrado  $ABCD$  de manera que  $\triangle ABP$  es equilátero. Demuestra que  $\angle PCD = 15^\circ$ .

**Problema 1.14** Dos circunferencias se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$  como se muestra en la figura. Se escoge un punto arbitrario  $C$  en la primer circunferencia y se trazan los rayos  $CA$  y  $CB$ , los cuales intersecan la segunda circunferencia de nuevo en los puntos  $D$  y  $E$ , respectivamente. Demuestra que la longitud del segmento  $DE$  no depende de la elección del punto  $C$ .




**Problema 1.15** Dos circunferencias de centros  $O_1$  y  $O_2$  se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ , como se muestra en la figura. La línea  $CD$  es tangente a ambas circunferencias. Demuestra que

$$\angle CAD = \frac{1}{2} \angle O_1 A O_2.$$

<sup>4</sup>Con esto hemos probado que  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ , la cual es conocida como la Ley de Senos.





**Problema 1.16** Sea  $E$  un punto sobre una circunferencia de diámetro  $AB$ . Por los puntos  $B$  y  $E$  se trazan las líneas tangentes  $t_1$  y  $t_2$ , respectivamente. Las líneas  $t_1$  y  $t_2$  se cortan en un punto  $M$ . Sea  $C$  el punto de intersección entre las líneas  $AE$  y  $t_1$ . Demuestra que  $M$  es el punto medio de  $BC$ .


**Problema 1.17** Dos circunferencias son tangentes internamente en un punto  $M$ . Una recta arbitraria es tangente a la circunferencia interior en un punto  $P$  y corta a la circunferencia exterior en  $Q$  y  $R$ . Demuestra que  $\angle QMP = \angle RMP$ .

### 1.3. El Teorema de Tales

El teorema que presentaremos en esta sección se debe al matemático griego Tales de la ciudad de Mileto. Lo que este teorema establece, es útil entre otras cosas, para justificar los criterios de semejanza y congruencia los cuales se verán en la sección siguiente. El teorema es el siguiente:

**Teorema 1.3.1** Si una línea transversal corta a tres paralelas y los segmentos que quedan entre éstas se dividen en la razón  $m : n$ , entonces cualquier otra transversal que corte a estas paralelas también quedará dividida en la razón  $m : n$ .

Por ejemplo, sean  $p, q, r$ , tres rectas paralelas. Si una línea  $\ell$  corta a las rectas en los puntos  $A, B$  y  $C$ , de manera tal que  $AB : BC = 2 : 1$ , y otra línea  $t$  corta a las rectas paralelas en  $D, E$  y  $F$ , también se cumple que  $DE : EF = 2 : 1$ .




*Demostración.* Tomando en cuenta la figura anterior, debemos demostrar que

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}.$$

Para esto utilizaremos que el área de un triángulo se puede obtener mediante el semi-producto de dos lados por el seno del ángulo comprendido entre éstos (lo cual es fácil de demostrar). Tenemos entonces que

$$\frac{|ABE|}{|BCF|} = \frac{\frac{BE \cdot AB \cdot \sin \alpha}{2}}{\frac{CF \cdot BC \cdot \sin \alpha}{2}},$$

donde  $\alpha = \angle ABE = \angle BCF$ .




Análogamente tenemos que


$$\frac{|DEB|}{|EFC|} = \frac{\frac{BE \cdot DE \cdot \sin \beta}{2}}{\frac{FC \cdot EF \cdot \sin \beta}{2}},$$

donde  $\beta = \angle DEB = \angle EFC$ . Como  $\angle ABE = \angle DEB$  y  $\angle BCF = \angle EFC$  tenemos que  $\frac{|\angle ABE|}{|\angle BCF|} = \frac{|\angle DEB|}{|\angle EFC|}$  lo cual implica que  $\frac{BE \cdot AB}{CF \cdot BC} = \frac{BE \cdot ED}{CF \cdot EF}$ . Se sigue que  $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ .  $\square$

El recíproco del teorema de Tales es válido cuando es aplicado a dos segmentos que comparten un extremo. Por ejemplo, si dos segmentos  $AB$  y  $AC$  comparten un vértice  $A$ , el segmento que une los puntos medios de éstos es paralelo al segmento que une los otros dos extremos. Es decir, sean  $D$  y  $E$  los puntos medios de  $AB$  y  $AC$ , respectivamente; como  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ , entonces por el recíproco del Teorema de Tales tenemos que  $DE$  es paralelo a  $BC$ .



Sin embargo, debemos tener cuidado cuando los segmentos no comparten un extremo. Por ejemplo, en la siguiente figura  $D$  y  $E$  son los puntos medios de  $A'B$  y  $AC$ , respectivamente, y sin embargo  $DE$  no es paralelo ni a  $BC$  ni a  $A'A$ .



Antes de demostrar el recíproco del Teorema de Tales, mostraremos un resultado que es bastante útil.

**Lema 1.3.1** Dado un segmento  $AB$  y una número positivo  $\lambda$ , existe un único punto  $C$  en el segmento  $AB$  el cual cumple que

$$\frac{AC}{CB} = \lambda.$$


*Demostración.* Supongamos que existe un par de puntos distintos  $C$  y  $C'$  en el interior del segmento  $AB$  los cuales lo dividen en la razón  $\lambda$ . Tenemos dos posibles casos:

- (1)  $C'$  está en el interior del segmento  $AC$ . Tenemos que  $\frac{AC}{CB} = \frac{AC'+C'C}{C'B-C'C} \neq \frac{AC'}{C'B}$ . Pero recordemos que ambos cocientes son iguales a  $\lambda$ , por lo que la única posibilidad es que  $C' = C$ .
- (2)  $C'$  está en el interior del segmento  $CB$ . Este caso se resuelve de manera análoga al anterior.

Por lo tanto, concluimos que existe un único punto que divide al segmento  $AB$  en la razón  $\lambda$ .  $\square$

**Nota.** El lema sigue siendo válido cuando consideramos números  $\lambda < 0$ , sólo que en este caso el punto  $C$  estará en el exterior del segmento  $AB$ , pero sobre la línea  $AB$ .

**Teorema 1.3.2** Recíproco del Teorema de Tales. Sean  $D$  y  $E$  puntos sobre los lados  $AB$  y  $AC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  de manera que  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ . Entonces el segmento  $DE$  es paralelo a  $BC$ .



*Demostración.* Supongamos que  $DE$  no es paralelo a  $BC$ . Sea  $E'$  el punto en  $AC$  tal que  $DE' \parallel BC$ . Por el Teorema de Tales tenemos que

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C},$$

se sigue entonces que


$$\frac{AE'}{E'C} = \frac{AE}{EC}.$$

Por el lema anterior, tenemos que  $E' = E$ , por lo tanto,  $DE \parallel BC$ .  $\square$

Un cuadrilátero en el que cada par de lados opuestos son paralelos se llama *paralelogramo*.

**Ejemplo 1.3.1** Teorema de Varignon. Sea  $ABCD$  un cuadrilátero y sean  $F$ ,  $G$ ,  $H$  e  $I$  los puntos medios de los lados  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  y  $DA$ , respectivamente. Entonces el cuadrilátero  $FGHI$  es un paralelogramo.

*Demostración.* Tracemos la diagonal  $BD$ . Como  $F$  e  $I$  son los puntos medios de  $AB$  y  $AD$ , respectivamente, tenemos que  $FI$  es paralelo a  $BD$ ; también, como  $G$  y  $H$  son los puntos medios de  $BC$  y  $CD$ , respectivamente, entonces  $GH$  es paralelo a  $BD$ . De aquí tenemos que  $FI$  es paralelo a  $GH$ . Análogamente, podemos demostrar que  $FG$  es paralelo a  $IH$ . Como el cuadrilátero  $FGHI$  tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos, entonces es un paralelogramo.  $\square$




Observemos que en ningún momento de la demostración se usa que el cuadrilátero sea convexo, esto sucede porque el resultado sigue siendo válido aún para cuadriláteros que no son convexos. La prueba sigue exactamente las mismas líneas. Otra observación importante es la siguiente: *en todo paralelogramo los lados opuestos tienen la misma longitud*. Para ver esto, hacemos lo siguiente. Sea  $ABCD$  un paralelogramo dado, entonces observemos que  $|ABC| = |ABD|$  ya que ambos comparten la base  $AB$  y sus alturas hacia ese lado tienen la misma longitud. Si hacemos  $\angle DAB = \alpha$  entonces tenemos que  $\angle CBA = 180^\circ - \alpha$ , de aquí se sigue que

$$\frac{AD \cdot AB \cdot \operatorname{sen} \alpha}{2} = |ABD| = |ABC| = \frac{BC \cdot AB \cdot \operatorname{sen}(180^\circ - \alpha)}{2}$$

y como  $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$ , obtenemos que  $AD = BC$ . De manera análoga se demuestra que  $AB = DC$ .


**Ejemplo 1.3.2** En la siguiente figura,  $BE$  y  $AD$  son alturas del  $\triangle ABC$  las cuales se intersectan en un punto  $H$ . Sean  $F$ ,  $G$  y  $K$  los puntos medios de los segmentos  $AH$ ,  $AB$  y  $BC$ , respectivamente. Demuestra que  $\angle FGK$  es un ángulo recto.



*Demostración.* Dado que  $G$  es el punto medio de  $AB$  y  $F$  el punto medio de  $AH$ , por el Teorema de Tales tenemos que  $GF$  es paralelo a  $BH$ . Análogamente, se prueba que  $GK$  es paralelo a  $AC$ . Por otro lado, como el ángulo entre  $BH$  y  $AC$  es  $90^\circ$ , también tenemos que el ángulo entre  $GF$  y  $GK$  es  $90^\circ$ .  $\square$

### 1.3.1. Problemas

**Problema 1.18** En la siguiente figura los segmentos  $a$ ,  $b$ ,  $c$  y  $d$  son paralelos y dividen al lado  $BC$  en 4 segmentos iguales. Si  $a = 10$ , encuentra la suma  $a + b + c + d$ .



**Problema 1.19** Sea  $ABCD$  un paralelogramo y sean  $L$  y  $M$  los puntos medios de  $AB$  y  $CD$ , respectivamente. Demuestra que los segmentos  $LC$  y  $AM$  dividen la diagonal  $BD$  en tres segmentos iguales.

**Problema 1.20** Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de los lados  $BC$  y  $CD$  de un cuadrilátero convexo  $ABCD$ . Los segmentos  $AM$  y  $AN$  intersecan a  $BD$  en los puntos  $X$  y  $Y$ , respectivamente. Demuestra que si  $BX = XY = YD$  entonces  $ABCD$  es un paralelogramo.

**Problema 1.21** Sea  $AM$  una mediana del triángulo  $\triangle ABC$ , es decir  $M$  es el punto medio del lado  $BC$ . Sobre el segmento  $AM$  se considera el punto  $P$  de manera que  $AP = 2 \cdot PM$ . La línea  $BP$  interseca al lado  $AC$  en el punto  $Q$ . Demuestra que  $AQ = QC$ .

**Problema 1.22** Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de los lados  $AB$  y  $AC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $MN = \frac{1}{2}BC$ .

**Problema 1.23** Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de los lados  $AD$  y  $BC$  de un trapecio  $ABCD$  en el cual  $AB$  es paralelo a  $DC$ . Demuestra que  $MN = \frac{AB+DC}{2}$ .

**Problema 1.24** Demuestra que las diagonales en un paralelogramo se cortan en su punto medio.

**Problema 1.25** Sea  $AM$  la mediana trazada hacia el lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Prolongamos  $AM$  más allá del punto  $M$  y tomamos un punto  $N$  de tal manera que  $AN$  es el doble de  $AM$ . Demuestra que el cuadrilátero  $ABNC$  es un paralelogramo.


**Problema 1.26** Demuestra que el segmento de línea, que une los puntos medios de dos lados opuestos de un cuadrilátero, bisecta el segmento de línea que une los puntos medios de las diagonales.

## 1.4. Triángulos semejantes


En esta sección analizaremos el concepto de *semejanza* de triángulos.

**Definición 1.4.1** *Se dice que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma (aunque no necesariamente el mismo tamaño), es decir, si tienen sus tres ángulos correspondientes iguales y sus lados proporcionales.*

Cuando estamos resolviendo problemas, no siempre sabemos que dos triángulos tienen sus tres ángulos correspondientes iguales y sus lados proporcionales. Sin embargo, en ocasiones la cantidad de información que tenemos es suficiente para concluir que los triángulos son semejantes. Esto es lo que se conoce como *criterios de semejanza*. El primer criterio de semejanza que veremos es el conocido como *aaa*, es decir, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales. Para ver esto, demostraremos que si se tiene la igualdad de ángulos correspondientes entonces los lados del triángulo son proporcionales. Sean  $\triangle ABC$  y  $\triangle A'B'C'$  los triángulos en cuestión.




Si nosotros movemos el triángulo  $\triangle ABC$  hasta que el vértice  $A$  coincida con el vértice  $A'$ , y además lo hacemos de tal manera que el lado  $AB$  quede exactamente encima del lado  $A'B'$ , tendremos la siguiente figura:





Aquí podemos observar que los lados  $BC$  y  $B'C'$  son paralelos, y de manera inversa, si nosotros trazamos una línea paralela a uno de los lados de un triángulo de manera que ésta corte a los dos lados restantes, entonces esta línea paralela determinará un triángulo con sus tres ángulos iguales a los del triángulo original.




Utilizando lo anterior y el teorema de Tales , tenemos la siguiente proporción:

$$\frac{BM}{MA} = \frac{CN}{NA},$$

sumando 1 en ambos lados tenemos

$$\frac{BM}{MA} + 1 = \frac{CN}{NA} + 1 \implies \frac{BM + MA}{MA} = \frac{CN + NA}{NA} \implies \frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}.$$

Si trazamos una paralela a  $AB$  la cual pase por el punto  $N$ , obtenemos el paralelogramo  $MNPB$ :



Utilizando nuevamente el teorema de Tales tenemos que

$$\frac{CP}{PB} = \frac{CN}{NA}.$$

Nuevamente sumamos 1 en ambos lados y obtenemos que

$$\frac{CB}{PB} = \frac{CA}{NA},$$

pero como  $PB = NM$  tenemos que

$$\frac{BC}{MN} = \frac{AC}{AN}.$$

Juntando los resultados anteriores tenemos que

$$\frac{AB}{AM} = \frac{BC}{MN} = \frac{AC}{AN},$$

es decir, los lados son proporcionales. Por lo tanto, los triángulos son semejantes.

Probaremos ahora el recíproco de este enunciado (el cual es conocido como el criterio de semejanza  $\ell\ell\ell$ ), es decir, probaremos que si dos triángulos tienen sus tres lados respectivos proporcionales, entonces son semejantes. Para esto, consideremos que los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle DEF$  tienen sus lados proporcionales, es decir, que se cumple que

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF} = \lambda.$$


Sin pérdida de generalidad, supongamos que  $\lambda > 1$ . Coloquemos el triángulo  $\triangle DEF$  de manera que el vértice  $D$  coincida con el vértice  $A$  y que el lado  $DE$  esté sobre el lado  $AB$ . Si tenemos que  $\angle EDF = \angle BAC$ , entonces por el Teorema de Tales tenemos que  $EF$  es paralelo a  $BC$  y por tanto, el triángulo  $\triangle DEF$  tiene sus ángulos iguales a los del triángulo  $\triangle ABC$ , se sigue entonces por el criterio  $aaa$  que los triángulos son semejantes. Aquí es importante mencionar que hasta este punto hemos demostrado el criterio de semejanza  $\ell a \ell$ , es decir, dos triángulos serán semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre dichos lados igual.

Supongamos ahora que  $\angle EDF \neq \angle BAC$ . Sea  $F'$  el punto donde la paralela a  $BC$  por  $E$  interseca al lado  $AC$ ; como sabemos que  $\triangle DEF' \sim \triangle ABC$  entonces se cumple que

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF'} = \frac{BC}{EF'}.$$

De aquí se obtiene que  $EF' = EF$  y que  $DF' = DF$ , es decir, los triángulos  $\triangle EF'F$  y  $\triangle DF'F$  son isósceles. Si trazamos las alturas de estos triángulos desde los vértices  $E$  y  $D$  sobre el segmento  $F'F$ , tenemos que ambas caen sobre el punto medio de  $F'F$ , pero entonces tenemos dos líneas perpendiculares a

$F'F$  las cuales son distintas. Esto es claramente una contradicción, por lo tanto  $F' = F$  y  $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ .



Resumiendo, los criterios de semejanza son los siguientes:

**Criterios de semejanza.** Dos triángulos son semejantes si:

1. sus ángulos correspondientes son iguales (*criterio aaa*),
2. sus tres lados son proporcionales (*criterio lll*),
3. dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre éstos es igual (*criterio lal*).


Si además de ser semejantes, un par de triángulos tienen sus lados correspondientes del mismo tamaño entonces se dice que son *congruentes*. Para saber si dos triángulos dados son congruentes, se tienen los siguientes criterios:

**Criterios de congruencia.** Dos triángulos son congruentes si:

1. sus tres lados correspondientes son iguales (*criterio lll*),
2. dos lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre éstos es igual (*criterio lal*),
3. dos ángulos correspondientes son iguales y el lado que comparten dichos ángulos es igual (*criterio ala*).

Veamos algunos ejemplos donde utilicemos los criterios vistos anteriormente:

**Ejemplo 1.4.1** Tenemos dos triángulos semejantes  $\triangle ABC$  y  $\triangle MNP$ . Sabemos que sus lados son iguales a los valores marcados en la siguiente figura, encuentra cuánto vale  $x$ .




*Solución.* Como tenemos que los lados de ambos triángulos son proporcionales, entonces:

$$\frac{x}{3} = \frac{8}{4}$$

con esto llegamos a que el valor de  $x$  es 6.


**Ejemplo 1.4.2** En la siguiente figura,  $ABCD$  es un paralelogramo. Sobre los lados  $AB$  y  $AD$  se dibujan los triángulos equiláteros  $\triangle ABF$  y  $\triangle ADE$ , respectivamente. Demuestra que el triángulo  $\triangle FCE$  es equilátero.



*Solución.* Cuando dos triángulos, además de ser semejantes, tienen las longitudes de sus lados iguales se dice que son *congruentes*. En la figura anterior, tenemos que  $\angle FAE + 120^\circ + \angle BAD = 360^\circ$ , entonces  $\angle FAE = 240^\circ - \angle BAD = 180^\circ - \angle BAD + 60^\circ$ . Como  $\angle FBC = 180^\circ - \angle BAD + 60^\circ$ , entonces  $\angle FAE = \angle FBC$ . Además, tenemos que  $FA = FB$  y  $AE = BC$ , esto implica que el triángulo  $\triangle FAE$  es congruente al triángulo  $\triangle FBC$  y por lo tanto  $FE = FC$ . De manera análoga podemos demostrar que  $EC = FE$  y así concluimos que el triángulo  $\triangle FEC$  es equilátero.

**Ejemplo 1.4.3** Sea  $Z$  un punto sobre el lado  $AB$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Una línea a través de  $A$  paralela a  $CZ$  interseca a  $BC$  en  $X$ . Una línea a través de  $B$  paralela a  $CZ$  interseca a  $AC$  en  $Y$ . Demuestra que

$$\frac{1}{CZ} = \frac{1}{AX} + \frac{1}{BY}.$$



*Demostración.* Primero re-escribimos la expresión que queremos demostrar como

$$1 = \frac{CZ}{AX} + \frac{CZ}{BY}.$$

Tenemos que el triángulo  $\triangle BCZ$  es semejante al triángulo  $\triangle BXA$ , de aquí obtenemos

$$\frac{CZ}{AX} = \frac{BZ}{AB}.$$

De manera análoga, de la semejanza entre los triángulos  $\triangle ACZ$  y  $\triangle AYB$ , tenemos que

$$\frac{CZ}{BY} = \frac{AZ}{AB}.$$

Sumando estas dos expresiones que hemos obtenido tenemos que

$$\frac{CZ}{AX} + \frac{CZ}{BY} = \frac{BZ}{AB} + \frac{AZ}{AB} = \frac{AZ + ZB}{AB} = \frac{AB}{AB} = 1. \quad \square$$

**Ejemplo 1.4.4** Dado un triángulo  $\triangle ABC$ , sea  $l$  una línea que pasa por el vértice  $A$  la cual divide el ángulo  $\angle BAC$  en dos partes iguales. Sean  $P$  y  $Q$  las




el cual es semejante al triángulo  $\triangle OAB$ . Utilizando la proporción entre los lados tenemos:

$$\frac{x}{R} = \frac{R-x}{x}.$$

Esto da lugar a la siguiente ecuación (aquí se acabó la geometría y le toca el turno al álgebra):

$$x^2 + Rx - R^2 = 0,$$

la cual tiene como raíces a  $R\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$  y  $-R\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)$ . Claramente, la segunda no puede ser solución de nuestro problema, ya que no existen longitudes negativas. Por lo tanto, la solución es  $R\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$ .




**Teorema 1.4.1** Sean  $\triangle ABC$ ,  $\triangle AB'C'$  y  $\triangle AB''C''$  tres triángulos semejantes los cuales comparten el vértice  $A$  y de manera que los vértices  $B, B', B''$  son correspondientes y también  $C, C', C''$  son correspondientes. Si  $B, B'$  y  $B''$  son colineales, entonces también  $C, C'$  y  $C''$  son colineales.

*Demostración.* Sean  $\angle BAB' = \alpha$  y  $\angle B'AB'' = \beta$ . Primero, observemos que  $\angle CAC' = \alpha$  y  $\angle C'AC'' = \beta$ , lo cual se ve de manera sencilla por la semejanza de los triángulos dados. Notemos también que

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} \quad \text{y} \quad \frac{AB'}{AB''} = \frac{AC'}{AC''},$$

entonces, por el criterio de semejanza *lal* tenemos que se cumplen las siguientes semejanzas:  $\triangle CAC' \sim \triangle BAB'$  y  $\triangle C'AC'' \sim \triangle B'AB''$ . De aquí se sigue

que  $\angle AC'C = \angle AB'B = \varphi$  y  $\angle AC'C'' = \angle AB'B'' = \theta$ . Finalmente, como  $\varphi + \theta = 180^\circ$ , concluimos que  $C, C'$  y  $C''$  son colineales.  $\square$




Hasta este momento, podría quedarnos la idea de que un problema posee sólo una solución y se necesita de *mucha suerte* para encontrarla. Normalmente esto no es cierto, como podemos apreciarlo en el siguiente ejemplo para el cual damos tres soluciones (esencialmente) distintas:

**Ejemplo 1.4.6** Sea  $ABC$  un triángulo tal que  $AB > AC > BC$ . Sea  $D$  un punto sobre el lado  $AB$  de tal manera que  $CD = BC$ , y sea  $M$  el punto medio del lado  $AC$ . Demuestra que  $BD = AC$  si y sólo si  $\angle BAC = 2\angle ABM$ .

*Primera Solución.* Sea  $\angle BAC = 2\alpha$ . Prolongamos el segmento  $BM$  hasta un punto  $B'$  tal que  $BM = MB'$ . De este modo obtenemos que el cuadrilátero  $AB'CB$  es un paralelogramo, de donde se sigue que  $B'C = AB$ . También sabemos que  $DC = BC = AB'$ , entonces el cuadrilátero  $ADCB'$  es un trapecio isósceles. De aquí se sigue que  $DB' = AC$ . Con estas tres igualdades de segmentos obtenemos que el triángulo  $B'CD$  es congruente al triángulo  $ABC$ . Se sigue que  $\angle DB'C = 2\alpha$ . Entonces se cumple que  $BD = DB' = AC$  si y sólo si  $\angle DB'B = \angle DBB'$ , lo cual es cierto si y sólo si  $\angle DB'B = \angle BB'C = \alpha$ . Es decir,  $BD = AC$  si y sólo si  $\angle BAC = 2\angle ABM$ .  $\square$







Supongamos primero que  $BD = AC$ , es decir,  $AD' = AC$ . Entonces,  $C'D' = AD'$  y de aquí obtenemos que  $\angle AC'D' = \angle C'AD'$ , además, como  $\angle AC'D' + \angle C'AD' = \angle C'D'B = 2\alpha$  obtenemos que  $\angle C'AD' = \alpha$ . Como  $C'A$  y  $BM$  son paralelas, concluimos que  $\angle ABM = \angle C'AD' = \alpha$ .

Ahora, supongamos que  $\angle ABM = \alpha$ , entonces se sigue que  $\angle C'AD' = \alpha$ . Como  $\angle C'D'B = 2\alpha = \angle AC'D' + \angle C'AD' = \angle AC'D' + \alpha$ , tenemos que  $\angle AC'D' = \alpha$ , es decir, el triángulo  $\triangle AC'D'$  es isósceles. De aquí obtenemos que  $AD' = C'D' = AC$ , y como  $AD' = BD$ , concluimos que  $BD = AC$ .  $\square$

### 1.4.1. Problemas

**Problema 1.27** En un triángulo  $\triangle ABC$ , sobre el lado  $BC$  se considera un punto  $D$  de tal manera que  $\angle BAD = \angle ACB$ . Demuestra que

$$AB^2 = BD \cdot BC.$$

**Problema 1.28** Dos circunferencias se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ . Por el punto  $A$  se trazan los segmentos  $AC$  y  $AD$ , cada uno de los cuales es cuerda de una circunferencia y tangente a la otra. Demuestra que

$$AC^2 \cdot BD = AD^2 \cdot BC.$$

**Problema 1.29** Sobre los lados  $AB$  y  $AC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  se construyen hacia afuera los cuadrados  $ABNM$  y  $CAPQ$ . Sea  $D$  el punto medio del

lado  $BC$ . Demuestra que  $PM = 2 \cdot AD$ .

**Problema 1.30** En un paralelogramo  $ABCD$  se escogen los puntos  $E$  y  $F$  sobre la diagonal  $AC$  de manera que  $AE = FC$ . Si  $BE$  se extiende hasta intersectar  $AD$  en  $H$ , y  $BF$  se extiende hasta intersectar  $DC$  en  $G$ , demuestra que  $HG$  es paralelo a  $AC$ .

**Problema 1.31** Demuestra que la recta que une los puntos medios de los lados paralelos de un trapecio pasa por el punto de intersección de las diagonales.

**Problema 1.32** Sea  $M$  el punto medio del lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Consideremos un punto  $P$  sobre  $AM$ . Se extiende el segmento  $BP$  hasta intersectar a  $AC$  en  $E$ , y  $CP$  se extiende hasta intersectar a  $AB$  en  $D$ . Demuestra que  $DE$  es paralelo a  $BC$ .

**Problema 1.33** A una circunferencia se le han trazado dos líneas tangentes paralelas las cuales la tocan en los puntos  $M$  y  $N$ . Se traza una tercer tangente la cual corta a las tangentes anteriores en los puntos  $K$  y  $L$ . Sea  $O$  el centro de la circunferencia. Demuestra que  $\angle KOL = 90^\circ$ .

**Problema 1.34** En un triángulo  $\triangle ABC$ , la altura  $CE$  es extendida hasta  $G$  de tal manera que  $EG = AF$ , donde  $AF$  es la altura trazada hacia  $BC$ . Una línea a través de  $G$  y paralela a  $AB$  intersecta  $CB$  en  $H$ . Demuestra que  $HB = AB$ .

**Problema 1.35** En un trapecio  $ABCD$  ( $AB$  paralelo a  $DC$ ) sea  $AB = a$  y  $DC = b$ . Sean  $M$ ,  $N$ ,  $P$  y  $Q$  los puntos medios de  $AD$ ,  $BD$ ,  $AC$  y  $BC$ , respectivamente. Demuestra que

(a)  $MQ = \frac{a+b}{2}$

(b)  $NP = \frac{|a-b|}{2}$

**Problema 1.36** En un trapezio  $ABCD$  ( $AB$  paralelo a  $DC$ ) sea  $AB = a$  y  $DC = b$ . Supongamos que  $\angle ADC + \angle BCD = 90^\circ$ . Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de  $AB$  y  $DC$ , respectivamente. Demuestra que

$$MN = \frac{b - a}{2}.$$

**Problema 1.37** En un trapezio  $ABCD$  ( $AB$  paralelo a  $DC$ )  $M$  es el punto medio del lado  $DC$ . Supongamos que  $AM$  interseca a  $BD$  en  $E$ . A través de  $E$ , se traza una línea paralela a  $DC$  la cual corta a  $AD$ ,  $AC$  y  $BC$ , en los puntos  $H$ ,  $F$  y  $G$ , respectivamente. Demuestra que  $HE = EF = FG$ .

**Problema 1.38** Demuestra que las rectas que unen los centros de los cuadrados, construidos exteriormente sobre los lados de un paralelogramo, forman también un cuadrado.

**Problema 1.39** En un cuadrilátero  $ABCD$ . Sobre las rectas  $AC$  y  $BD$  se consideran los puntos  $K$  y  $M$  de manera que  $BK$  es paralelo a  $AD$  y  $AM$  es paralelo a  $BC$ . Demuestra que  $KM$  es paralelo a  $CD$ .

**Problema 1.40** Sea  $M$  el punto medio de la base  $AC$  de un triángulo isósceles  $\triangle ABC$ .  $H$  es un punto en  $BC$  tal que  $MH$  es perpendicular a  $BC$ .  $P$  es el punto medio del segmento  $MH$ . Demuestra que  $AH$  es perpendicular a  $BP$ .

**Problema 1.41** Se da un triángulo  $\triangle ABC$ . En la recta que pasa por el vértice  $A$  y es perpendicular al lado  $BC$ , se toman dos puntos  $A_1$  y  $A_2$  de modo que  $AA_1 = AA_2 = BC$  ( $A_1$  es más próximo a la recta  $BC$  que  $A_2$ ). De manera análoga, en la recta perpendicular a  $AC$ , que pasa por  $B$ , se toman los puntos  $B_1$  y  $B_2$  de modo que  $BB_1 = BB_2 = AC$ . Demuestra que los segmentos  $A_1B_2$  y  $A_2B_1$  son iguales y mutuamente perpendiculares.

**Problema 1.42** Por el punto de intersección de las diagonales de un cuadrilátero  $ABCD$  se traza una recta que corta a  $AB$  en el punto  $M$  y a  $CD$  en el punto  $N$ . Por  $M$  y  $N$  se trazan las rectas paralelas a  $CD$  y  $AB$ , respectivamente, que cortan a  $AC$  y a  $BD$  en los puntos  $E$  y  $F$ . Demuestra que  $BE$  es paralelo a  $CF$ .


**Problema 1.43** Sea  $E$  un punto arbitrario sobre el lado  $AC$  del triángulo  $\triangle ABC$ . Por el vértice  $B$  tracemos una recta arbitraria  $l$ . Por  $E$ , se traza una recta paralela a  $BC$  la cual corta  $l$  en el punto  $N$ . También por  $E$ , se traza una recta paralela a  $AB$  la cual corta  $l$  en el punto  $M$ . Demuestra que  $AN$  es paralelo a  $CM$ .

**Problema 1.44** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo equilátero y sea  $\Gamma$  el semicírculo que tiene a  $BC$  como diámetro y que es exterior al triángulo. Demuestra que si una línea que pasa por  $A$  trisecta a  $BC$ , entonces también trisecta al arco  $\Gamma$ .

**Problema 1.45** Sea  $I$  el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo  $\triangle ABC$ . Esta circunferencia es tangente a los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$  del triángulo en los puntos  $K$ ,  $L$  y  $M$ , respectivamente. La recta paralela a  $MK$  que pasa por el punto  $B$  interseca a las rectas  $LM$  y  $LK$  en los puntos  $R$  y  $S$ , respectivamente. Demuestra que el ángulo  $\angle RIS$  es agudo.

## 1.5. Teorema de Pitágoras

Antes de enunciar el *Teorema de Pitágoras* vamos a analizar un triángulo rectángulo el cual tiene trazada la altura hacia la hipotenusa .



Sea  $\triangle ABC$  el triángulo mencionado el cual tiene trazada la altura  $AD$  y con ángulo recto en  $A$ . Sean  $\angle ABC = \alpha$  y  $\angle ACB = \beta$ . Tenemos que  $\alpha + \beta = 90^\circ$ , entonces también  $\angle DAC = \alpha$  y  $\angle BAD = \beta$ . Así, de ésta manera hemos obtenido dos triángulos semejantes al  $\triangle ABC$ , es decir,  $\triangle BAD$  y  $\triangle DAC$  son

semejantes al triángulo  $\triangle ABC$ . De la semejanza entre  $\triangle BAD$  y  $\triangle DAC$  obtenemos:

$$\frac{BD}{AD} = \frac{AD}{DC}$$

de aquí obtenemos que

$$AD^2 = BD \cdot DC,$$

y se dice que  $AD$  es la *media geométrica* o *media proporcional* de  $BD$  y  $DC$ . Además, de manera análoga podemos obtener también que

$$AB^2 = BD \cdot BC \tag{1.1}$$

(de la semejanza de los triángulos  $\triangle BAD$  y  $\triangle ABC$ ) y que

$$AC^2 = DC \cdot BC \tag{1.2}$$

(de la semejanza de los triángulos  $\triangle DAC$  y  $\triangle ABC$ ).

Sumando (1.1) y (1.2) tenemos que

$$AB^2 + AC^2 = BD \cdot BC + DC \cdot BC,$$

esto es

$$AB^2 + AC^2 = BC(BD + DC) = BC \cdot BC,$$

es decir

$$AB^2 + AC^2 = BC^2. \tag{1.3}$$


Con esto hemos probado el teorema de Pitágoras.

**Teorema 1.5.1** *La suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa.*

Este teorema es atribuido a uno de los más grandes matemáticos de la antigua Grecia, Pitágoras, y será de gran utilidad en muchos de los problemas que veremos más adelante. El recíproco también es cierto, pero esto se deja como ejercicio. Utilizando el Teorema de Pitágoras es fácil probar el siguiente teorema, conocido como la *Ley del Paralelogramo*.

**Teorema 1.5.2** *La suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de los lados.*

*Demostración.* Sea  $ABCD$  el paralelogramo y sean  $AB = CD = a$  y  $BC = DA = b$ . También sean  $AC = c$  y  $BD = d$ .



Tracemos perpendiculares a  $BC$  desde  $A$  y  $D$ , las cuales intersecan a  $BC$  en  $M$  y  $N$ . Sean  $AM = DN = h$  y  $BM = CN = x$ . Aplicando el teorema de Pitágoras a los triángulos  $\triangle DCN$ ,  $\triangle DBN$ ,  $\triangle AMC$  tenemos las siguientes igualdades:

$$h^2 + x^2 = a^2 \quad (1.4)$$

$$h^2 + (b + x)^2 = d^2 \quad (1.5)$$

$$h^2 + (b - x)^2 = c^2 \quad (1.6)$$

sumando (1.5) y (1.6) obtenemos

$$2h^2 + 2b^2 + 2x^2 = d^2 + c^2.$$


Ahora utilizando (1.4) tenemos que

$$2a^2 + 2b^2 = d^2 + c^2. \quad (1.7)$$

Lo cual queríamos demostrar.  $\square$

De nuevo, utilizando el Teorema de Pitágoras, probaremos fácilmente la bien conocida *Ley del Coseno*.

**Ejemplo 1.5.1** *En el triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $BC = a$ ,  $CA = b$ ,  $AB = c$  y  $\angle ABC = \beta$ . Entonces  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$ .*



*Demostración.* Sea  $AD = h$  la altura trazada hacia el lado  $BC$  y sea  $BD = x$ . Tenemos que

$$h^2 + x^2 = c^2$$

y

$$h^2 + (a - x)^2 = b^2$$


esto implica que

$$c^2 - x^2 + a^2 + x^2 - 2ax = c^2 + a^2 - 2ax = b^2$$

y como  $x = c \cdot \cos \beta$ , tenemos que

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta. \square$$

**Ejemplo 1.5.2** Sea  $P$  un punto en el interior del rectángulo  $ABCD$ . Si  $PA = 3$ ,  $PC = 5$  y  $PD = 4$ , encuentra el valor de  $PB$ .



*Solución.* Sean  $Q$  y  $R$  los pies de las perpendiculares trazadas desde  $P$  hacia los segmentos  $AD$  y  $BC$ , respectivamente. Utilizando el Teorema de Pitágoras obtenemos que


$$PA^2 - PD^2 = QA^2 - QD^2 = RB^2 - RC^2 = PB^2 - PC^2.$$



Sea  $x = PB$ , entonces, de la expresión anterior tenemos que

$$3^2 - 4^2 = x^2 - 5^2,$$

de aquí tenemos  $x^2 = 18$ . Por lo tanto,  $x = PB = 3\sqrt{2}$ .



De manera muy simple se puede probar el siguiente lema.

**Lema 1.5.1** Sean  $A$  y  $B$  dos puntos dados. Entonces, el lugar geométrico de los puntos <sup>5</sup>  $M$  tales que  $AM^2 - MB^2 = k$  (donde  $k$  es un número dado), es una recta perpendicular a  $AB$ .

Ahora, utilizando el lema anterior probaremos el siguiente Teorema de Carnot.

**Teorema 1.5.3** Sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  tres puntos dados. Para que las líneas perpendiculares sobre los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$  de un triángulo  $\triangle ABC$  trazadas desde los puntos  $E$ ,  $D$  y  $F$ , respectivamente, se intersecten en un punto, es necesario y suficiente que


$$DB^2 - BF^2 + FA^2 - AE^2 + EC^2 - CD^2 = 0.$$

*Demostración.* Supongamos primero que las tres perpendiculares concurren en un punto  $P$ . Por el lema anterior, tenemos que  $AF^2 - FB^2 = AP^2 - PB^2$ ,

<sup>5</sup>El lugar geométrico de los puntos es el conjunto de puntos que cumplen una propiedad dada.

$BD^2 - DC^2 = BP^2 - PC^2$  y  $CE^2 - EA^2 = CP^2 - PA^2$ . Sumando estas tres expresiones obtenemos que

$$DB^2 - BF^2 + FA^2 - AE^2 + EC^2 - CD^2 = 0.$$



Ahora, supongamos que se cumple que  $DB^2 - BF^2 + FA^2 - AE^2 + EC^2 - CD^2 = 0$ . Consideremos el punto  $P$  donde se intersecan las perpendiculares desde  $F$  y  $D$  sobre los lados  $AB$  y  $BC$ , respectivamente. Dado que se cumple que  $AF^2 - FB^2 = AP^2 - PB^2$  y  $BD^2 - DC^2 = BP^2 - PC^2$ , tenemos que también debe cumplirse que  $CE^2 - EA^2 = CP^2 - PA^2$ . Esto último, por el lema anterior, implica que el segmento  $PE$  es perpendicular al lado  $AC$ . Por lo tanto, las perpendiculares trazadas desde  $D$ ,  $E$  y  $F$  sobre los lados respectivos, concurren en un punto.  $\square$

### 1.5.1. Problemas


**Problema 1.46** Probar el inverso del teorema de Pitágoras: si  $a$ ,  $b$  y  $c$  son los lados de un triángulo y se cumple que  $a^2 + b^2 = c^2$ , entonces es un triángulo rectángulo.

**Problema 1.47** Sean  $a$ ,  $b$  los catetos de un triángulo rectángulo,  $c$  la hipotenusa y  $h$  la altura trazada hacia la hipotenusa. Demuestra que el triángulo con lados  $h$ ,  $c + h$  y  $a + b$  es un triángulo rectángulo.

**Problema 1.48** Sea  $D$  un punto sobre el lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Sean  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $CA = b$ ,  $AD = d$ ,  $BD = n$  y  $DC = m$ . Demuestra que

se cumple el Teorema de Stewart

$$b^2n + c^2m = a(d^2 + mn).$$



**Problema 1.49** En una circunferencia de radio  $R$  está trazado un diámetro y sobre éste se toma el punto  $A$  a una distancia  $d$  de su centro. Hallar el radio de la circunferencia que es tangente al diámetro en el punto  $A$  y es tangente interiormente a la circunferencia dada.

**Problema 1.50**  $K$  es el punto medio del lado  $AD$  del rectángulo  $ABCD$ . Hallar el ángulo entre  $BK$  y la diagonal  $AC$  si sabemos que  $AD : AB = \sqrt{2}$ .

**Problema 1.51** En un triángulo  $\triangle ABC$ ,  $E$  es un punto sobre la altura  $AD$ . Demuestra que

$$AC^2 - CE^2 = AB^2 - EB^2.$$

**Problema 1.52** Sean  $AB$  y  $CD$  dos cuerdas perpendiculares en una circunferencia de radio  $R$ . Demuestra que


$$AC^2 + BD^2 = 4R^2.$$

**Problema 1.53** Un trapecio  $ABCD$ , con  $AB$  paralelo a  $CD$ , tiene sus diagonales  $AC$  y  $BD$  perpendiculares. Demuestra que


$$AC^2 + BD^2 = (AB + DC)^2.$$

**Problema 1.54** Demuestra que si en un cuadrilátero la suma de los cuadrados de los lados opuestos son iguales, entonces sus diagonales son perpendiculares entre sí.

**Problema 1.55** Sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo se trazan semicírculos, como se muestra en la figura. Demuestra que el área de la región sombreada es igual al área del triángulo.




**Problema 1.56** ¿Cuál es el valor de  $b - a$  en la siguiente figura, donde  $x$ ,  $x - 1$  y  $x + 1$  son las longitudes de los lados del triángulo? (La línea punteada es una altura).



**Problema 1.57** En la siguiente figura,  $ABCD$  es un cuadrado y el triángulo  $\triangle ABP$  es rectángulo con ángulo recto en  $P$ . Demuestra que

$$MN^2 = AM \cdot BN.$$



**Problema 1.58** Se dan el triángulo equilátero  $\triangle ABC$  y el punto arbitrario  $D$ ;  $A_1$ ,  $B_1$  y  $C_1$  son los centros de las circunferencias inscritas en los triángulos  $\triangle BCD$ ,  $\triangle CAD$  y  $\triangle ABD$ . Demuestra que las perpendiculares bajadas desde los vértices  $A$ ,  $B$  y  $C$  sobre  $B_1C_1$ ,  $C_1A_1$  y  $A_1B_1$ , respectivamente, concurren en un punto.

**Problema 1.59** En el hexágono convexo  $ABCDEF$  tenemos que  $AB = BC$ ,  $CD = DE$ ,  $EF = FA$ . Probar que las perpendiculares bajadas desde los puntos  $C$ ,  $E$  y  $A$  sobre las líneas  $BD$ ,  $DF$  y  $FB$ , respectivamente, se intersecan en un punto.

**Problema 1.60** En los rayos  $AB$  y  $CB$  del triángulo  $\triangle ABC$  están trazados los segmentos  $AM$  y  $CN$  de tal manera que  $AM = CN = p$ , donde  $p$  es el semiperímetro del triángulo ( $B$  se halla entre  $A$  y  $M$ , así como entre  $C$  y  $N$ ). Sea  $K$  el punto de la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABC$  el cual es diametralmente opuesto a  $B$ . Demuestra que la perpendicular trazada desde  $K$  sobre  $MN$  pasa por el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ .

**Problema 1.61** Se dan una circunferencia y el punto  $A$  fuera de ésta. Una circunferencia que pasa por  $A$ , es tangente a la dada en el punto arbitrario  $B$ . Las líneas tangentes a la segunda por los puntos  $A$  y  $B$  se intersecan en el punto  $M$ . Hallar el lugar geométrico de los puntos  $M$ .

## 1.6. Cuadriláteros cíclicos.


Un hecho muy conocido en geometría es que por cualesquiera tres puntos no alineados pasa exactamente una circunferencia. ¿Pero qué podemos decir si consideramos cuatro puntos en lugar de tres? Como es de esperarse, no siempre existirá una circunferencia que pase por los cuatro puntos dados. Por ejemplo, consideremos la circunferencia que pasa por tres puntos dados (la cual es única),  $A, B, C$ , y agreguemos un cuarto punto,  $D$ , el cual no esté sobre la circunferencia. Claramente, no existe una circunferencia que pase por estos cuatro puntos, ya que en particular pasaría por  $A, B, C$ , y por la manera en que escogimos a  $D$ , ésta no puede pasar por  $D$ . De aquí vemos que los cuadriláteros que posean una circunferencia que pase por sus vértices deben ser en cierta forma *especiales*. A tales cuadriláteros se les acostumbra llamar *cuadriláteros cíclicos*.

**Definición 1.6.1** *Un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, es decir, sus cuatro vértices están sobre una misma circunferencia se dice que es un cuadrilátero cíclico.*


Veremos que dos ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico suman  $180^\circ$ , más aún, para que un cuadrilátero sea cíclico es suficiente con verificar que dos ángulos opuestos sumen  $180^\circ$ .

**Teorema 1.6.1** *Un cuadrilátero es cíclico si y sólo si la suma de dos ángulos opuestos es igual a  $180^\circ$ .*

*Demostración.* Para probar esto, primero vamos a suponer que el cuadrilátero  $ABCD$  es cíclico. Tenemos que el  $\angle DAB = \frac{\widehat{BD}}{2}$  y  $\angle BCD = \frac{\widehat{DB}}{2}$ , y como  $\widehat{BD} + \widehat{DB} = 360^\circ$  (midiendo los ángulos en grados), tenemos que  $\angle DAB + \angle BCD = \alpha + \beta = 180^\circ$ .




Ahora supongamos que  $\angle DAB + \angle BCD = \alpha + \beta = 180^\circ$ . Tracemos la circunferencia que pasa por los vértices  $D, A$  y  $B$  y supongamos que ésta no pasa por el vértice  $C$ . Prolonguemos  $BC$  hasta que intersecte a la circunferencia en  $C'$ . Como el cuadrilátero  $ABC'D$  es cíclico tenemos que  $\angle DAB + \angle BC'D = 180^\circ$ , esto quiere decir que  $\angle BC'D = \angle BCD = \beta$  y entonces  $DC$  es paralelo a  $DC'$ , lo cual es una contradicción ya que líneas paralelas no se intersectan. Entonces  $C$  coincide con  $C'$  y por lo tanto el cuadrilátero  $ABCD$  es cíclico.  $\square$



Ahora vamos a hacer un ejemplo donde utilicemos el teorema anterior:


**Ejemplo 1.6.1** Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  se intersectan en los puntos  $A$  y  $B$ . Por el punto  $A$  se traza una recta que corta a las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  en los puntos  $C$  y  $D$ , respectivamente. Por los puntos  $C$  y  $D$  se trazan tangentes a las circunferencias, las cuales se intersectan en el punto  $M$ . Demuestra que el cuadrilátero  $MCBD$  es cíclico.



*Solución.* Queremos probar que  $\angle CMD + \angle DBC = 180^\circ$ . Tracemos la cuerda común  $AB$ . Tenemos que  $\angle MCA = \angle CBA = \alpha$  ya que uno es ángulo semi-inscrito y el otro es ángulo inscrito, ambos en la circunferencia  $C_1$ . Análogamente se demuestra que  $\angle MDA = \angle DBA = \beta$  (en  $C_2$ ). Tenemos que  $\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$ , por ser los ángulos internos del triángulo  $\triangle MCD$ , pero como  $\angle CBD = \alpha + \beta$  tenemos que  $\angle CMD + \angle DBC = 180^\circ$ .  $\square$


**Ejemplo 1.6.2** Sea  $BC$  el diámetro de un semicírculo y sea  $A$  el punto medio del semicírculo. Sea  $Q$  un punto sobre el arco  $\widehat{AC}$  y sea  $P$  el pie de la perpendicular desde  $A$  sobre la línea  $BQ$ . Demuestra que  $BP = PQ + QC$ .

*Solución.* Consideremos el punto  $D$  sobre el rayo  $BP$  de tal manera que  $QD = QC$ , entonces  $PD = PQ + QD = PQ + QC$ . Bastará entonces probar que  $P$  es el punto medio de  $BD$ . Primero, tenemos que  $\angle QDC = \angle QCD = 45^\circ$ , y como  $O$  es el punto medio de  $BC$ , ahora tendremos que demostrar que  $OP$  es paralelo a  $DC$ . Para esto, bastará demostrar que  $\angle BPO = 45^\circ$ . Como  $AO \perp BC$  y  $\angle APB = 90^\circ$  tenemos que  $APOB$  es cíclico y de aquí que  $\angle BPO = \angle BAO = 45^\circ$ , por lo tanto  $BP = PQ + QC$ .  $\square$



**Ejemplo 1.6.3** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sea  $D$  el pie de la altura desde  $A$ . Sean  $E$  y  $F$  sobre una línea que pasa por  $D$  de tal manera que  $AE$  es perpendicular a  $BE$ ,  $AF$  es perpendicular a  $CF$ ,  $E$  y  $F$  son diferentes de  $D$ . Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de  $BC$  y  $EF$ , respectivamente. Demuestra que  $AN$  es perpendicular a  $NM$ .





*Demostración.* Tenemos que  $E$  está sobre la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABD$  y  $F$  está sobre la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ADC$ , entonces los cuadriláteros  $ABDE$  y  $ADCF$  son cíclicos. De lo anterior tenemos que  $\angle ABD = \angle AEF = \alpha$  y  $\angle ACD = \angle AFE = \beta$  lo cual implica que  $\triangle ABC \sim \triangle AEF$ . Tanto  $M$  como  $N$  son puntos medios de los lados correspondientes  $BC$  y  $EF$ , respectivamente, y esto implica que  $\angle AMB = \angle ANE = \angle AND = \theta$ , es decir, el cuadrilátero  $ADMN$  es cíclico y por lo tanto  $\angle ANM = 90^\circ$ .  $\square$


En el ejemplo que acabamos de ver, no es difícil convencerse que no es necesario que  $M$  y  $N$  sean puntos medios de los lados  $BC$  y  $EF$ , de hecho, es suficiente con considerar que los puntos dividan a los respectivos segmentos en la misma razón. Esto se vio en realidad en el Teorema 1.4.1.

Aunque el siguiente ejemplo ya fue demostrado en la sección anterior, damos una demostración más utilizando cuadriláteros cíclicos.

**Ejemplo 1.6.4** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo tal que  $AB > AC > BC$ . Sea  $D$  un punto sobre el lado  $AB$  de tal manera que  $CD = BC$ , y sea  $M$  el punto medio del lado  $AC$ . Demuestra que  $BD = AC$  si y sólo si  $\angle BAC = 2\angle ABM$ .

*Demostración.* Sea  $P$  un punto sobre  $BM$  tal que  $\angle PAM = \angle MBA = \alpha$ . Los

triángulos  $\triangle MAP$  y  $\triangle MBA$  comparten el ángulo  $\angle BMA$  y por construcción  $\angle PAM = \angle MBA$ , por tanto, son semejantes. Así que  $\frac{MA}{MP} = \frac{MB}{MA}$ . Como  $MA = CM$ , se tiene que  $\frac{CM}{MP} = \frac{MB}{CM}$ . Entonces, los triángulos  $\triangle MCP$  y  $\triangle MBC$  tienen lados proporcionales, además comparten el ángulo  $\angle CMB$ . Se sigue que son semejantes. De aquí obtenemos que  $\angle MCP = \angle MBC = \beta$ .




Ahora, observemos que  $\angle APC = 180 - (\alpha + \beta)$ . Por otro lado, como  $\alpha + \beta = \angle ABC = \angle CDB$ , se tiene que  $\angle ADC = 180 - (\alpha + \beta) = \angle APC$ . Obtenemos que el cuadrilátero  $CPDA$  es cíclico. Esto implica que  $\angle PDB = \angle PCA = \beta$ . Se sigue que los triángulos  $\triangle CPA$  y  $\triangle DPB$  son semejantes. Entonces,  $BD = AC \Leftrightarrow \triangle CPA \cong \triangle DPB \Leftrightarrow PA = PB \Leftrightarrow \angle PAB = \angle PBA = \angle PAC \Leftrightarrow \angle A = 2\angle MBA$ .  $\square$

**Ejemplo 1.6.5** Sean  $\triangle ABC$  un triángulo acutángulo y  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  sus alturas. La circunferencia con diámetro  $AD$  corta a los lados  $AB$  y  $AC$  en  $M$  y  $N$ , respectivamente. Sean  $P$  y  $Q$  los puntos de intersección de  $AD$  con  $EF$  y  $MN$ , respectivamente. Demuestra que  $Q$  es el punto medio de  $PD$ .

*Demostración.* Como  $AD$  es diámetro, los ángulos  $\angle AMD$  y  $\angle AND$  son rectos. El triángulo  $\triangle ABD$  es entonces semejante al  $\triangle ADM$  y de aquí,  $AM \cdot AB = AD^2$ . Análogamente,  $AN \cdot AC = AD^2$ . Por lo tanto,  $AM \cdot AB = AN \cdot AC$ . Esto implica que los triángulos  $\triangle ANM$  y  $\triangle ABC$  son semejantes, ya que además de


tener una pareja de lados proporcionales también comparten el ángulo  $\angle BAC$ . Se sigue que  $BCNM$  es un cuadrilátero cíclico.



Por otro lado, como  $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$ , el cuadrilátero  $BFEC$  también es cíclico. Entonces  $\gamma = \angle ACB = \angle AMN = \angle AFE$ . De aquí,  $MN$  es paralela a  $FE$ . Además, si  $T$  es el punto de intersección de  $MN$  con  $CF$ ,  $\angle CTN = \angle FTM = 90^\circ - \angle TMF = 90^\circ - \gamma = \angle CDN$ . Por lo tanto, el cuadrilátero  $DTNC$  es cíclico y entonces  $\angle DTC = \angle DNC = 90^\circ$ . El cuadrilátero  $DMFT$  tiene 3 ángulos rectos, luego el cuarto ángulo también es recto, es decir, se trata de un rectángulo.

Tracemos  $FR$  paralela a  $PQ$  con  $R$  sobre  $MN$ , entonces los triángulos  $\triangle FMR$  y  $\triangle DTQ$  son de lados paralelos y como  $DT = FM$  los triángulos son congruentes, luego  $DQ = FR = PQ$ , por lo tanto  $Q$  es el punto medio de  $PD$ .  $\square$

**Ejemplo 1.6.6** *Dos circunferencias de centros  $O_1$  y  $O_2$  se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$  como se muestra en la figura. Por  $A$  se traza una recta  $l$  que interseca de nuevo a las circunferencias en los puntos  $M$  y  $N$ . Por  $M$  y  $N$  se trazan las líneas tangentes respectivas y éstas se intersecan en el punto  $P$ . La paralela a  $PN$  por  $O_2$  y la paralela a  $PM$  por  $O_1$  se intersecan en  $Q$ . Demuestra que las rectas  $PQ$ , al variar la recta  $l$ , pasan por un punto fijo y que la longitud del segmento  $PQ$  es constante.*




*Demostración.* Como vimos en el Ejemplo 1.6.1, el cuadrilátero  $BMPN$  es cíclico. Entonces  $\angle BPN = \angle BMN = \alpha$ . Por otro lado, tenemos que  $\angle BO_1O_2 = \angle BMN$  y  $\angle BO_2O_1 = \angle BNM$ , lo cual implica que  $\angle O_1BO_2 = \angle MBN$ . Con esto hemos probado que el cuadrilátero  $BO_1QO_2$  es cíclico. De aquí obtenemos que  $\angle BQO_2 = \angle BO_1O_2 = \angle BMN = \alpha$ , lo cual implica que  $B$ ,  $Q$  y  $P$  están alineados. De no ser así, tendríamos que  $BP$  intersecaría a la línea  $QO_2$  en un punto  $Q'$  distinto de  $Q$ , pero entonces también tendríamos que  $\angle BQ'O_2 = \angle BPN = \angle BQO_2 = \alpha$ , lo que a su vez implicaría que los puntos  $B$ ,  $O_1$ ,  $Q$ ,  $Q'$  y  $O_2$  son concíclicos. Esto es una contradicción, por lo tanto,  $B$ ,  $Q$  y  $P$  están alineados.

Para la segunda parte consideramos la proyección de  $Q$  sobre  $PN$  y la llamamos  $T$ . Sabemos que el ángulo  $\angle BMA = \alpha$  no depende de la elección de la recta  $l$ , entonces, como la longitud del segmento  $QT$  es igual al radio de la circunferencia de centro  $O_2$  y  $\angle QPT = \alpha$ , tenemos que los triángulos  $\triangle QPT$  siempre son congruentes. Por lo tanto, la longitud del segmento  $PQ$  no depende de la elección de la línea  $l$ .  $\square$

## 1.6.1. Problemas

**Problema 1.62** En la siguiente figura están trazadas las bisectrices<sup>6</sup> de los ángulos interiores del cuadrilátero  $ABCD$ , las cuales se intersecan en los puntos  $E$ ,  $F$ ,  $G$  y  $H$ , como se muestra en la figura. Demuestra que el cuadrilátero  $EFGH$  es cíclico.



**Problema 1.63** Sea  $AB$  una cuerda en una circunferencia y  $P$  un punto sobre el arco  $\widehat{AB}$ . Sea  $Q$  la proyección de  $P$  sobre  $AB$ ,  $R$  y  $S$  las proyecciones de  $P$  sobre las tangentes al círculo en  $A$  y  $B$ , respectivamente. Demuestra que  $PQ$  es la media geométrica de  $PR$  y  $PS$ , esto es,  $PQ = \sqrt{PR \cdot PS}$ .

**Problema 1.64** Una línea  $PQ$ , paralela al lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ , corta a  $AB$  y a  $AC$  en  $P$  y  $Q$ , respectivamente. La circunferencia que pasa por  $P$  y es tangente a  $AC$  en  $Q$ , corta de nuevo a  $AB$  en  $R$ . Demuestra que el cuadrilátero  $RQCB$  es cíclico.

**Problema 1.65** Dos circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ . Por el punto  $A$  se traza una recta que corta a las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  en los puntos  $C$  y  $D$ , respectivamente. Por los puntos  $C$  y  $D$  se trazan tangentes a las circunferencias, las cuales se intersecan en un punto  $M$ . Sea  $X$  un punto en el segmento  $CD$  de tal manera que  $CX = AD$ . Demuestra que el triángulo  $\triangle CXM$  es semejante al triángulo  $\triangle BAC$ .


**Problema 1.66** Dos circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ . Por el punto  $A$  se traza dos rectas  $l_1$  y  $l_2$ ;  $l_1$  interseca a  $C_1$  en  $C$  y a  $C_2$  en

<sup>6</sup>La bisectriz de un ángulo es la línea que pasa por el vértice y lo divide en dos ángulos iguales.

$D$ ,  $\ell_2$  interseca a  $C_1$  en  $E$  y a  $C_2$  en  $F$ . Las líneas  $CE$  y  $FD$  se intersecan en un punto  $M$ . Demuestra que los cuadriláteros  $MCBD$  y  $MEBF$  son cíclicos.

**Problema 1.67** En un triángulo  $\triangle ABC$  sean  $M$ ,  $N$  y  $P$ , puntos sobre los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Se trazan las circunferencias circunscritas a los triángulos  $\triangle APN$ ,  $\triangle BMP$  y  $\triangle CNM$ . Demuestra que las tres circunferencias tienen un punto en común el cual se conoce como punto de Miquel.<sup>7</sup>


**Problema 1.68** Tres circunferencias tienen un punto común  $O$ . Los lados del triángulo  $\triangle ABC$  pasan por los otros puntos de intersección entre los pares de circunferencias, como se muestra en la figura. Demuestra que el triángulo formado por los centros de las circunferencias es semejante al triángulo  $\triangle ABC$ .



**Problema 1.69** Teorema de Steiner. Están dadas cuatro rectas en el plano de manera que no hay un par de ellas que sean paralelas ni tres de ellas que sean concurrentes. Estas rectas determinan cuatro triángulos. Entonces se cumple que

- (a) las circunferencias circunscritas a estos triángulos concurren en un punto.
- (b) Los centros de las circunferencias circunscritas a estos triángulos determinan un cuadrilátero cíclico.

<sup>7</sup>Este resultado es conocido como teorema de Miquel.



**Problema 1.70** En un triángulo  $\triangle ABC$  sean  $M$ ,  $N$  y  $P$ , puntos sobre los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Se trazan las circunferencias circunscritas a los triángulos  $\triangle APN$ ,  $\triangle BMP$  y  $\triangle CNM$ . Sea  $T$  un punto cualquiera en el plano. La línea  $TA$  corta a la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle APN$  de nuevo en  $A'$ , La línea  $TB$  corta a la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle BMP$  de nuevo en  $B'$ , y La línea  $TC$  corta a la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle CNM$  de nuevo en  $C'$ . Demuestra que los puntos  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  y  $T$  son concíclicos.

**Problema 1.71** Por uno de los puntos  $C$  del arco  $\widehat{AB}$  de una circunferencia se han trazado dos rectas arbitrarias que cortan la cuerda  $AB$  en los puntos  $D$  y  $E$ , y a la circunferencia, en los puntos  $F$  y  $G$ . ¿Para cuál posición del punto  $C$  en el arco  $\widehat{AB}$ , el cuadrilátero  $DEGF$  es cíclico?

**Problema 1.72** Se toma un punto  $P$  en el interior de un rectángulo  $ABCD$  de tal manera que  $\angle APD + \angle BPC = 180^\circ$ . Encuentra la suma de los ángulos  $\angle DAP$  y  $\angle BCP$ .

**Problema 1.73** Sobre los lados de un cuadrilátero convexo, hacia el exterior, están contruidos cuadrados. Las diagonales del cuadrilátero son perpendiculares.

*Demuestra que los segmentos que unen los centros de los cuadrados opuestos, pasan por el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero.*

**Problema 1.74** *En un cuadrado  $ABCD$ ,  $M$  es el punto medio de  $AB$ . Una línea perpendicular a  $MC$  por  $M$  interseca a  $AD$  en  $K$ . Demuestra que  $\angle BCM = \angle KCM$ .*

**Problema 1.75** *Sea  $ABCD$  un cuadrilátero cíclico, sea  $M$  el punto de intersección de las diagonales de  $ABCD$ , y sean  $E, F, G$  y  $H$  los pies de las perpendiculares desde  $M$  hacia los lados  $AB, BC, CD$  y  $DA$ , respectivamente. Determina el centro de la circunferencia inscrita en el cuadrilátero  $EFGH$ .*

**Problema 1.76** *Sea  $AB$  el diámetro de un círculo con centro  $O$ . Se toma un punto  $C$  sobre la circunferencia de tal manera que  $OC$  es perpendicular a  $AB$ . Sea  $P$  un punto sobre el arco  $CB$ . Las líneas  $CP$  y  $AB$  se intersecan en  $Q$ . Se escoge un punto  $R$  sobre la línea  $AP$  de tal manera que  $RQ$  y  $AB$  son perpendiculares. Demuestra que  $BQ = QR$ .*

**Problema 1.77** *Demuestra que si un cuadrilátero cíclico tiene sus diagonales perpendiculares, entonces la perpendicular trazada hacia un lado desde el punto de intersección de las diagonales bisecta el lado opuesto.*

**Problema 1.78** *Demuestra que si un cuadrilátero cíclico tiene sus diagonales perpendiculares, entonces la distancia desde el centro de la circunferencia circunscrita hasta un lado es igual a la mitad de la longitud del lado opuesto.*

**Problema 1.79** *Sea  $ABCD$  un cuadrilátero convexo tal que las diagonales  $AC$  y  $BD$  son perpendiculares, y sea  $P$  su intersección. Demuestra que las reflexiones<sup>8</sup> de  $P$  con respecto a  $AB, BC, CD$  y  $DA$  son concíclicos.*

---

<sup>8</sup>Decimos que un punto  $X'$  es el reflejado de  $X$  con respecto a una línea  $\ell$  si el segmento  $X'X$  es perpendicular a  $\ell$  y su punto medio está en  $\ell$ .



**Problema 1.80** *Está dada la circunferencia  $\Omega$ . Desde un punto exterior  $P$  se trazan dos líneas tangentes a  $\Omega$  las cuales la tocan en  $A$  y  $B$ . También por  $P$  se traza una secante  $l$  a  $\Omega$ . Desde el centro de  $\Omega$  se traza una recta perpendicular a  $l$  la cual corta a  $\Omega$  en el punto  $K$  y a  $l$  en  $C$  (el segmento  $BK$  corta a  $l$ ). Demuestra que  $BK$  bisecta el ángulo  $\angle ABC$ .*

**Problema 1.81** *La cuerda  $CD$  de un círculo de centro  $O$  es perpendicular a su diámetro  $AB$ . La cuerda  $AE$  bisecta el radio  $OC$ . Demuestra que la cuerda  $DE$  bisecta la cuerda  $BC$ .*

**Problema 1.82** *Están dados una circunferencia  $C_1$  y un punto  $P$  exterior a ésta. Desde  $P$  se trazan las tangentes a  $C_1$  las cuales la intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ . También desde  $P$  se traza la secante  $l$  la cual interseca a  $C_1$  en los puntos  $C$  y  $D$ . Por  $A$  se traza una línea paralela a  $l$  la cual interseca a  $C_1$ , además de en  $A$ , en un punto  $E$ . Demuestra que  $EB$  bisecta la cuerda  $CD$ .*

**Problema 1.83** *Desde un punto sobre la circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero  $\triangle ABC$  están trazadas rectas paralelas a  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , las cuales cortan  $CA$ ,  $AB$  y  $BC$  en los puntos  $M$ ,  $N$  y  $Q$ , respectivamente. Demuestra que  $M$ ,  $N$  y  $Q$  están alineados.*

**Problema 1.84** *Sea  $\triangle ABC$  un triángulo rectángulo y sea  $D$  el punto donde la altura desde  $A$  interseca a la hipotenusa  $BC$ . Sean  $I$  y  $J$  los incentros de los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle ADC$ , respectivamente, y sean  $M$  y  $N$  los puntos donde la línea  $IJ$  interseca a los catetos  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. Demuestra que  $AM = AN$ .*

**Problema 1.85** *El  $\triangle ABC$  tiene inscrita una circunferencia, cuyo diámetro pasa por el punto de tangencia con el lado  $BC$  y corta la cuerda que une los otros dos puntos de tangencia en el punto  $N$ . Demuestra que  $AN$  parte  $BC$  por la mitad.*

**Problema 1.86** *Dos circunferencias se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ . Una recta arbitraria pasa por  $B$  y corta por segunda vez la primera circunferencia en el*

punto  $C$  y a la segunda en el punto  $D$ . Las tangentes a la primera circunferencia en  $C$  y a la segunda en  $D$  se cortan en el punto  $M$ . Por el punto de intersección de  $AM$  y  $CD$  pasa una recta paralela a  $CM$ , que corta  $AC$  en el punto  $K$ . Demuestra que  $KB$  es tangente a la segunda circunferencia.


**Problema 1.87** Sean  $B$  y  $C$  dos puntos de una circunferencia,  $AB$  y  $AC$  las tangentes desde  $A$ . Sea  $Q$  un punto del segmento  $AC$  y  $P$  la intersección de  $BQ$  con la circunferencia. La paralela a  $AB$  por  $Q$  corta a  $BC$  en  $J$ . Demuestra que  $PJ$  es paralelo a  $AC$  si y sólo si  $BC^2 = AC \cdot QC$ .

## 1.7. Teorema de Ptolomeo

En esta sección veremos un teorema sobre cuadriláteros cíclicos el cual se debe al matemático Ptolomeo, de la antigua Grecia. El enunciado del Teorema de Ptolomeo es el siguiente:

**Teorema 1.7.1** Un cuadrilátero  $ABCD$  es cíclico si y sólo si

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD.$$



*Demostración.* Sea  $P$  un punto en el plano de manera que  $\angle PAD = \angle BAC$  y  $\angle PDA = \angle BCA$ . De aquí tenemos que el triángulo  $\triangle APD$  es semejante al triángulo  $\triangle ABC$ , entonces  $\frac{BC}{PD} = \frac{AC}{AD}$  de donde se obtiene que

$$BC \cdot AD = AC \cdot PD. \quad (1.8)$$

De la misma semejanza tenemos que  $\frac{AP}{AB} = \frac{AD}{AC}$  y  $\angle BAP = \angle CAD$ , entonces  $\triangle ABP \sim \triangle ACD$ , de esta última se sigue que  $\frac{AB}{AC} = \frac{BP}{CD}$ . Escrita en otra forma

$$AB \cdot CD = AC \cdot BP. \quad (1.9)$$

Sumando las igualdades (1.8) y (1.9) tenemos que

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC(BP + PD).$$

Ahora, tenemos que  $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$  si y sólo si  $BP + PD = BD$ , es decir, si y sólo si  $B$ ,  $P$  y  $D$  son colineales. De manera equivalente, tenemos que  $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$  si y sólo si  $\angle BDA = \angle BCA$ , es decir, si y sólo si  $ABCD$  es un cuadrilátero cíclico.  $\square$

El siguiente problema se obtiene de manera muy sencilla si aplicamos el Teorema de Ptolomeo.

**Ejemplo 1.7.1** Sea  $M$  un punto sobre el arco  $\widehat{CB}$  (el cual no contiene al vértice  $A$ ) de la circunferencia circunscrita al triángulo equilátero  $\triangle ABC$ . Entonces se cumple que  $BM + CM = AM$ .

*Demostración.* Aplicando el Teorema de Ptolomeo en el cuadrilátero cíclico  $ABMC$  tenemos que

$$BC \cdot AM = AB \cdot CM + AC \cdot BM.$$

Como el triángulo es equilátero, dividimos ambos lados de la ecuación por la longitud del lado de éste y obtenemos que  $AM = CM + BM$ .  $\square$

**Ejemplo 1.7.2** Dado un triángulo acutángulo  $\triangle ABC$ , sean  $R$  y  $r$  el circunradio y el inradio, respectivamente. Sea  $O$  el circuncentro y sean  $d_A$ ,  $d_B$ ,  $d_C$ , las distancias de  $O$  a los lados  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$ , respectivamente. Demuestra que  $d_A + d_B + d_C = R + r$ .

*Demostración.* Sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  los pies de las perpendiculares desde  $O$  hacia los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Observemos que el cuadrilátero  $BDOF$  es cíclico, entonces, aplicando el Teorema de Ptolomeo, tenemos  $BO \cdot DF = BD \cdot FO + BF \cdot DO$ , es decir

$$R \cdot \frac{b}{2} = \frac{a}{2} \cdot d_C + \frac{c}{2} \cdot d_A. \quad (1)$$

Análogamente,

$$R \cdot \frac{c}{2} = \frac{a}{2} \cdot d_B + \frac{b}{2} \cdot d_A, \quad (2)$$

y

$$R \cdot \frac{a}{2} = \frac{b}{2} \cdot d_C + \frac{c}{2} \cdot d_B. \quad (3)$$

Sumando (1), (2) y (3) obtenemos

$$R \left( \frac{a}{2} + \frac{b}{2} + \frac{c}{2} \right) = d_A \left( \frac{b}{2} + \frac{c}{2} \right) + d_B \left( \frac{a}{2} + \frac{c}{2} \right) + d_C \left( \frac{a}{2} + \frac{b}{2} \right).$$

Equivalentemente

$$R \cdot s = s(d_A + d_B + d_C) - \left( \frac{a}{2} \cdot d_A + \frac{b}{2} \cdot d_B + \frac{c}{2} \cdot d_C \right),$$

es decir


$$R \cdot s = s(d_A + d_B + d_C) - (|BOC| + |COA| + |AOB|),$$

$$R \cdot s = s(d_A + d_B + d_C) - |ABC|,$$

donde  $s = \frac{a+b+c}{2}$ . Como el área del triángulo se obtiene mediante la expresión  $s \cdot r$ , lo cual puede verse dividiendo al triángulo en tres triángulos más pequeños los cuales tienen altura  $r$ , tenemos que

$$R \cdot s = s(d_A + d_B + d_C) - s \cdot r.$$

De esta última igualdad se obtiene la expresión deseada.  $\square$



Si el triángulo es obtusángulo, por ejemplo  $\angle BAC > 90^\circ$ , entonces se cumple que  $d_B + d_C - d_A = R + r$ . La demostración es análoga a la que acabamos de ver.

### 1.7.1. Problemas

**Problema 1.88** Sea  $T$  un punto sobre el arco  $\widehat{CD}$  de la circunferencia circunscrita a un cuadrado  $ABCD$ . Demuestra que

$$TA + TC = \sqrt{2} \cdot TB.$$

**Problema 1.89** Dado un triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $I$  su incentro y  $L$  el punto donde la línea  $AI$  interseca al circuncírculo. Demuestra que

$$\frac{AL}{LI} = \frac{AB + AC}{BC}.$$

**Problema 1.90** El triángulo isósceles  $\triangle ABC$  ( $AB = AC$ ) está inscrito en una circunferencia. Sea  $P$  un punto en el arco  $\widehat{BC}$ . Demuestra que

$$\frac{PA}{PB + PC} = \frac{AC}{BC}.$$

**Problema 1.91** Una circunferencia pasa por el vértice  $A$  de un paralelogramo  $ABCD$  e interseca los lados  $AB$  y  $AD$  en los puntos  $P$  y  $R$ , respectivamente, y a la diagonal  $AC$  en el punto  $Q$ . Demuestra que  $AQ \cdot AC = AP \cdot AB + AR \cdot AD$ .

**Problema 1.92** Sea  $A_0A_1 \dots A_{3n-1}$  un  $3n$ -ágono regular inscrito en una circunferencia. Desde un punto  $P$ , sobre la circunferencia, se trazan las cuerdas a los  $3n$  vértices. Demuestra que la suma de las longitudes de las  $n$  cuerdas más grandes es igual a la suma de las longitudes de las restantes  $2n$  cuerdas.

**Problema 1.93** Dado un heptágono regular  $ABCDEFG$  de lado 1, demuestra que las diagonales  $AC$  y  $AD$  verifican

$$\frac{1}{AC} + \frac{1}{AD} = 1.$$

**Problema 1.94** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero cíclico y sean  $x, y$  y  $z$  las distancias desde  $A$  hacia las líneas  $BD, BC, CD$ , respectivamente. Demuestra que

$$\frac{BD}{x} = \frac{BC}{y} + \frac{CD}{z}.$$

**Problema 1.95** Sea  $\mathcal{P}$  un pentágono cíclico. Considera una triangulación de  $\mathcal{P}$ , es decir, la descomposición de  $\mathcal{P}$  en tres triángulos disjuntos con vértices en los vértices de  $\mathcal{P}$ . Ahora, considera la suma de los inradios de los triángulos en los cuales queda dividido  $\mathcal{P}$ . Demuestra que esta suma no depende de la triangulación escogida.

**Problema 1.96** Teorema de Casey. Sean  $C_1, C_2, C_3, C_4$  cuatro círculos los cuales son tangentes a una circunferencia  $\Gamma$ , todos ellos tangentes internamente o todos ellos tangentes externamente, y dispuestos en forma cíclica. Denotemos por  $t_{ij}$  la tangente externa común a las circunferencias  $C_i$  y  $C_j$ . Entonces

$$t_{12} \cdot t_{34} + t_{23} \cdot t_{41} = t_{13} \cdot t_{24}.$$


Recíprocamente, si las circunferencias están localizadas de manera que

$$\pm t_{12} \cdot t_{34} \pm t_{23} \cdot t_{41} \pm t_{13} \cdot t_{24} = 0,$$

para alguna combinación de los signos  $+$  y  $-$ , entonces existe una circunferencia la cual toca a todos los círculos, siendo los contactos todos internos o todos externos.

## 1.8. Potencia de un punto con respecto a una circunferencia

Consideremos un punto  $P$  y una circunferencia  $\Omega$  de centro  $O$  y radio  $r$ . El número  $(OP)^2 - r^2$  se conoce como *la potencia* de  $P$  con respecto a  $\Omega$ . Notemos que la potencia de un punto dado  $P$  es positiva, cero, o negativa, dependiendo de si el punto se encuentra fuera, sobre, o dentro de la circunferencia. De ahora en adelante no nos preocuparemos por el signo de la potencia, ya que para muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en una olimpiada de matemáticas sólo nos interesa el valor absoluto de ésta. Sin embargo, si es importante notar la relación que existe entre la potencia de un punto dado  $P$  y el producto de las longitudes de ciertos segmentos sobre las líneas que pasan por  $P$ .



**Teorema 1.8.1** Sea  $\Omega$  una circunferencia de centro  $O$  y radio  $r$  y sea  $P$  un punto en el plano. Si una línea por  $P$  interseca a  $\Omega$  en  $A$  y  $B$ , entonces el valor absoluto de la potencia de  $P$  es igual al producto de las longitudes de los segmentos  $PA$  y  $PB$ .


*Demostración.* Demostraremos el teorema para cada uno de los casos siguientes.

- I. El punto  $P$  está sobre la circunferencia. Claramente la potencia es cero ya que  $OP = r$ . Para cada línea por  $P$  tenemos que alguno de los segmentos  $PA$  o  $PB$ , mencionados en el enunciado del teorema, tiene longitud 0, entonces el producto  $PA \cdot PB = 0$ .
- II. El punto  $P$  está en el interior de  $\Omega$ . Sean  $AB$  y  $CD$  dos cuerdas arbitrarias que pasan por el punto  $P$ . Tracemos  $CA$  y  $BD$ . Tenemos que  $\angle ACD = \angle ABD$  porque ambos son ángulos inscritos que intersecan el mismo arco,

análogamente  $\angle CAB = \angle CDB$ , de aquí que el triángulo  $\triangle APC$  es semejante al triángulo  $\triangle DPB$  de donde se obtiene que

$$\frac{AP}{PD} = \frac{PC}{PB} \implies AP \cdot PB = CP \cdot PD.$$

De manera particular, si  $CD$  es un diámetro de  $\Omega$  tenemos lo siguiente: supongamos que el segmento  $CP$  contiene al punto  $O$ , entonces  $CP = CO + OP = r + OP$  y  $PD = DO - PO = r - PO$ , lo cual muestra que la potencia es constante para todas las cuerdas que pasen por  $P$ .




- III. El punto  $P$  está en el exterior de la circunferencia. Sean  $PB$  y  $PD$  dos secantes arbitrarias trazadas desde  $P$ , las cuales intersecan a la circunferencia, además de en  $B$  y  $D$ , en los puntos  $A$  y  $C$ , como se muestra en la figura. Tracemos  $CA$  y  $BD$ . Tenemos que  $\angle ACP = \angle ABD = \alpha$ , ya que el cuadrilátero  $ABDC$  es cíclico. Por la misma razón,  $\angle CAP = \angle BDC = \beta$ , de aquí que el triángulo  $\triangle APC$  es semejante al triángulo  $\triangle DPB$  de donde se obtiene que

$$\frac{AP}{PD} = \frac{PC}{PB} \implies AP \cdot PB = CP \cdot PD.$$

Como en el caso anterior, consideremos que  $CD$  es un diámetro de  $\Omega$ . De nuevo, es fácil ver que  $PC \cdot PD = (PO)^2 - r^2$ , es decir, el producto  $PA \cdot PB$  es igual a la potencia de  $P$  con respecto a  $\Omega$ .<sup>9</sup>  $\square$

<sup>9</sup>Falta demostrar que el valor de la potencia también es igual al cuadrado de la longitud del segmento tangente  $PM$ , pero esto se deja como ejercicio.






De ahora en adelante, cuando consideremos la potencia de un punto, nos estaremos refiriendo al valor absoluto de ésta. Mediante algunos ejemplos, veremos como la potencia de un punto nos puede ayudar a solucionar algunos problemas en los que aparentemente no tiene relación.


**Ejemplo 1.8.1** *Está dado un ángulo con vértice  $O$  y una circunferencia inscrita en él, la cual toca sus lados en los puntos  $A$  y  $B$ . Por el punto  $A$  se traza una línea paralela a  $OB$  la cual interseca a la circunferencia en el punto  $C$ . El segmento  $OC$  interseca la circunferencia en el punto  $E$ . Las líneas  $AE$  y  $OB$  se intersecan en el punto  $K$ . Demuestra que  $OK = KB$ .*

*Demostración.* Demostrar que  $OK = KB$  es equivalente a demostrar que  $OK^2 = KB^2$ . Como  $KB^2$  es la potencia del punto  $K$  a la circunferencia tenemos que  $KB^2 = KE \cdot KA$  (esto se deja como ejercicio). Sólo falta calcular  $OK^2$ , y para esto tenemos que  $\angle OAK = \angle ACE = \alpha$ , ya que ambos ángulos intersecan el arco  $\widehat{EA}$ ; además  $\angle EOK = \angle ACE$ , por ser  $AC$  y  $OK$  paralelos. Tenemos entonces que  $\triangle EOK \sim \triangle OAK$  de donde obtenemos que  $OK^2 = KE \cdot KA$  y como ya habíamos encontrado que  $KB^2 = KE \cdot KA$  tenemos que  $OK^2 = KB^2$ , es decir,  $OK = KB$ .  $\square$



**Ejemplo 1.8.2** La circunferencia inscrita en el triángulo  $\triangle ABC$  es tangente a los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$  en los puntos  $D$ ,  $E$  y  $F$ , respectivamente.  $AD$  corta la circunferencia en un segundo punto  $Q$ . Demuestra que la recta  $EQ$  pasa por el punto medio de  $AF$  si y sólo si  $AC = BC$ .

*Demostración.* De manera análoga a la solución del ejemplo anterior, tenemos que  $M$  es el punto medio de  $AF$  si y sólo si  $\angle MAQ = \angle AEM$  ( $\beta = \alpha$ ).




Por otro lado, sabemos que  $\angle EDQ = \angle AEM$  (inscrito y semi-inscrito que intersecan el mismo arco), entonces  $M$  será el punto medio de  $AF$  si y sólo si

$\angle MAQ = \angle EDQ$ . Es decir,  $M$  es el punto medio de  $AF$  si y sólo si  $ED \parallel AB$ . Pero esto último es cierto si y sólo si  $AC = BC$ .  $\square$


**Definición 1.8.1** Dadas dos circunferencias, consideremos el conjunto de puntos que tienen la misma potencia con respecto a ambas. A este conjunto se le denomina eje radical.

Mostraremos que el eje radical es una línea recta. Consideremos primero el caso cuando las dos circunferencias se cortan en dos puntos:




Es muy fácil ver que cualquier punto sobre la línea que pasa por  $A$  y  $B$  tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Pero, ¿cómo sabemos que no hay más puntos, además de los de esta línea, que pertenezcan al eje radical? Como veremos ahora, no existe ningún punto fuera de la recta el cual tenga la misma potencia con respecto a  $C_1$  y  $C_2$ . Supongamos que  $P$  tiene la misma potencia con respecto a  $C_1$  y  $C_2$  y consideremos la línea que pasa por  $P$  y  $A$ . Esta línea interseca a  $C_1$  y  $C_2$  por segunda vez en  $C$  y  $D$ , respectivamente. Tenemos que la potencia de  $P$  con respecto a  $C_1$  es  $PA \cdot PC$  y la potencia de  $P$  con respecto a  $C_2$  es  $PA \cdot PD$ , pero  $PC \neq PD$ , por lo tanto  $P$  no pertenece al eje radical.

Si las dos circunferencias son tangentes en un punto entonces el eje radical es la línea tangente que pasa por el punto común:




Por otro lado, si las dos circunferencias no se intersecan, se puede probar que el eje radical es la recta que pasa por los puntos medios de las tangentes exteriores comunes<sup>10</sup>.




**Teorema 1.8.2** *Dadas tres circunferencias cuyos centros no están alineados, los tres ejes radicales (uno por cada par de circunferencias) se intersecan en un punto. Este punto es llamado el centro radical de las circunferencias.*

*Demostración.* Sean  $C_1, C_2$  y  $C_3$  las circunferencias dadas y sea  $P$  el punto donde se intersecan los ejes radicales de  $C_1$  y  $C_2$ , y  $C_1$  y  $C_3$ , respectivamente. De aquí es claro que  $P$  tiene la misma potencia con respecto a  $C_1, C_2$  y  $C_1, C_3$ , en particular,  $P$  tiene la misma potencia con respecto a  $C_2$  y  $C_3$ . Se sigue que  $P$  pertenece al eje radical de  $C_2$  y  $C_3$ .  $\square$

<sup>10</sup>Esto se deja como ejercicio para el lector.




Utilizando este teorema podemos dar una manera de construir el eje radical de dos circunferencias que no se intersecan. Por ejemplo, para encontrar el eje radical de  $C_1$  y  $C_2$  trazamos dos circunferencias ( $C_3$  y  $C_4$ ) cada una de las cuales interseque a  $C_1$  y  $C_2$ . Tenemos que el centro radical de  $C_1$ ,  $C_2$  y  $C_3$  es  $P$ , y el centro radical de  $C_1$ ,  $C_2$  y  $C_4$  es  $Q$ . Como  $P$  y  $Q$  tienen la misma potencia con respecto a  $C_1$  y  $C_2$  tenemos que el eje radical de  $C_1$  y  $C_2$  es la línea que pasa por  $P$  y  $Q$ .




**Ejemplo 1.8.3** Una línea paralela al lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  corta a  $AB$  en  $F$  y a  $AC$  en  $E$ . Demuestra que las circunferencias que tienen como diámetros a  $BE$  y a  $CF$  se cortan en un punto que cae en la altura del triángulo  $\triangle ABC$  bajada desde el vértice  $A$ .

*Demostración.* Sean  $C_1$  y  $C_2$  las circunferencias de diámetros  $BE$  y  $CF$ , respectivamente. Supongamos que  $C_1$  interseca a  $AC$  de nuevo en  $L$  y que  $C_2$  interseca a  $AB$  de nuevo en  $K$ . Sean  $P$  y  $Q$  los puntos de intersección de estas circunferencias. Debido a que  $BE$  es diámetro de  $C_1$  tenemos que  $\angle BLE = 90^\circ$ , de la misma manera tenemos que  $\angle CKF = 90^\circ$ , y con esto tenemos que el cuadrilátero  $BKLC$  es cíclico. Denotemos la circunferencia circunscrita de  $BKLC$  por  $C_3$ . Tenemos que la línea  $BL$  es el eje radical de  $C_1$  y  $C_3$ , además, la línea  $CK$  es el eje radical de  $C_2$  y  $C_3$ . Tenemos que estos ejes radicales se intersecan en el ortocentro del triángulo (el punto donde concurren las alturas,  $H$ ), y por el Teorema 1.6.2 tenemos que el eje radical de  $C_1$  y  $C_2$  también debe pasar por  $H$ . Como el eje radical de  $C_1$  y  $C_2$  es precisamente la línea  $PQ$ , tenemos que  $PQ$  pasa por  $H$ , además, como sabemos que la línea que une los centros de dos circunferencias es perpendicular a su eje radical (esto se deja como ejercicio), tenemos entonces que  $PQ$  es perpendicular a  $MN$ . Por otro lado, como  $M$  y  $N$  son puntos medios de  $BE$  y  $CF$ , además, como  $EF \parallel BC$ , concluimos que los puntos  $P$  y  $Q$  están sobre la línea que contiene la altura desde el vértice  $A$ .  $\square$




## 1.8.1. Problemas


**Problema 1.97** En la siguiente figura están trazadas una secante y una tangente que intersecan la circunferencia en los puntos  $A$ ,  $B$  y  $M$ . Demuestra que  $PM^2 = PA \cdot PB$ .



**Problema 1.98** En la siguiente figura, desde un vértice del cuadrado está trazada una tangente la cual tiene una longitud igual al doble del lado del cuadrado. Encuentra el radio de la circunferencia en función del lado del cuadrado.



**Problema 1.99** En la siguiente figura  $AB = AD = 5$ ,  $BC = 9$  y  $AC = 7$ . Encuentra  $\frac{BD}{DC}$ .



**Problema 1.100** Demuestra que el eje radical de dos circunferencias, donde ninguna de ellas contiene a la otra, es la recta que pasa por los puntos medios de los segmentos tangentes comunes.

**Problema 1.101** Demuestra que el eje radical de dos circunferencias es perpendicular a la línea de los centros <sup>11</sup>.

**Problema 1.102** Por un punto sobre el eje radical de dos circunferencias dibujamos secantes a cada una de éstas. Estas secantes determinan cuatro puntos sobre las circunferencias. Demuestra que esos puntos forman un cuadrilátero cíclico.

**Problema 1.103** Sea  $BD$  la bisectriz del ángulo  $\angle ABC$  del triángulo  $\triangle ABC$ . El circuncírculo del triángulo  $\triangle BDC$  interseca a  $AB$  en  $E$  y el circuncírculo del triángulo  $\triangle ABD$  interseca a  $BC$  en  $F$ . Demuestra que  $AE = CF$ .

**Problema 1.104** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo arbitrario y sea  $P$  un punto fijo en el plano. Las líneas  $AP$ ,  $BP$  y  $CP$  intersecan por segunda vez a la circunferencia circunscrita del triángulo  $\triangle ABC$  en los puntos  $A_1$ ,  $B_1$  y  $C_1$ , respectivamente. Consideremos dos circunferencias, una que pasa por  $A$  y  $A_1$  y otra que pasa por  $B$  y  $B_1$ . Sean  $D$  y  $D_1$  los extremos de la cuerda común de estas circunferencias. Demuestra que  $C$ ,  $C_1$ ,  $D$  y  $D_1$  se hallan en una misma circunferencia.

**Problema 1.105** Una circunferencia de centro  $O$  pasa por los vértices  $A$  y  $C$  de un triángulo  $\triangle ABC$  y corta los segmentos  $AB$  y  $BC$  nuevamente en distintos puntos  $K$  y  $N$ , respectivamente. Las circunferencias circunscritas a los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle KBN$  se cortan exactamente en dos puntos distintos  $B$  y  $M$ . Demuestra que el ángulo  $\angle OMB$  es un ángulo recto.

**Problema 1.106** Sea  $C$  un punto sobre un semicírculo de diámetro  $AB$  y sea  $D$  el punto medio del arco  $\widehat{AC}$ . Sea  $E$  la proyección del punto  $D$  sobre la línea  $BC$  y sea  $F$  la intersección de la línea  $AE$  con el semicírculo. Demuestra que  $BF$  bisecta al segmento  $DE$ .

<sup>11</sup>Se llama línea de los centros a la línea que pasa por los centros de dos circunferencias.



**Problema 1.107** Teorema de Haruki. Sean  $AB$  y  $CD$  dos cuerdas sobre una circunferencia las cuales no se intersecan y sea  $P$  un punto variable sobre el arco  $\widehat{AB}$ , el cual no contiene los puntos  $C$  y  $D$ . Sean  $E$  y  $F$  las intersecciones de las cuerdas  $PC$ ,  $AB$ , y  $PD$ ,  $AB$ , respectivamente. Entonces el valor de  $\frac{AE \cdot BF}{EF}$  no depende de la posición del punto  $P$ .

**Problema 1.108** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero inscrito en un semicírculo  $\Gamma$  de diámetro  $AB$ . Las líneas  $AC$  y  $BD$  se intersecan en  $E$  y las líneas  $AD$  y  $BC$  en  $F$ . La línea  $EF$  interseca al semicírculo  $\Gamma$  en  $G$  y a la línea  $AB$  en  $H$ . Demuestra que  $E$  es el punto medio del segmento  $GH$  si y sólo si  $G$  es el punto medio del segmento  $FH$ .

**Problema 1.109** Sea  $P$  al punto de intersección de las diagonales  $AC$  y  $BD$  de un cuadrilátero  $ABCD$  inscrito en una circunferencia, y sea  $M$  el punto medio de  $CD$ . La circunferencia que pasa por  $P$  y que es tangente a  $CD$  en  $M$ , corta a  $BD$  y a  $AC$  en los puntos  $Q$  y  $R$ , respectivamente. Se toma un punto  $S$  sobre el segmento  $BD$ , de tal manera que  $BS = DQ$ . Por  $S$  se traza una paralela a  $AB$  que corta a  $AC$  en un punto  $T$ . Demuestra que  $AT = RC$ .

**Problema 1.110** Demuestra que si una circunferencia interseca los lados  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$  del triángulo  $\triangle ABC$  en los puntos  $D, D'$ ;  $E, E'$ ;  $F, F'$ ; respectivamente, entonces

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF'}{F'B} \cdot \frac{BD'}{D'C} \cdot \frac{CE'}{E'A} = 1.$$

**Problema 1.111** En una circunferencia está trazado el diámetro  $AB$  y la cuerda  $CD$  perpendicular a  $AB$ . Una circunferencia arbitraria es tangente a la cuerda  $CD$  y al arco  $BD$ . Demuestra que la longitud del segmento tangente a esta circunferencia, trazado a partir del punto  $A$ , es igual a  $AC$ .

**Problema 1.112** Sea  $O$  el centro de la circunferencia circunscrita de un triángulo  $\triangle ABC$ . La bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  interseca al lado  $BC$  en un punto  $D$ . La línea perpendicular a  $AD$ , a través de su punto medio  $M$ , interseca a la línea  $AO$  en un punto  $N$ . Demuestra que los puntos  $B, C, M$  y  $N$  son concíclicos.

**Problema 1.113** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo acutángulo. Los puntos  $M$  y  $N$  son tomados sobre los lados  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. Los círculos con diámetros  $BN$  y  $CM$  se intersecan en los puntos  $P$  y  $Q$ . Demuestra que  $P$ ,  $Q$  y el ortocentro  $H$ , son colineales.

**Problema 1.114** Dado un punto  $P$ , en el interior del círculo circunscrito a un triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  las proyecciones de  $P$  sobre los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. El triángulo  $\triangle DEF$  es denominado el triángulo pedal del punto  $P$ . Demuestra que el área del triángulo  $\triangle DEF$  se puede calcular como

$$|DEF| = \frac{(R^2 - d^2)}{4R^2} |ABC|,$$

donde  $R$  es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABC$  y  $d$  es la distancia del punto  $P$  al circuncentro de  $\triangle ABC$ . (Teorema de Euler)

El resultado sigue siendo válido si el punto  $P$  está fuera del círculo circunscrito, sólo que en este caso se tiene que

$$|DEF| = \frac{(d^2 - R^2)}{4R^2} |ABC|.$$

**Problema 1.115** Sean  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$  cuatro puntos distintos sobre una línea (en ese orden). Los círculos con diámetros  $AC$  y  $BD$  se intersecan en  $X$  y  $Y$ . La línea  $XY$  interseca  $BC$  en  $Z$ . Sea  $P$  un punto sobre la línea  $XY$ , distinto de  $Z$ . La línea  $CP$  interseca el círculo con diámetro  $AC$  en  $C$  y  $M$ , y la línea  $BP$  interseca el círculo con diámetro  $BD$  en  $B$  y  $N$ . Demuestra que las líneas  $AM$ ,  $DN$  y  $XY$  son concurrentes.

**Problema 1.116** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo acutángulo con ortocentro  $H$  y sea  $W$  un punto sobre el lado  $BC$ . Denotemos por  $M$  y  $N$  los pies de las alturas desde  $B$  y  $C$ , respectivamente. Sea  $\omega_1$  el circuncírculo de  $\triangle BWN$  y sea  $X$  el punto sobre  $\omega_1$  el cual está diametralmente opuesto a  $W$ . Análogamente, denotemos por  $\omega_2$  el circuncírculo de  $\triangle CWM$  y sea  $Y$  el punto sobre  $\omega_2$  el cual está diametralmente opuesto a  $W$ . Demuestra que  $X$ ,  $Y$  y  $H$  son colineales.


## 1.9. Áreas de triángulos y cuadriláteros

Si en un triángulo conocemos la longitud de un lado y la altura trazada hacia éste, es bien sabido que podemos calcular su área simplemente multiplicando ambas magnitudes y después dividiendo entre dos. Sin embargo, existen otras fórmulas para calcular el área, las cuales en muchas ocasiones resultan más útiles, por ejemplo:

**Ejemplo 1.9.1** En el triángulo  $\triangle ABC$ , sabemos que  $AB = c$ ,  $BC = a$  y  $\angle ABC = \alpha$ . Entonces

$$|ABC| = \frac{1}{2}ac \cdot \text{sen } \alpha.$$

*Demostración.* Sea  $h$  la longitud de la altura trazada hacia el lado  $BC$ . Sabemos que  $|ABC| = \frac{1}{2}ah$  y además como  $\frac{h}{c} = \text{sen } \alpha$ , tenemos que  $|ABC| = \frac{1}{2}ac \cdot \text{sen } \alpha$ .  
□



Además, por la Ley de Senos tenemos que

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C} = 2R,$$


donde  $R$  es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo. Utilizando esto y sustituyéndolo en la expresión anterior tenemos que

$$|ABC| = 2R^2 \cdot \text{sen } A \cdot \text{sen } B \cdot \text{sen } C.$$

**Ejemplo 1.9.2** Consideremos un cuadrilátero convexo  $ABCD$  y sea  $P$  el punto de intersección de  $AC$  y  $BD$ . Si sabemos que  $\angle APB = \alpha$ , entonces

$$|ABCD| = \frac{1}{2}AC \cdot BD \cdot \text{sen } \alpha.$$

*Demostración.* Tracemos las perpendiculares desde  $B$  y  $D$  sobre  $AC$ , las cuales intersecan  $AC$  en  $F$  y  $E$ , respectivamente.



Tenemos que

$$|ABCD| = |ABC| + |ADC| = \frac{1}{2}AC \cdot BF + \frac{1}{2}AC \cdot DE$$

$\Rightarrow$

$$|ABCD| = \frac{AC \cdot BP \cdot \text{sen } \alpha + AC \cdot DP \cdot \text{sen } \alpha}{2} = \frac{AC(BP + DP) \cdot \text{sen } \alpha}{2}$$

$\Rightarrow$

$$|ABCD| = \frac{1}{2}AC \cdot BD \cdot \text{sen } \alpha. \quad \square$$

Además, si el cuadrilátero tiene alguna propiedad especial, es posible encontrar otras fórmulas para calcular el área.

**Ejemplo 1.9.3** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero cíclico, y sean  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$ ,  $DA = d$  y  $s = \frac{a+b+c+d}{2}$ . Entonces tenemos que

$$|ABCD| = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}.$$

*Demostración.* Sea  $\angle DAB = \alpha$  y sea  $x = BD$ . Tenemos que

$$|ABCD| = |ABD| + |BCD| = \frac{1}{2}(ad + bc) \cdot \text{sen } \alpha = \frac{1}{2}(ad + bc)\sqrt{1 - \cos^2 \alpha},$$

por otro lado,

$$\begin{aligned} x^2 &= b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos \alpha, \\ x^2 &= a^2 + d^2 - 2ad \cdot \cos \alpha, \end{aligned}$$

⇒

$$\cos \alpha = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2bc + 2ad},$$

⇒

$$|ABCD| = \frac{1}{2}(ad + bc) \sqrt{\frac{(2bc + 2ad)^2 - (a^2 + d^2 - b^2 - c^2)^2}{(2bc + 2ad)^2}},$$

⇒

$$|ABCD| = \frac{\sqrt{(2bc + 2ad + b^2 + c^2 - a^2 - d^2)(2bc + 2ad - b^2 - c^2 + a^2 + d^2)}}{4},$$

⇒

$$|ABCD| = \frac{1}{4} \sqrt{[(b+c)^2 - (a-d)^2][(a+d)^2 - (b-c)^2]},$$

$$|ABCD| = \frac{1}{4} \sqrt{(b+c+d-a)(b+c+a-d)(a+d+c-b)(a+d+b-c)},$$

$$|ABCD| = \sqrt{(s-a)(s-d)(s-b)(s-c)}. \quad \square$$

La fórmula anterior es conocida como *fórmula de Brahmagupta*. Cuando el cuadrilátero se degenera en triángulo, obtenemos la conocida *fórmula de Herón*, por ejemplo, si  $D = A$  entonces tenemos que

$$|ABC| = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s)}.$$

Otro hecho que resulta muy útil en muchos problemas donde aparecen razones de longitudes de segmentos de figuras o razones de áreas es el siguiente:

**Lema 1.9.1** Si dos triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle DEF$  son semejantes, y  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = \lambda$  entonces


$$(a) \quad AB + BC + CA = \lambda(DE + EF + FD).$$

$$(b) \quad |ABC| = \lambda^2 \cdot |DEF|.$$

*Demostración.* La demostración del inciso (a) es clara de la proporción de los lados de los triángulos. Para demostrar (b), notemos que si  $h$  y  $h'$  son las alturas de los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle DEF$ , trazadas hacia los lados  $BC$  y  $EF$ , respectivamente, entonces se cumple que  $\frac{h}{h'} = \lambda$ . Ahora, como  $|DEF| = \frac{EF \cdot h'}{2}$  y  $|ABC| = \frac{BC \cdot h}{2} = \frac{\lambda \cdot EF \cdot \lambda \cdot h'}{2}$ , se sigue que

$$\frac{|ABC|}{|DEF|} = \frac{\frac{\lambda^2 \cdot EF \cdot h'}{2}}{\frac{EF \cdot h'}{2}} = \lambda^2. \square$$

**Ejemplo 1.9.4** Las áreas de los triángulos formados por los segmentos de las diagonales de un trapecio y sus bases son  $S_1$  y  $S_2$ . Hallar el área del trapecio.



*Solución.* En el trapecio  $ABCD$ , sea  $P$  el punto de intersección de las diagonales, y sean  $|DPC| = S_2$ ,  $|APB| = S_1$  y  $\angle DPC = \alpha$ . Tenemos que

$$\sqrt{|APB| \cdot |DPC|} = \frac{1}{2} \sqrt{(AP \cdot PB \cdot \text{sen } \alpha)(DP \cdot PC \cdot \text{sen } \alpha)}$$

$\Rightarrow$

$$\sqrt{|APB| \cdot |DPC|} = \frac{1}{2} \sqrt{(AP \cdot DP \cdot \text{sen } \alpha)(BP \cdot PC \cdot \text{sen } \alpha)}$$

$\Rightarrow$

$$\sqrt{|APB| \cdot |DPC|} = \sqrt{|APD| \cdot |BPC|}$$

pero como  $|APD| = |BPC|$ , tenemos que


$$\sqrt{|APB| \cdot |DPC|} = \sqrt{S_1 \cdot S_2} = |APD| = |BPC|$$

$\Rightarrow$

$$|ABCD| = S_1 + S_2 + 2\sqrt{S_1 \cdot S_2} = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2. \square$$

**Ejemplo 1.9.5** A través de cierto punto tomado dentro del triángulo, se han trazado tres rectas paralelas a sus lados. Estas rectas dividen el área del triángulo en seis partes, tres de las cuales son triángulos con áreas iguales a  $S_1$ ,  $S_2$  y  $S_3$ . Hallar el área del triángulo dado.

*Solución.* Sean  $P$  el punto dado y  $S$  el área del triángulo  $\triangle ABC$ . Sean  $D, E, F, G, H, I$  los puntos donde estas paralelas intersecan a los lados, como se muestra en la figura siguiente.



Los triángulos  $\triangle DEP$ ,  $\triangle FGP$  y  $\triangle HIP$  son semejantes al triángulo  $\triangle ABC$ , además sus lados se relacionan de la siguiente manera:

$$\frac{DE}{BC} = \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S}}, \quad \frac{PF}{BC} = \frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S}}, \quad \frac{IP}{BC} = \frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S}}.$$

También tenemos que  $IP = BD$  y que  $PF = EC$ , y como  $BD + DE + EC = BC$  obtenemos

$$\frac{IP}{BC} + \frac{DE}{BC} + \frac{PF}{BC} = \frac{BD + DE + EC}{BC} = 1 = \frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S}} + \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S}} + \frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S}}.$$


De aquí obtenemos que  $S = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3})^2$ .  $\square$

**Ejemplo 1.9.6** Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de los lados  $AB$  y  $BC$  de un cuadrado  $ABCD$ . Sean  $P$  el punto donde  $AN$  interseca a  $DM$ ,  $Q$  el punto






Si  $BE \parallel AF$  entonces tenemos que  $|ABF| = |AEF| = |AHF| \leq 1/6$ . Ahora, si  $BE$  no es paralelo a  $AF$  entonces tenemos que alguna de  $|ABF| < |AHF| \leq 1/6$  ó  $|AEF| < |AHF| \leq 1/6$  se cumple.




Supongamos ahora que cada dos de los segmentos  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  se intersecan en alguno de los puntos  $G$ ,  $H$  y  $I$ , como se muestra en la siguiente figura. Consideremos la división del hexágono en los triángulos  $\triangle ABH$ ,  $\triangle BCH$ ,  $\triangle CDG$ ,  $\triangle DEG$ ,  $\triangle EFI$ ,  $\triangle FAI$  y  $\triangle GHI$ . Claramente, alguno de los seis triángulos enlistados tiene área menor que  $1/6$ . En cualquier caso, es fácil probar que existe un triángulo cuyos vértices son vértices consecutivos del hexágono y el cual tiene área menor que  $1/6$ .



Ahora, si no existen tres vértices consecutivos que determinen un triángulo de

área menor que  $1/6$ , entonces las diagonales  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  son concurrentes y cada uno de los triángulos  $\triangle ABH$ ,  $\triangle BCH$ ,  $\triangle CDH$ ,  $\triangle DEH$ ,  $\triangle EFH$  y  $\triangle FAH$ , tienen área  $1/6$ . Más aún, tenemos que  $AF$  y  $CD$  son paralelos a  $BE$ ;  $AB$  y  $DE$  son paralelos a  $CF$ ; y  $BC$  y  $EF$  son paralelos a  $AD$ . Se sigue que todos los triángulos  $\triangle ABH$ ,  $\triangle BCH$ ,  $\triangle CDH$ ,  $\triangle DEH$ ,  $\triangle EFH$  y  $\triangle FAH$ , son congruentes.  $\square$




Finalmente, veremos como se puede obtener una solución elegante de un problema difícil el cual trata sobre razones de segmentos. La solución se obtiene mediante un cambio de razones de segmentos por razones de áreas de paralelogramos.

**Ejemplo 1.9.8** Sea  $A_1A_2 \dots A_8$  un octágono convexo, es decir, todos sus ángulos internos son menores que  $180^\circ$ . Sabemos que todos los lados del octágono tienen la misma longitud y que cada par de lados opuestos son paralelos. Para cada  $i = 1, \dots, 8$ , definamos el punto  $B_i$  como la intersección del segmento  $A_iA_{i+4}$  con el segmento  $A_{i-1}A_{i+1}$ , donde  $A_{j+8} = A_j$  y  $B_{j+8} = B_j$ , para todo número entero  $j$ . Demuestra que para algún número  $i$ , de entre los números 1, 2, 3 y 4, se cumple que


$$\frac{A_iA_{i+4}}{B_iB_{i+4}} \leq \frac{3}{2}.$$

*Solución.* Para cada lado del octágono vamos a considerar los tres paralelogramos que se pueden formar con dos de sus lados paralelos a dicho lado y sus otros dos lados paralelos a algún otro lado del octágono. Después, de entre todos esos

paralelogramos, vamos a considerar uno de los que tenga menor área (podría haber más de uno con área mínima). Sin pérdida de generalidad, supongamos que el paralelogramo con área mínima tiene base en el lado  $A_1A_2$ . Entonces los otros dos lados del paralelogramo, no paralelos a  $A_1A_2$ , deben ser paralelos a  $A_3A_2$  ó a  $A_1A_8$ . Para ver que esto debe ser así, notemos lo siguiente:



Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$ , tres puntos de un mismo lado de una línea  $l$  y todos ellos a la misma distancia de un punto  $O$  en  $l$ , como se muestra en la figura. Por  $O$  trazamos la línea  $m$  perpendicular a  $l$ . Tenemos que dos de los puntos deben quedar del mismo lado de  $m$  (o alguno de ellos sobre  $m$ ), supongamos  $B$  y  $C$ . Entonces, de los tres puntos, el que está a menor distancia de  $l$  debe ser  $A$  ó  $C$ . Es decir, no puede ser  $B$ .



Supongamos que  $A_2C_1A_8A_1$  es el paralelogramo de área mínima  $a_1$  y consideremos los paralelogramos  $A_2A_3C_2C_1$ ,  $A_3A_4A_5C_2$ ,  $C_1C_2A_5C_3$ ,  $C_3A_5A_6A_7$  y  $C_1C_3A_7A_8$ , cada uno de ellos con área  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_5$  y  $a_6$ , respectivamente. No-

temos que  $|A_6A_7A_8| + |A_2A_3A_4| = |C_1C_2A_5C_3|$  y que  $|A_4A_5A_6| = |A_2C_1A_8| = \frac{1}{2}|A_2C_1A_8A_1|$ , entonces, no es difícil ver que

$$\frac{A_1A_5}{B_1B_5} = \frac{2a_1 + a_2 + a_3 + a_5 + a_6}{a_2 + a_3 + a_5 + a_6} = 1 + \frac{2a_1}{a_2 + a_3 + a_5 + a_6}.$$

De aquí se obtiene que


$$\frac{A_1A_5}{B_1B_5} \leq 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

□

### 1.9.1. Problemas

**Problema 1.117** Tenemos dos triángulos con un vértice  $A$  común, los demás vértices se encuentran en dos rectas que pasan por  $A$ . Demuestra que la razón entre las áreas de estos triángulos es igual a la razón entre los productos de los dos lados de cada triángulo que contienen el vértice  $A$ .

**Problema 1.118** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero convexo. Sean  $P, Q, R$  y  $S$  los puntos medios de los lados  $AB, BC, CD$  y  $DA$ , respectivamente. Se trazan las líneas  $PR$  y  $QS$  las cuales dividen el cuadrilátero en cuatro cuadriláteros más pequeños cuyas áreas se muestran en la figura. Demuestra que  $a + c = b + d$ .



**Problema 1.119** En el trapecio  $ABCD$ , de bases  $AB$  y  $DC$ , las diagonales se intersectan en el punto  $E$ , el área del  $\triangle ABE$  es 72 y el área del  $\triangle CDE$  es 50. ¿Cuál es el área del trapecio  $ABCD$ ?

**Problema 1.120** Demuestra que  $|ABC| = rs$ , donde  $r$  es el radio de la circunferencia inscrita y  $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$ .

**Problema 1.121** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero convexo y sean  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$ ,  $DA = d$  y  $s = \frac{a+b+c+d}{2}$ . Sean además,  $\alpha$  y  $\beta$  dos ángulos opuestos en el cuadrilátero. Demuestra que

$$|ABCD| = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - \frac{1}{2}abcd(1 + \cos(\alpha + \beta))}.$$

**Problema 1.122** Demuestra que la suma de las distancias, desde cualquier punto interior de un triángulo equilátero, hasta sus lados es igual a la altura de este triángulo.

**Problema 1.123** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo isósceles con  $AB = AC$ . Los puntos  $D$  y  $E$  están sobre los lados  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. La línea que pasa por  $B$  y paralela a  $AC$  interseca la línea  $DE$  en  $F$ . La línea que pasa por  $C$  y paralela a  $AB$  interseca la línea  $DE$  en  $G$ . Demuestra que

$$\frac{|DBCG|}{|FBCE|} = \frac{AD}{AE}.$$

**Problema 1.124** Demuestra que

$$\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} = \frac{1}{r},$$

donde  $h_1, h_2, h_3$  son las alturas del triángulo y  $r$  es el radio de la circunferencia inscrita.

**Problema 1.125** Sobre los catetos  $AC$  y  $BC$  de un triángulo rectángulo hacia el exterior están contruidos los cuadrados  $ACKL$  y  $BCM N$ . Demuestra que el cuadrilátero acotado por los catetos y las rectas  $LB$  y  $NA$  tiene área igual a la del triángulo formado por las rectas  $LB$ ,  $NA$  y la hipotenusa  $AB$ .

**Problema 1.126** Están dados los puntos  $E, F, G, H$ , sobre la continuación de los lados  $AB, BC, CD, DA$ , de un cuadrilátero convexo  $ABCD$ , y son tales que  $BE = AB, CF = BC, DG = CD, AH = DA$ . Demuestra que

$$|EFGH| = 5 \cdot |ABCD|.$$

**Problema 1.127** En los lados  $AC$  y  $BC$  del triángulo  $\triangle ABC$ , hacia el exterior están contruidos dos paralelogramos  $ACDE$  y  $BCFG$ . Las prolongaciones de  $DE$  y  $FG$  se intersecan en el punto  $H$ . Sobre el lado  $AB$  está construido el paralelogramo  $ABML$ , cuyos lados  $AL$  y  $BM$  son iguales y paralelos a  $HC$ . Demuestra que

$$|ABML| = |ACDE| + |BCFG| \quad (\text{Teorema generalizado de Pitágoras}).$$

**Problema 1.128** En un cuadrilátero convexo  $ABCD$ , los puntos medios de los lados  $BC$  y  $DA$  son  $E$  y  $F$ , respectivamente. Demuestra que

$$|EDA| + |FBC| = |ABCD|.$$

**Problema 1.129** Por los extremos de la base menor de un trapecio están trazadas dos rectas paralelas que cortan la base mayor. Las diagonales del trapecio y estas rectas dividen el trapecio en siete triángulos y un pentágono. Demuestra que la suma de las áreas de tres triángulos adyacentes a los lados y a la base menor del trapecio, es igual al área del pentágono.

**Problema 1.130** Sea  $ABCD$  un paralelogramo; el punto  $E$  se halla en la recta  $AB$ ;  $F$ , en la recta  $AD$  ( $B$  en el segmento  $AE$ ;  $D$ , en el segmento  $AF$ ),  $K$  es el punto de intersección de las rectas  $ED$  y  $FB$ . Demuestra que

$$|ABKD| = |CEKF|.$$

**Problema 1.131** Sea  $\mathcal{H}$  un hexágono en cual cada par de lados opuestos son paralelos y de la misma longitud. Sea  $\mathcal{Q}$  un cuadrilátero inscrito en  $\mathcal{H}$  el cual tiene área máxima. Demuestra que

$$\frac{|\mathcal{Q}|}{|\mathcal{H}|} \geq \frac{2}{3}.$$

**Problema 1.132** Dos círculos  $C_1$  y  $C_2$  de radios  $r_1$  y  $r_2$  se intersecan en dos puntos  $A$  y  $B$ . La tangente común de  $C_1$  y  $C_2$ , la cual está más cerca de  $A$ , interseca a  $C_1$  en  $D$  y a  $C_2$  en  $E$ . Demuestra que si la línea  $DB$  es tangente a  $C_2$  en  $B$ , entonces

$$\frac{DB}{BE} = \frac{\sqrt{r_1}}{\sqrt{r_2}}.$$

**Problema 1.133** Considera una circunferencia  $\Gamma$ , un punto  $A$  fuera de  $\Gamma$  y las tangentes  $AB$ ,  $AC$  a  $\Gamma$  desde  $A$ , con  $B$  y  $C$  los puntos de tangencia. Sea  $P$  un punto sobre el segmento  $AB$ , distinto de  $A$  y de  $B$ . Considera el punto  $Q$  sobre el segmento  $AC$  tal que  $PQ$  es tangente a  $\Gamma$ , y a los puntos  $R$  y  $S$  que están sobre las rectas  $AB$  y  $AC$ , respectivamente, de manera que  $RS$  es paralela a  $PQ$  y tangente a  $\Gamma$ . Muestra que el producto de las áreas de los triángulos  $\triangle APQ$  y  $\triangle ARS$  no depende de la elección del punto  $P$ .





---

## Capítulo 2

# Puntos y rectas notables en el triángulo

---


### 2.1. Las medianas y el gravicentro

Dado un triángulo, podemos asociarle varios tipos de líneas las cuales poseen propiedades interesantes e importantes. Quizá la más simple de éstas es la línea que va de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Esta línea es llamada *mediana* del triángulo. La primer propiedad interesante de las medianas es la siguiente:

**Teorema 2.1.1** *Las medianas en un triángulo concurren en un punto y se dividen por éste en la razón 2 : 1, a partir de los vértices.*


*Demostración.* Sean  $CF$  y  $BD$  dos medianas del triángulo  $\triangle ABC$ . Llamemos  $G$  al punto de intersección de estas dos medianas. Por el Teorema de Tales tenemos

que  $FD$  es paralelo a  $BC$ , de aquí se sigue que  $\angle GFD = \angle GCB = \beta$ , ya que son ángulos alternos internos. Análogamente  $\angle GDF = \angle GBC = \alpha$ . Tenemos que el triángulo  $\triangle GDF$  es semejante al triángulo  $\triangle GBC$  y sus lados están en la razón  $1 : 2$ . Con esto tenemos que  $FG = \frac{1}{2}GC$  y  $DG = \frac{1}{2}GB$  y por lo tanto las medianas  $CF$  y  $BD$  se cortan en el punto  $G$  en la razón  $2 : 1$ . Haciendo un análisis similar se puede llegar a que la mediana que no consideramos se interseca con cualesquiera de las dos medianas anteriores en un punto tal que quedan divididas en la razón  $2 : 1$ . Por esta razón tenemos que ese punto de intersección debe ser  $G$ , y de aquí concluimos que las tres medianas se intersecan en un punto. Tal punto es llamado *centroide* (gravicentro, baricentro, centro de gravedad) del triángulo y éste divide a las medianas en la razón  $2 : 1$ , a partir de los vértices.  $\square$



Ahora usaremos este teorema en la resolución de algunos problemas.

**Ejemplo 2.1.1** Sea  $G$  el centroide de un triángulo  $\triangle ABC$ , y sean  $M$ ,  $N$  y  $P$  los centroides de los triángulos  $\triangle BGC$ ,  $\triangle CGA$  y  $\triangle AGB$ , respectivamente. Demuestra que el triángulo  $\triangle MNP$  es semejante al triángulo  $\triangle ABC$ .



*Demostración.* Sean  $D$  y  $E$  los puntos medios de  $BG$  y  $CG$ , respectivamente. Tenemos que  $DE$  es paralelo a  $BC$ , además, como  $AP : PD = AN : NE = 2 : 1$  entonces  $PN$  es paralelo a  $DE$  y consecuentemente a  $BC$ . Análogamente,  $PM$  es paralelo a  $AC$  y  $MN$  es paralelo a  $AB$ . Como tenemos que  $\triangle MNP$  y  $\triangle ABC$  tienen sus lados paralelos, entonces son semejantes.  $\square$

**Ejemplo 2.1.2** Del punto  $M$ , situado en el interior del  $\triangle ABC$ , se trazan perpendiculares a los lados  $BC$ ,  $AC$ ,  $AB$  y en ellas se marcan los segmentos  $MA_1$ ,  $MB_1$  y  $MC_1$  iguales a los correspondientes lados del triángulo. Demuestra que el punto  $M$  es el centro de gravedad del  $\triangle A_1B_1C_1$ .


*Demostración.* Sea  $D$  el punto de intersección de la línea  $A_1M$  y el segmento  $C_1B_1$ . Tenemos que

$$\frac{C_1D}{DB_1} = \frac{|C_1DA_1|}{|B_1DA_1|} = \frac{|C_1DM|}{|B_1DM|} = \frac{|C_1DA_1| - |C_1DM|}{|B_1DA_1| - |B_1DM|},$$

esto es

$$\frac{C_1D}{DB_1} = \frac{|C_1MA_1|}{|B_1MA_1|}.$$

Por otro lado, tenemos que  $|C_1MA_1| = |ABC| = |B_1MA_1|$ , entonces  $C_1D = DB_1$ , es decir  $A_1D$  es una mediana del triángulo  $\triangle A_1B_1C_1$ . Análogamente se demuestra que  $C_1M$  y  $B_1M$  son medianas del triángulo  $\triangle A_1B_1C_1$ , por lo tanto  $M$  es el centroide de éste triángulo.  $\square$



Con lo demostrado anteriormente, tenemos que si  $G$  es un punto interior de un triángulo  $\triangle ABC$ , entonces éste será su centroide si y sólo si  $|ABM| = |BCM| = |CAM|$ .

**Ejemplo 2.1.3** Sea  $G$  el centroide de un triángulo  $\triangle ABC$ . Entonces se cumple que

$$AB^2 + BC^2 + AC^2 = 3(GA^2 + GB^2 + GC^2).$$

*Demostración.* Sean  $m_a, m_b, m_c$  las longitudes de las medianas desde los vértices  $A, B$  y  $C$ . Como sabemos que  $m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$ ,  $m_b = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$  y  $m_c = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$ , tenemos que

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{1}{4}(3a^2 + 3b^2 + 3c^2).$$

Se sigue que

$$a^2 + b^2 + c^2 = \frac{4}{3}(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) = 3(GA^2 + GB^2 + GC^2). \quad \square$$

La fórmula utilizada en esta demostración se deja como ejercicio.

### 2.1.1. Problemas

**Problema 2.1** Demuestra que las medianas dividen el triángulo en seis partes de áreas iguales.


**Problema 2.2** Demuestra que el área del triángulo, cuyos lados son iguales a las medianas de un triángulo dado, es igual a  $\frac{3}{4}$  del área del triángulo dado.

**Problema 2.3** Los lados de un triángulo son  $a, b$  y  $c$ . Demuestra que la longitud de la mediana  $m_a$ , trazada hacia el lado  $BC$ , se calcula por la fórmula

$$m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}.$$

**Problema 2.4** Demuestra que si en un triángulo dos medianas son iguales entonces el triángulo es isósceles.

**Problema 2.5** En un triángulo  $\triangle ABC$  se dibuja una línea que pasa por el centroide de éste. Se dibujan perpendiculares desde cada uno de los vértices del triángulo hacia esa línea, las cuales la intersecan en los puntos que se muestran en la figura siguiente. Demuestra que  $CY = AX + BZ$ .



**Problema 2.6** En un cuadrilátero convexo definiremos una mediana como la línea que une un vértice con el centroide del triángulo formado por los tres vértices restantes. Demuestra que las cuatro medianas en un cuadrilátero se intersecan en un punto y que además se dividen por éste en la razón 3 : 1.

**Problema 2.7** En un triángulo  $\triangle ABC$  con medianas  $AD$ ,  $BE$ , y  $CF$ , sea  $m = AD + BE + CF$ , y sea  $s = AB + BC + CA$ . Demuestra que

$$\frac{3}{2}s > m > \frac{3}{4}s.$$

**Problema 2.8** Demuestra que si en un triángulo se cumple que

$$m_a^2 + m_b^2 = 5m_c^2$$

entonces éste es un triángulo rectángulo.

**Problema 2.9** En los lados  $CA$  y  $CB$  del triángulo  $\triangle ABC$ , fuera de él se construyen los cuadrados  $CAA_1C_1$  y  $CBB_1C_2$ . Demuestra que la mediana del triángulo  $\triangle CC_1C_2$  trazada por el vértice  $C$  es perpendicular al lado  $AB$  e igual a la mitad de su longitud.

**Problema 2.10** En los lados del triángulo, fuera de él, están contruidos los triángulos equiláteros  $\triangle ABC_1$ ,  $\triangle BA_1C$  y  $\triangle CAB_1$ . Demuestra que los centroides de los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle A_1B_1C_1$  coinciden.

**Problema 2.11** Teorema de Leibniz. Supongamos que  $M$  es un punto arbitrario del plano,  $G$  el centroide del triángulo  $\triangle ABC$ . Entonces se cumple la igualdad


$$3MG^2 = MA^2 + MB^2 + MC^2 - \frac{1}{3}(AB^2 + BC^2 + CA^2)$$

**Problema 2.12** Consideremos el triángulo  $\triangle ABC$ . Sea  $E$  un punto sobre la mediana desde el vértice  $C$ . Una circunferencia a través de  $E$  toca al lado  $AB$  en  $A$  e interseca a  $AC$  de nuevo en  $M$ . Otra circunferencia a través de  $E$  toca a  $AB$  en  $B$  e interseca a  $BC$  de nuevo en  $N$ . Demuestra que el circuncírculo del triángulo  $\triangle CMN$  es tangente a las dos circunferencias anteriores.

## 2.2. Las bisectrices y el incentro

La recta que estudiaremos en esta sección tiene muchas propiedades interesantes. Esta recta es la *bisectriz* (interior) de un ángulo y se define como el conjunto de puntos en el interior del ángulo los cuales equidistan de los lados de éste. Es muy sencillo ver que efectivamente este conjunto de puntos es una línea recta y que además ésta divide al ángulo en dos ángulos de la misma magnitud. De la misma manera que lo hicimos en la sección anterior, la primera propiedad que veremos es sobre la concurrencia de las tres bisectrices interiores de un triángulo.

**Teorema 2.2.1** Las bisectrices de los ángulos internos de un triángulo concurren en un punto, el cual es conocido como incentro y es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo.



*Demostración.* Sean  $D$  y  $E$  los puntos donde las bisectrices internas de los ángulos  $\angle BAC$  y  $\angle BCA$  cortan a los lados  $BC$  y  $AB$ , y sea  $I$  el punto de intersección de los segmentos  $AD$  y  $CE$ . Como  $AD$  bisecta al  $\angle BAC$  entonces  $I$  equidista de los lados  $AB$  y  $AC$ ; además como  $I$  también pertenece al segmento  $CE$ , el cual bisecta al  $\angle BCA$ , entonces  $I$  equidista de los lados  $BC$  y  $AC$ . Como  $I$  equidista de los lados  $AB$  y  $BC$  entonces la bisectriz del  $\angle ABC$  también pasa por el punto  $I$ , por lo que las tres bisectrices concurren en este punto. Es claro que podemos trazar una circunferencia que sea tangente a los tres lados del triángulo y que tenga como centro al punto  $I$ .  $\square$


**Ejemplo 2.2.1** Sea  $D$  el punto donde la bisectriz del  $\angle BAC$  de un triángulo corta al lado  $BC$ , y sean  $a$ ,  $b$  y  $c$  los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Demuestra que

$$BD = \frac{ac}{b+c}.$$

*Demostración.* Un truco muy bonito y el cual puede ser muy útil en la mayoría de los problemas donde tenemos una suma de distancias, es el construir esa distancia. Por ejemplo, en nuestro problema necesitamos construir la distancia  $b+c$ . Prolonguemos  $CA$  hasta un punto  $F$  de tal manera que  $AF = AB = c$ , tenemos entonces que el triángulo  $\triangle FAB$  es un triángulo isósceles. Sea  $\angle BAC = 2\alpha$ , como  $\angle BFA + \angle ABF = 2\alpha$  tenemos que  $\angle BFA = \angle ABF = \alpha$ , esto implica

que  $FB$  es paralelo a  $AD$ . Ahora, por el Teorema de Tales tenemos que

$$\frac{BD}{FA} = \frac{BC}{FC} \implies BD = \frac{BC \cdot FA}{FC} = \frac{ac}{b+c}. \quad \square$$




**Ejemplo 2.2.2** Sean  $a$ ,  $b$  y  $c$  las longitudes de los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , de un triángulo  $\triangle ABC$ . Sean  $I$  el incentro y  $D$  el punto donde la bisectriz del  $\angle BAC$  corta al lado  $BC$ . Demuestra que

$$\frac{AI}{ID} = \frac{b+c}{a}.$$

*Demostración.* Por  $A$  trazamos una paralela a  $BC$ . Las bisectrices de  $\angle B$  y  $\angle C$  intersecan a esta paralela en  $N$  y  $M$ , respectivamente. Como  $\angle AMC = \angle ACM = \beta$  tenemos  $AM = AC = b$ . Análogamente,  $AN = AB = c$ . Además, tenemos que  $\triangle IMN \sim \triangle ICB$ , esto implica que

$$\frac{AI}{ID} = \frac{MN}{BC} = \frac{b+c}{a}. \quad \square$$






El resultado del siguiente ejemplo tiene una gran utilidad en la solución de problemas donde intervienen simultáneamente la circunferencia inscrita y la circunferencia circunscrita.


**Ejemplo 2.2.3** Sea  $I$  el incentro de un triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle BIC$  está sobre la línea  $AI$ .

*Demostración.* Sea  $L$  el punto donde la bisectriz del  $\angle A$  interseca al circuncírculo, entonces  $L$  es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle BIC$ . Para probar esto basta demostrar que  $LB = LI = LC$ . Tenemos que  $LB = LC$ , por ser cuerdas de arcos iguales. Por otro lado, tenemos que  $\angle BIL = \angle BAI + \angle ABI = \alpha + \beta$ , además tenemos que  $\angle CBL = \angle CAL = \alpha$  y con esto llegamos a que  $\angle IBL = \alpha + \beta$ . Hemos demostrado entonces, que el triángulo  $\triangle BIL$  es isósceles y con esto tenemos que  $LB = LI = LC$ .  $\square$



**Ejemplo 2.2.4** Sean  $M$ ,  $N$ , y  $P$ , los puntos medios de los arcos  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente, de la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABC$ .  $MP$  y  $MN$  intersecan en  $D$  y  $E$  a los lados  $AB$  y  $AC$ . Demuestra que  $DE$  es paralela a  $BC$  y que pasa por el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ .

*Demostración.* Sea  $I$  el incentro del triángulo. Usando el resultado del ejemplo anterior, tenemos que  $PB = PI$  y  $MB = MI$ . Con esto tenemos que  $MP$  es perpendicular a  $BI$  la mediatriz de  $BI$ , lo que implica que  $BD = DI$  y  $\angle DBI = \angle DIB = \angle IBC$ , es decir,  $DI$  es paralela a  $BC$ . Análogamente, se demuestra que  $EI$  es paralela a  $BC$ . Por lo tanto,  $DE$  es paralela a  $BC$  y pasa por el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ .  $\square$



### 2.2.1. Problemas

**Problema 2.13** Demuestra que la bisectriz del ángulo recto de un triángulo rectángulo divide por la mitad el ángulo entre la mediana y la altura bajadas sobre la hipotenusa.

**Problema 2.14** Sea  $I$  el incentro de un triángulo  $\triangle ABC$ . Sea  $\angle BAC = \alpha$ .

Demuestra que


$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}.$$

**Problema 2.15** El cuadrilátero  $ABCD$  está circunscrito a una circunferencia con centro  $O$ . Demuestra que

$$\angle AOB + \angle COD = 180^\circ.$$

**Problema 2.16** Se da una circunferencia y un punto  $A$  fuera de ésta.  $AB$  y  $AC$  son tangentes a la circunferencia ( $B$  y  $C$  son los puntos de tangencia). Demuestra que el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo  $\triangle ABC$  se halla en la circunferencia dada.

**Problema 2.17** La bisectriz interior de  $\angle B$  y la bisectriz exterior de  $\angle C$  de un  $\triangle ABC$  se intersectan en  $D$ . A través de  $D$  se traza una línea paralela a  $BC$  la cual interseca  $AC$  en  $L$  y  $AB$  en  $M$ . Si las longitudes de  $LC$  y  $MB$  son 5 y 7, respectivamente, encuentra la longitud de  $LM$ .




**Problema 2.18** En un triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $E$  y  $D$  puntos sobre los lados  $AB$  y  $AC$ , respectivamente.  $BF$  bisecta el  $\angle ABD$ , y  $CF$  bisecta  $\angle ACE$ . Demuestra que  $\angle BEC + \angle BDC = 2\angle BFC$ .

**Problema 2.19** Sea  $r$  el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo  $\triangle ABC$  con ángulo recto en  $C$ . Sean  $AB = c$ ,  $BC = a$  y  $CA = b$ . Demuestra que

$$r = \frac{a + b - c}{2}.$$

**Problema 2.20** Sea  $D$  un punto en el lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que los incírculos de los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle ADC$  son tangentes entre sí, si y sólo si,  $D$  es el punto de tangencia del incírculo del triángulo  $\triangle ABC$ .



**Problema 2.21** Sobre la base  $AC$  del triángulo isósceles  $\triangle ABC$  se toma un punto  $M$  de manera que  $AM = a$ ,  $MC = b$ . En los triángulos  $\triangle ABM$  y  $\triangle CBM$  están inscritas circunferencias. Encuentra la distancia entre los puntos de tangencia del lado  $BM$  con estas circunferencias.

**Problema 2.22** Sea  $AD$  la bisectriz del  $\angle BAC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

**Problema 2.23** En un triángulo  $\triangle ABC$  sea  $D$  el punto donde la bisectriz interior del ángulo  $\angle BCA$  interseca al lado  $AB$ . Si  $CD = \ell$ ,  $CB = a$ ,  $CA = b$  y  $2\alpha$  es la medida del ángulo  $\angle BCA$ , demuestra que

$$\ell = \frac{2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \alpha}{a + b}.$$

**Problema 2.24** La bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  interseca al lado  $BC$  en un punto  $D$  y al circuncírculo en un punto  $L$ . Sean  $\ell_D = AD$  y  $\ell_L = AL$ . Demuestra que  $\ell_D \cdot \ell_L = b \cdot c$ .

**Problema 2.25** Sean  $a, b$  y  $c$  las longitudes de los lados  $BC, CA$  y  $AB$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Sean  $I$  el incentro y  $G$  el gravicentro del triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $IG$  es paralelo a  $BC$  si y sólo si  $2a = b + c$ .

**Problema 2.26** Las bisectrices de los ángulos  $A$  y  $B$  del triángulo  $\triangle ABC$  intersecan los lados  $BC$  y  $CA$  en los puntos  $D$  y  $E$ , respectivamente. Si se cumple que  $AE + BD = AB$ , determina el ángulo  $C$ .

**Problema 2.27** En un triángulo  $\triangle ABC$ ,  $\angle BAC = 60^\circ$  y las bisectrices  $BB'$  y  $CC'$  se intersecan en  $I$ , donde  $B'$  está sobre  $AC$  y  $C'$  está sobre  $AB$ . Demuestra que  $IB' = IC'$ .

**Problema 2.28** Demuestra que las cuatro proyecciones del vértice  $A$  del triángulo  $\triangle ABC$  sobre las bisectrices exteriores e interiores de los ángulos  $\angle B$  y  $\angle C$  son colineales.

**Problema 2.29** En los lados opuestos  $BC$  y  $DA$  de un cuadrilátero convexo se toman los puntos  $M$  y  $N$ , de tal manera que

$$BM : MC = AN : ND = AB : CD.$$

Demuestra que la recta  $MN$  es paralela a la bisectriz del ángulo formado por los lados  $AB$  y  $CD$ .

**Problema 2.30** En los rayos  $AB$  y  $CB$  del triángulo  $\triangle ABC$  están trazados los segmentos  $AM$  y  $CN$  de tal manera que  $AM = CN = p$ , donde  $p$  es el semiperímetro del triángulo ( $B$  se halla entre  $A$  y  $M$ , así como entre  $C$  y  $N$ ). Sea  $K$  el punto de la circunferencia circunscrita el cual es diametralmente opuesto a  $B$ . Demuestra que la perpendicular trazada desde  $K$  sobre  $MN$  pasa por el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ .

**Problema 2.31** Sea  $BC$  el diámetro de una circunferencia  $\Gamma$  que tiene centro  $O$ . Sea  $A$  un punto de  $\Gamma$  tal que  $0^\circ < \angle AOB < 120^\circ$ . Sea  $D$  el punto medio del arco  $\widehat{AB}$  que no contiene a  $C$ . La paralela a  $DA$  que pasa por  $O$  interseca a  $AC$  en  $J$ . La perpendicular a  $OA$  por su punto medio interseca a  $\Gamma$  en  $E$  y  $F$ . Prueba que  $J$  es el incentro del triángulo  $\triangle CEF$ .

**Problema 2.32** *El triángulo  $\triangle ABC$  está inscrito en una circunferencia. Las bisectrices interiores de los ángulos  $\angle A$ ,  $\angle B$  y  $\angle C$ , cortan a la circunferencia de nuevo en los puntos  $D$ ,  $E$  y  $F$ , respectivamente. Demuestra que*

$$(a) |DEF| \geq |ABC|$$

$$(b) DE + EF + FD \geq AB + BC + CA$$

$$(c) AD + BE + CF > AB + BC + CA$$

**Problema 2.33** *Dado el triángulo  $\triangle ABC$ , se traza una línea  $l$  paralela al lado  $AB$  la cual pasa por el vértice  $C$ . La bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  interseca el lado  $BC$  en  $D$  y a  $l$  en  $E$ . La bisectriz del ángulo  $\angle ABC$  interseca el lado  $AC$  en  $F$  y a  $l$  en  $G$ . Si  $GF = DE$ , demuestra que  $AC = BC$ .*

## 2.3. Las alturas y el ortocentro


En esta sección analizaremos las propiedades de las alturas del triángulo. Recordemos que la *altura* de un triángulo es la línea perpendicular a un lado trazada desde el vértice opuesto a este lado. Como en las anteriores líneas que hemos analizado, también se cumple:

**Teorema 2.3.1** *Las alturas de un triángulo se intersecan en un punto.*

*Demostración.* En el triángulo  $\triangle ABC$  sean  $D$  y  $E$  los pies de las alturas sobre los lados  $BC$  y  $AC$ , respectivamente, y sea  $H$  el punto de intersección de  $AD$  y  $BE$ . Se traza la línea  $CH$  la cual interseca al lado  $AB$  en el punto  $F$ . Para demostrar que  $CF$  es una altura, bastará con demostrar que el cuadrilátero  $AFDC$  es cíclico, porque así de esta manera el  $\angle AFC$  sería igual al  $\angle ADC = 90^\circ$ . Para esto, como sabemos que  $\angle HDC = 90^\circ = \angle HEC$  entonces tenemos que el cuadrilátero  $HDCE$  es cíclico. De aquí se sigue que  $\angle HED = \angle HCD = \alpha$ . Por otro lado, el cuadrilátero  $BDEA$  también es cíclico ya que  $\angle BDA = 90^\circ = \angle BEA$ , entonces  $\angle BAD = \angle BED = \alpha$ . Ahora, como  $\angle BAD = \angle FCB = \alpha$ , entonces se concluye que el cuadrilátero  $AFDC$  es cíclico y por lo tanto  $CF$  es

una altura del triángulo  $\triangle ABC$ . El punto  $H$  es llamado *ortocentro* del triángulo.


□



**Ejemplo 2.3.1** Dos triángulos  $\triangle A_1BC$  y  $\triangle A_2BC$  están inscritos en un círculo y tienen el lado  $BC$  en común. Sean  $H_1$  y  $H_2$  los ortocentros de los triángulos  $\triangle A_1BC$  y  $\triangle A_2BC$ , respectivamente. Demuestra que el segmento  $H_1H_2$  es igual y paralelo al segmento  $A_1A_2$ .


*Demostración.* Sean  $O$  el centro del círculo y  $M$  el punto medio de  $BC$ . Sabemos que la distancia de un vértice al ortocentro es el doble de la distancia del centro de la circunferencia hacia el lado opuesto a ese vértice<sup>1</sup>, con esto tenemos que  $H_1A_1 = 2 \cdot OM$  y  $H_2A_2 = 2 \cdot OM$ , esto implica que  $H_1A_1 = H_2A_2$  y además como son paralelas, podemos concluir que  $H_1A_1A_2H_2$  es un paralelogramo. □

<sup>1</sup>Este resultado es bastante útil. Su demostración se deja como ejercicio en la siguiente sección.



**Ejemplo 2.3.2** Sean  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  las alturas de un triángulo acutángulo  $\triangle ABC$  y sea  $H$  su ortocentro. Sea  $N$  el punto medio de  $AH$  y sea  $M$  el punto medio de  $BC$ . Demuestra que  $NM$  es perpendicular a  $FE$ .

*Demostración.* Sabemos que los cuadriláteros  $AFHE$  y  $FBCE$  son cíclicos y sus centros son  $N$  y  $M$ , respectivamente. Además, la cuerda  $FE$  es común a sus circunferencias. Como ya vimos que la cuerda común de dos circunferencias es perpendicular a la línea de sus centros, tenemos que  $NM \perp FE$ .  $\square$





### 2.3.1. Problemas

**Problema 2.34** Demuestra que en un triángulo los puntos simétricos al ortocentro, con respecto a los lados, están en la circunferencia circunscrita.

**Problema 2.35** Sea  $AD$  la altura de el triángulo  $\triangle ABC$ ,  $H$  el ortocentro. Demuestra que  $BD \cdot DC = AD \cdot DH$ .

**Problema 2.36** Demuestra que el producto de las partes en las cuales el ortocentro divide una altura, es el mismo para las tres alturas.

**Problema 2.37** Sea  $H$  el ortocentro de un triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que los circuncírculos de los cuatro triángulos  $\triangle ABC$ ,  $\triangle HBC$ ,  $\triangle HAC$  y  $\triangle HAB$ , tienen todos el mismo radio.

**Problema 2.38** Demuestra que el ortocentro de un triángulo acutángulo es el incentro de su triángulo órtico<sup>2</sup>.

**Problema 2.39** Sea  $H$  el ortocentro de el triángulo  $\triangle ABC$ . En la recta  $CH$  se toma un punto  $K$  tal que  $\triangle ABK$  es un triángulo rectángulo. Demuestra que

$$|ABK| = \sqrt{|ABC| \cdot |ABH|}$$

**Problema 2.40** El triángulo  $\triangle ABC$  está inscrito en una circunferencia. Las bisectrices interiores de los ángulos  $\angle A$ ,  $\angle B$  y  $\angle C$ , cortan a la circunferencia de nuevo en los puntos  $D$ ,  $E$  y  $F$ , respectivamente. Sea  $I$  el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $I$  es el ortocentro del triángulo  $\triangle DEF$ .

**Problema 2.41** Sea  $AD$  la altura desde  $A$  en el triángulo  $\triangle ABC$ . Sean  $X$  y  $Y$  los puntos medios de las otras dos alturas,  $H$  el ortocentro y  $M$  el punto medio de  $BC$ . Demuestra que el circuncírculo de  $\triangle DXY$  pasa por  $H$  y por  $M$ . También, demuestra que los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle DXY$  son semejantes.

<sup>2</sup>El triángulo órtico es el formado por los pies de las alturas.

**Problema 2.42** Sea  $\ell$  una recta que pasa por el ortocentro de un triángulo. Demuestra que las rectas simétricas a  $\ell$ , con respecto a los lados del triángulo, concurren en un punto.

**Problema 2.43** Sean  $E$  y  $F$  puntos sobre los lados  $BC$  y  $CD$ , respectivamente, de un cuadrado  $ABCD$ . Sean  $M$  y  $N$  las intersecciones de  $AE$  y  $AF$  con  $BD$ , y sea  $P$  la intersección de  $MF$  con  $NE$ . Si  $\angle EAF = 45^\circ$ , demuestra que  $AP$  es perpendicular a  $EF$ .

**Problema 2.44** Sea  $ABCD$  un rectángulo y sea  $P$  un punto sobre su circuncírculo, diferente de los vértices del rectángulo. Sea  $X, Y, Z$  y  $W$  las proyecciones de  $P$  sobre las líneas  $AB, BC, CD$ , y  $DA$ , respectivamente. Demuestra que uno de los puntos  $X, Y, Z$  ó  $W$  es el ortocentro del triángulo formado por los otros tres.


**Problema 2.45** Sea  $D$  el punto sobre el lado  $BC$ , de un triángulo acutángulo  $\triangle ABC$ , tal que  $AD$  es altura del triángulo. Sea  $P$  un punto sobre el segmento  $AD$ . Las líneas  $BP$  y  $CP$  cortan a los lados  $AC$  y  $AB$  en  $M$  y  $N$ , respectivamente. Demuestra que  $\angle NDA = \angle MDA$ .

## 2.4. Las mediatrices y el circuncentro

Consideremos un segmento fijo  $AB$ . Ahora consideremos el conjunto de puntos que equidistan de los puntos  $A$  y  $B$ . Sean  $M$  el punto medio de  $AB$  y  $P$  uno de los puntos de tal conjunto. Dado que  $PA = PB$  y  $AM = MB$ , tenemos que  $PM \perp AB$ . De esta manera podemos observar que el conjunto de puntos que equidistan de los extremos del segmento  $AB$  es una línea perpendicular a  $AB$  por su punto medio. Esta línea se llama *mediatriz* del segmento. Primeramente demostramos que:

**Teorema 2.4.1** Las mediatrices de los tres lados de un triángulo se intersecan en un punto. El punto de concurrencia es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo y es llamado circuncentro.


*Demostración.* Sea  $\triangle ABC$  el triángulo,  $D, E, F$  los puntos medios de los lados  $BC, CA,$  y  $AB,$  respectivamente. Trazamos las mediatrices de los lados  $AB$  y  $AC$  las cuales se intersecan en el punto  $O$ . Tenemos que  $AO = BO,$  por definición de mediatriz, y de la misma manera  $AO = CO.$  Como  $BO = CO$  entonces  $DO$  es mediatriz del lado  $BC,$  por lo que las tres mediatrices se intersecan en un punto el cual es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo.  $\square$



**Observación 2.4.1** *Notemos que de esta demostración también se obtiene que el circuncírculo de un triángulo es único, es decir, por tres puntos no alineados pasa una única circunferencia.*


**Ejemplo 2.4.1** *En un triángulo  $\triangle ABC$  sean  $H$  el ortocentro y  $O$  el circuncentro. Sea  $D$  el punto donde la línea  $AO$  interseca al circuncírculo. Demuestra que  $HD$  bisecta el lado  $BC.$*

*Demostración.* Tenemos que  $\angle ADC = \angle ABC$  y  $\angle ACD = 90^\circ,$  entonces  $\beta = \angle CAD = 90^\circ - \angle ADC = 90^\circ - \angle ABC = \angle HCB$  y como  $\angle CBD = \angle CAD = \beta,$  tenemos que  $HC$  es paralela a  $BD.$  Por otro lado,  $\alpha = \angle BCD = \angle BAD = \angle BAC - \beta,$  y además como  $\angle BAL = 90^\circ - \angle ABC = \beta,$  tenemos que  $\angle HBC = \angle LAC = \angle BAC - \beta = \alpha,$  entonces  $HB$  es paralela a  $CD.$  Tenemos entonces que  $HBDC$  es un paralelogramo y por lo tanto, sus diagonales se bisectan.  $\square$



**Ejemplo 2.4.2** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero en el que  $AD = DC = CB$  y  $\angle DAB + \angle CBA = 120^\circ$ . Demuestra que el circuncentro del triángulo  $\triangle ABT$ , donde  $T$  es el punto donde se intersecan las líneas  $AD$  y  $BC$ , es el punto de intersección de las diagonales  $DB$  y  $AC$ .

*Demostración.* Sea  $P$  el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero. Sea  $\alpha = \angle DAC = \angle DCA$  y sea  $\beta = \angle CDB = \angle CBD$ . Por suma de ángulos en los triángulos  $\triangle TDB$  y  $\triangle TAC$  tenemos que  $2\beta + 2\alpha = 120^\circ$ , es decir,  $\alpha + \beta = 60^\circ$ . De aquí se sigue que el cuadrilátero  $DPCT$  es cíclico, entonces  $\angle PTC = \beta$  y  $\angle PTD = \alpha$  y entonces los triángulos  $\triangle TPB$  y  $\triangle TPA$  son isósceles, por lo tanto,  $P$  es el circuncentro del triángulo  $\triangle ABT$ .  $\square$



### 2.4.1. Problemas

**Problema 2.46** *Dos circunferencias de centros  $O_1$  y  $O_2$  se cortan en dos puntos  $A$  y  $B$ . Por  $A$ , se trazan tangentes a las circunferencias que las cortan de nuevo en  $B$  y  $C$ . Sea  $P$  el punto tal que  $AO_1PO_2$  es un paralelogramo. Demuestra que  $BP = PC$ .*

**Problema 2.47** *En un triángulo equilátero  $\triangle ABC$ , el punto  $K$  divide el lado  $AC$  en la razón  $2 : 1$  y el punto  $M$  divide al lado  $AB$  en la razón  $1 : 2$ . Demuestra que la longitud del segmento  $KM$  es igual al radio de la circunferencia circunscrita en el triángulo  $\triangle ABC$ .*

**Problema 2.48** *Si  $s$ ,  $r$  y  $R$  son el semiperímetro, el inradio y el circunradio de un triángulo  $\triangle ABC$ , demuestra que  $abc = 4srR$ .*

**Problema 2.49** *En un triángulo  $\triangle ABC$  sean  $H$ ,  $O$  y  $M$ , el ortocentro, el circuncentro y el punto medio del lado  $BC$ , respectivamente. Demuestra que  $AH$  es el doble de  $OM$ .*

**Problema 2.50** *Sean  $M$  y  $N$  las proyecciones del ortocentro de un triángulo  $\triangle ABC$  sobre las bisectrices interior y exterior del ángulo  $\angle B$ . Demuestra que la línea  $MN$  bisecta al lado  $AC$ .*

**Problema 2.51** *En un triángulo  $\triangle ABC$  sea  $H$  el ortocentro,  $O$  el circuncentro, sea  $AL$  la bisectriz de el ángulo  $\angle BAC$ . Demuestra que  $AL$  bisecta el ángulo  $\angle HAO$ .*

**Problema 2.52** *Sean  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  las alturas de un triángulo acutángulo  $\triangle ABC$  y sean  $H$  y  $O$  su ortocentro y circuncentro, respectivamente. La línea  $AO$  interseca a  $CF$  en el punto  $P$ . Si  $FP = HE$ , demuestra que  $AB = BC$ .*

**Problema 2.53** *En un triángulo  $\triangle ABC$ , la bisectriz del ángulo  $\angle A$  interseca al lado  $BC$  en  $U$ . Demuestra que la mediatriz de  $AU$ , la perpendicular a  $BC$  por  $U$  y el circundiámetro a través de  $A$  son concurrentes.*


**Problema 2.54** En un triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $H$  y  $O$  su ortocentro y circuncentro, respectivamente. Sea  $M$  el punto medio de  $AB$ . Sea  $H_1$  el reflejado de  $H$  con respecto a  $C$  y sea  $C_1$  el reflejado de  $C$  con respecto a  $M$ . Demuestra que  $C_1$ ,  $O$  y  $H_1$  están alineados.

**Problema 2.55** A través del ortocentro  $H$  de un triángulo  $\triangle ABC$ , se traza una paralela a  $AB$  la cual interseca  $BC$  en  $D$ . También por  $H$  se traza una paralela a  $AC$  la cual interseca a  $BC$  en  $E$ . Las perpendiculares a  $BC$  en  $D$  y  $E$  intersecan a  $AB$  y  $AC$  en  $D'$  y  $E'$ , respectivamente. Demuestra que  $D'E'$  interseca al circuncírculo en los puntos  $B'$  y  $C'$  los cuales son diametralmente opuestos a los vértices  $B$  y  $C$ , respectivamente.

**Problema 2.56** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo acutángulo con  $AB \neq AC$ . El círculo con diámetro  $BC$  interseca los lados  $AB$  y  $AC$  en  $M$  y  $N$ , respectivamente. Sea  $O$  el punto medio del lado  $BC$ . Las bisectrices de los ángulos  $BAC$  y  $MON$  se intersecan en  $R$ . Demuestra que los circuncírculos de los triángulos  $\triangle BMR$  y  $\triangle CNR$  tienen un punto común sobre el lado  $BC$ .

## 2.5. Circunferencias exinscritas

Dado un triángulo existen 4 circunferencias que son tangentes a sus lados. Una de éstas, la cual vimos anteriormente, es la circunferencia inscrita, la cual tiene contacto con los lados en el interior. Sin embargo, si permitimos que las circunferencias tengan contacto con las prolongaciones de los lados, entonces tenemos tres posibilidades más. Estas circunferencias tienen contacto con uno de los lados en su interior y con los dos lados restantes en sus prolongaciones, y se les conoce con el nombre de *circunferencias exinscritas*. Veamos como se determinan:



Sea  $I_A$  el punto de intersección de la bisectriz interior del ángulo  $\angle A$  y la bisectriz exterior del ángulo  $\angle C$ . Como  $I_A$  pertenece a la bisectriz interior del ángulo  $\angle A$ , entonces equidista de los lados  $AB$  y  $AC$ , pero como también pertenece a la bisectriz exterior del ángulo  $\angle C$  entonces equidista de los lados  $BC$  y  $AC$ . Lo anterior quiere decir que el punto  $I_A$  equidista de los lados  $AB$  y  $BC$ , esto es, que la bisectriz exterior del ángulo  $\angle B$  pasa por  $I_A$ , por lo tanto la bisectriz interior del ángulo  $\angle A$  y las bisectrices exteriores de los ángulos  $\angle B$  y  $\angle C$  concurren en un punto, al cual se le llama el *excentro* con respecto al vértice  $A$  y es denotado comúnmente como  $I_A$ . Sean  $F$ ,  $G$ , y  $H$  los pies de las perpendiculares desde  $I_A$  hacia los lados  $AB$ ,  $BC$ , y  $CA$ . Consideremos la distancia  $I_A G$  como radio e  $I_A$  como centro y trazemos una circunferencia la cual es tangente a  $AB$ ,  $BC$ , y  $CA$  en los puntos  $F$ ,  $G$ , y  $H$ . Esta circunferencia es precisamente la circunferencia

exinscrita del lado  $BC$ . La distancia  $I_A G$  es el *exradio* y lo denotaremos como  $r_A$ .

**Ejemplo 2.5.1** Sea  $r$  el radio de la circunferencia inscrita en el  $\triangle ABC$  y sea  $r_A$  el radio de la circunferencia exinscrita del  $\triangle ABC$ , con respecto al lado  $a$ . Demuestra que

$$\frac{r}{r_A} = \frac{s-a}{s}$$

donde  $s$  es el semiperímetro del triángulo.

*Demostración.* En la figura anterior tenemos que  $AF = AH$ , además  $AF + AH = AB + BG + GC + CA = 2s$ , entonces  $AH = AF = s$ . Tenemos que

$$\begin{aligned} |ABC| &= |AFI_A H| - |BFI_A HC| \\ &= |AFI_A H| - 2|BI_A C| \\ &= sr_A - ar_A \\ &= (s-a)r_A, \end{aligned}$$

y como  $|ABC| = sr$ , entonces


$$(s-a)r_A = sr,$$

de donde obtenemos la igualdad deseada.  $\square$

**Ejemplo 2.5.2** El  $\triangle ABC$  tiene inscrita una circunferencia. Supongamos que  $M$  es el punto de tangencia de la circunferencia con el lado  $AC$ ,  $MK$  es el diámetro. La recta  $BK$  corta  $AC$  en el punto  $N$ . Entonces se cumple que  $AM = NC$ .

*Demostración.* Por  $K$  trazamos la recta  $DE$  paralela a  $AC$ . El triángulo  $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ . Tenemos que la circunferencia inscrita en el triángulo  $\triangle ABC$  es la circunferencia exinscrita del triángulo  $\triangle BDE$  (respectiva al lado  $DE$ ), entonces  $N$  es el punto de tangencia de la circunferencia exinscrita del triángulo  $\triangle ABC$  con el lado  $AC$ . Tenemos que  $BC + CN = s$ , lo cual implica que  $NC = s - a$ , y como sabemos que  $AM = s - a$ , concluimos que  $AM = NC$ .  $\square$






Ahora probaremos que el área de un triángulo dado se puede obtener como la media geométrica de un par de triángulos asociados a éste.


**Teorema 2.5.1** Sean  $I_A, I_B$  e  $I_C$  los excentros de un triángulo  $\triangle ABC$  y sean  $M, N$  y  $P$  los puntos de contacto entre los círculos exinscritos y los lados correspondientes de  $\triangle ABC$ . Entonces

$$|I_A I_B I_C| \cdot |MNP| = |ABC|^2.$$




*Demostración.* Sean  $D, E$  y  $F$  los puntos de contacto del incírculo de  $\triangle ABC$  con los lados  $BC, CA$  y  $AB$ , respectivamente. Sea  $I$  el incentro de  $\triangle ABC$  y sea  $J$  el punto donde las rectas ortogonales a  $BC, CA$  y  $AB$ , a través de  $M, N$  y

$P$ , concurren. No es difícil ver que la anterior concurrencia es cierta, simplemente apliquemos el Teorema de Carnot (Teorema 1.5.3) con los puntos  $M$ ,  $N$  y  $P$ . Después, observemos que el circuncentro  $O$  de  $\triangle ABC$  es el punto medio del segmento  $IJ$  (esto se deja como ejercicio al lector), entonces, por el Teorema de Euler (Problema 1.110) tenemos que  $|DEF| = |MNP|$ . Podemos entonces considerar el triángulo  $\triangle DEF$  en lugar del triángulo  $\triangle MNP$  y demostraremos que  $|I_A I_B I_C| \cdot |DEF| = |ABC|^2$ .



Sean  $J$ ,  $K$  y  $L$  los puntos donde los segmentos  $II_A$ ,  $II_B$  e  $II_C$ , respectivamente, intersecan al circuncírculo del triángulo  $\triangle ABC$ . Es fácil probar que  $J$ ,  $K$  y  $L$  son los puntos medios de los segmentos  $II_A$ ,  $II_B$  e  $II_C$ , respectivamente, entonces  $\triangle I_A I_B I_C$  es homotético a  $\triangle JKL$  con razón de homotecia igual a 2 y centro de homotecia en  $I$ .



Si dividimos el triángulo  $\triangle JKL$  en tres triángulos desde  $O$  (el cual está siempre

en el interior del triángulo  $\triangle DEF$ ) obtenemos que

$$\begin{aligned} |JKL| &= |KOL| + |LOJ| + |JOK| \\ &= \frac{\rho^2 \operatorname{sen} \alpha}{2} + \frac{\rho^2 \operatorname{sen} \beta}{2} + \frac{\rho^2 \operatorname{sen} \theta}{2} \\ &= \frac{\rho^2}{2} (\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \theta), \end{aligned}$$

donde  $\rho$  es el circunradio de  $\triangle ABC$ . Se sigue que el área de  $\triangle I_A I_B I_C$  es

$$|I_A I_B I_C| = 2\rho^2 (\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \theta).$$

Como el área de  $\triangle DEF$  es


$$|DEF| = \frac{r^2 (\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \theta)}{2},$$

tenemos que

$$\begin{aligned} |I_A I_B I_C| \cdot |DEF| &= \rho^2 r^2 (\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \theta)^2 \\ &= r^2 (\rho \operatorname{sen} \alpha + \rho \operatorname{sen} \beta + \rho \operatorname{sen} \theta)^2. \end{aligned}$$

Ahora, por la Ley de Senos en  $\triangle ABC$ , finalmente obtenemos que

$$|I_A I_B I_C| \cdot |DEF| = r^2 \left( \frac{a+b+c}{2} \right)^2 = |ABC|^2. \quad \square$$



### 2.5.1. Problemas

**Problema 2.57** Demuestra que el triángulo  $\triangle ABC$  es el triángulo órtico del triángulo  $\triangle I_A I_B I_C$ .

**Problema 2.58** Demuestra que

$$|ABC| = (s - a)r_A = (s - b)r_B = (s - c)r_C.$$

**Problema 2.59** Demuestra que

$$\frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} + \frac{1}{r_C} = \frac{1}{r}.$$

**Problema 2.60** Sea  $r_A$  el exradio correspondiente al vértice  $A$  en un triángulo  $\triangle ABC$  y sean  $h_A$ ,  $h_B$  y  $h_C$  las alturas desde  $A$ ,  $B$  y  $C$ , respectivamente. Demuestra que

$$\frac{1}{r_A} = \frac{1}{h_B} + \frac{1}{h_C} - \frac{1}{h_A}.$$

**Problema 2.61** En un triángulo  $\triangle ABC$  el excírculo correspondiente al vértice  $A$  es tangente a las líneas  $AB$  y  $AC$  en  $M$  y  $N$ , respectivamente, el excírculo correspondiente al vértice  $B$  es tangente a las líneas  $BA$  y  $BC$  en  $S$  y  $T$ , respectivamente. Sean  $P$  y  $Q$  las proyecciones de  $C$  sobre  $MN$  y  $ST$ , respectivamente. Demuestra que el cuadrilátero  $PQSM$  es cíclico.

**Problema 2.62** Demuestra que

$$\tan\left(\frac{\angle A}{2}\right) = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}.$$

**Problema 2.63** Dado un triángulo  $\triangle ABC$ , sea  $S$  el área del triángulo con vértices en los puntos de contacto del incírculo con los lados del triángulo. Ahora, sea  $S_A$  el área del triángulo con vértices en los puntos de contacto de la

circunferencia exinscrita (con respecto al vértice  $A$ ) con los lados del triángulo. De manera similar definimos  $S_B$  y  $S_C$ . Demuestra que

$$\frac{1}{S_A} + \frac{1}{S_B} + \frac{1}{S_C} = \frac{1}{S}.$$

**Problema 2.64** Demuestra que

$$\tan\left(\frac{\angle A}{2}\right) \tan\left(\frac{\angle B}{2}\right) = \frac{r}{r_C}.$$

**Problema 2.65** Dado un  $\triangle ABC$ , por su vértice  $C$  pasan  $n - 1$  rectas  $CM_1, CM_2, \dots, CM_{n-1}$  que lo dividen en  $n$  triángulos menores  $\triangle ACM_1, \triangle M_1CM_2, \dots, \triangle M_{n-1}CB$  (los puntos  $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$  están sobre el lado  $AB$ ). Supóngase que  $r_1, r_2, \dots, r_n$  y  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$  denotan, respectivamente, los radios de los círculos inscritos de esos triángulos y los círculos exinscritos que se encuentran dentro del ángulo  $\angle C$  de cada triángulo. Sean  $r$  y  $\rho$  los radios de los círculos inscrito y exscrito del propio triángulo  $\triangle ABC$ . Probar que

$$\frac{r_1}{\rho_1} \cdot \frac{r_2}{\rho_2} \cdot \dots \cdot \frac{r_n}{\rho_n} = \frac{r}{\rho}.$$

**Problema 2.66** Sea  $ABCD$  un trapecio isósceles, con  $AB$  paralelo a  $CD$ . La circunferencia inscrita del triángulo  $\triangle BCD$  interseca  $CD$  en  $E$ . Sea  $F$  el punto sobre la bisectriz interna del ángulo  $\angle DAC$ , tal que  $EF \perp CD$ . El circuncírculo del triángulo  $\triangle ACF$  interseca la línea  $CD$  en  $C$  y  $G$ . Demuestra que el triángulo  $\triangle AFG$  es isósceles.

**Problema 2.67** En un paralelogramo  $ABCD$  se trazan las circunferencias de centros  $O$  y  $O'$  y radios  $R$  y  $R'$  exinscritas a los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle BCD$ , relativas a los lados  $AD$  y  $CD$ , respectivamente.

- (a) Demuestra que las circunferencias son tangentes a  $BD$  en un mismo punto  $F$
- (b) Demuestra que  $D$  es el ortocentro del triángulo  $\triangle OBO'$ .

(c) Demuestra que  $FB \cdot FD = R \cdot R'$

**Problema 2.68** En un triángulo acutángulo  $\triangle ABC$ , la bisectriz interna del ángulo  $\angle A$  interseca la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABC$  en  $A_1$ . Los puntos  $B_1$  y  $C_1$  son definidos de manera semejante. Sea  $I_A$ ,  $I_B$  e  $I_C$  los excentros correspondientes a cada uno de los vértices del triángulo. Demuestra que

(a)  $|I_A I_B I_C| = 2|AC_1 B A_1 C B_1|$

(b)  $|I_A I_B I_C| \geq 4|ABC|$

---

## Capítulo 3

# Temas selectos de Geometría

---

### 3.1. Teoremas de Ceva y Menelao

En esta sección veremos un par de teoremas que resultan de gran utilidad cuando tratamos con problemas sobre líneas concurrentes o puntos colineales. Estos teoremas son los conocidos *Teorema de Ceva* y *Teorema de Menelao*. Cada uno de ellos tiene una doble utilidad, ya que podemos aplicarlos ya sea para demostrar que ciertas líneas son concurrentes (ciertos puntos son colineales), o una vez que sabemos que ciertas líneas son concurrentes (puntos colineales) queremos obtener información sobre éstas.


Antes de enunciar los teoremas mencionados, introducimos el término *ceviana*. Decimos que dado un triángulo, una línea que pasa por alguno de sus vértices es una ceviana.

**Teorema 3.1.1** *Teorema de Ceva. Dado un triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  puntos sobre las líneas  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Entonces, las cevianas*

$AD$ ,  $BE$  y  $CF$  concurren si y sólo si

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1.$$

*Demostración.* Demostraremos el teorema para el caso en que las cevianas intersecan a los lados en el interior de estos, como se muestra en la figura.



Supongamos primero que las líneas  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  son concurrentes en un punto  $P$ . Notemos que

$$\frac{|ABP|}{|APC|} = \frac{|ABD| - |BPD|}{|ADC| - |DPC|} = \frac{BD}{DC},$$

análogamente obtenemos,

$$\frac{|CBP|}{|ABP|} = \frac{CE}{EA} \text{ y } \frac{|APC|}{|CBP|} = \frac{AF}{FB}.$$

De esto obtenemos que

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = \frac{|APC|}{|CBP|} \cdot \frac{|ABP|}{|APC|} \cdot \frac{|CBP|}{|ABP|} = 1.$$

Supongamos ahora que los puntos  $D$ ,  $E$  y  $F$  cumplen que

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1. \quad (1)$$

Supongamos además que las líneas  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  no son concurrentes. Consideremos el punto  $P$  donde se intersecan las líneas  $BE$  y  $CF$  y supongamos



que la línea  $AP$  intersecta al lado  $BC$  en un punto  $D'$ . Dado que  $AD'$ ,  $BE$  y  $CF$  son concurrentes, por lo demostrado anteriormente tenemos que

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD'}{D'C} \cdot \frac{CE}{EA} = 1. \quad (2)$$

De (1) y (2) tenemos que

$$\frac{BD'}{D'C} = \frac{BD}{DC}.$$

De aquí se sigue que  $D' = D$ , ya que dada una razón sólo puede haber un punto que divida un segmento en esa razón.  $\square$

**Observación 3.1.1** *El signo positivo en 1 tiene verdadera importancia cuando se trabaja con segmentos dirigidos. Convencionalmente se considera que al dividir dos segmentos con el mismo sentido el resultado es positivo, así mismo, el resultado se considera negativo si los segmentos tienen sentido contrario. Sin embargo, para fines prácticos, el signo no importará, pero si debemos tomar en cuenta que esto significa que las tres razones son positivas o bien dos de ellas son negativas. Geométricamente esto significa que las tres cevianas intersectan a los lados en el interior o bien dos de ellas lo hacen en el exterior de los segmentos.*

Ahora enunciaremos, sin demostración, el Teorema de Menelao. La demostración es análoga a la del Teorema de Ceva, sin embargo es importante mencionar que el valor  $-1$  en este caso significa que uno de los puntos o bien los tres, están en el exterior de los segmentos.

**Teorema 3.1.2** Teorema de Menelao. *Dado un triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $D$ ,  $E$  y  $F$ , puntos sobre las líneas  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Entonces,  $D$ ,  $E$  y  $F$  son colineales si y sólo si*


$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = -1.$$

**Ejemplo 3.1.1** *Sean  $C_1$ ,  $C_2$  y  $C_3$  tres circunferencias de centros  $A$ ,  $B$  y  $C$ , y radios  $a$ ,  $b$  y  $c$ , respectivamente. Sean  $P$ ,  $Q$  y  $R$  los puntos donde se intersectan las tangentes externas comunes de  $C_1$  y  $C_2$ ,  $C_2$  y  $C_3$ , y  $C_3$  y  $C_1$ , respectivamente. Demuestra que  $P$ ,  $Q$  y  $R$  son colineales.*

*Demostración.* Observemos lo siguiente:

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RA} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a} = 1.$$

Entonces se cumplen las hipótesis del Teorema de Menelao para el triángulo  $\triangle ABC$  con los puntos  $P$ ,  $Q$  y  $R$  sobre los lados  $AB$ ,  $BC$  y  $CA$ , respectivamente. Se sigue que los puntos  $P$ ,  $Q$  y  $R$  son colineales.  $\square$



Como se mencionó al principio de ésta sección, los Teoremas de Ceva y de Menelao también puede ser utilizados para obtener información sobre líneas concurrentes o puntos colineales.

**Ejemplo 3.1.2** Sea  $P$  un punto sobre la mediana  $AD$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Sean  $M$  y  $N$  los puntos donde los rayos  $CP$  y  $BP$  intersecan a los lados  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. Demuestra que  $MN \parallel BC$ .


*Demostración.* Dado que las líneas  $AD$ ,  $BN$  y  $CM$  son concurrentes, podemos aplicar el Teorema de Ceva y obtenemos que

$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CN}{NA} = 1.$$

Además, como  $\frac{BD}{DC} = 1$  se sigue que

$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{CN}{NA} = 1,$$


lo que implica que  $MN$  es paralelo a  $BC$ . □



Finalmente en esta sección, enunciamos las versiones trigonométricas de los Teoremas de Ceva y Menelao.

**Teorema 3.1.3** versión trigonométrica del Teorema de Ceva. *Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sean  $D, E$  y  $F$  puntos sobre las líneas  $BC, CA$  y  $AB$ , respectivamente. Denotemos como  $\alpha_1 = \angle BAD$ ,  $\alpha_2 = \angle DAC$ ,  $\beta_1 = \angle CBE$ ,  $\beta_2 = \angle EBA$ ,  $\theta_1 = \angle ACF$  y  $\theta_2 = \angle FCB$ . Entonces, las líneas  $AD, BE$  y  $CF$  concurren si y sólo si*

$$\frac{\text{sen}\alpha_1}{\text{sen}\alpha_2} \cdot \frac{\text{sen}\beta_1}{\text{sen}\beta_2} \cdot \frac{\text{sen}\theta_1}{\text{sen}\theta_2} = 1.$$



**Teorema 3.1.4** versión trigonométrica del Teorema de Menelao. *Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sean  $D, E$  y  $F$  puntos sobre las líneas  $BC, CA$  y  $AB$ ,*

respectivamente. Denotemos como  $\alpha_1 = \angle BAD$ ,  $\alpha_2 = \angle DAC$ ,  $\beta_1 = \angle CBE$ ,  $\beta_2 = \angle EBA$ ,  $\theta_1 = \angle ACF$  y  $\theta_2 = \angle FCB$ . Entonces, los puntos  $D$ ,  $E$  y  $F$  son colineales si y sólo si

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha_1}{\operatorname{sen}\alpha_2} \cdot \frac{\operatorname{sen}\beta_1}{\operatorname{sen}\beta_2} \cdot \frac{\operatorname{sen}\theta_1}{\operatorname{sen}\theta_2} = -1.$$

Estos pueden obtenerse de las versiones con razones de longitudes de segmentos, simplemente aplicando el Teorema Generalizado de la Bisectriz, el cual se obtiene fácilmente aplicando la Ley de Senos a los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle ADC$ .

**Teorema 3.1.5** Sea  $D$  un punto en la línea  $BC$  que contiene al lado  $BC$  del triángulo  $\triangle ABC$  y sean  $\alpha = \angle BAD$  y  $\beta = \angle DAC$ . Entonces se cumple que

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\operatorname{sen}\beta}.$$

### 3.1.1. Problemas

**Problema 3.1** Utilizando el teorema de Ceva demuestra que

- (a) Las medianas de un triángulo concurren.
- (b) Las bisectrices de los ángulos internos de un triángulo son concurrentes.
- (c) Las alturas de un triángulo son concurrentes.

**Problema 3.2** Si  $D$ ,  $E$ ,  $F$  son los puntos de contacto de la circunferencia inscrita al triángulo  $\triangle ABC$  con los lados  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$ , respectivamente, demuestra que  $AD$ ,  $BE$ ,  $CF$  son concurrentes<sup>1</sup>.

**Problema 3.3** Sean  $D$ ,  $E$ ,  $F$ , los puntos de los lados  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$  del triángulo  $\triangle ABC$ , tales que  $D$  esté en la mitad del perímetro a partir de  $A$ ,  $E$  en la mitad a partir de  $B$ , y  $F$  en la mitad a partir de  $C$ . Demuestra que  $AD$ ,  $BE$ ,  $CF$  son concurrentes<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Este punto de concurrencia es llamado el punto de *Gergonne* del triángulo

<sup>2</sup>Este punto de concurrencia se llama punto de *Nagel* del triángulo

**Problema 3.4** Sea  $ABCDEF$  un hexágono inscrito en un círculo. Demuestra que las diagonales  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  son concurrentes si y sólo si

$$\frac{AB}{BC} \cdot \frac{CD}{DE} \cdot \frac{EF}{FA} = 1.$$

**Problema 3.5** Sean  $X$  y  $X'$  dos puntos sobre un segmento  $MN$ , simétricos con respecto al punto medio de  $MN$ . Entonces  $X$  y  $X'$  se llaman un par de puntos isotómicos del segmento  $MN$ . Demuestra que si  $D$  y  $D'$ ,  $E$  y  $E'$ ,  $F$  y  $F'$  son puntos isotómicos de los lados  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$  del triángulo  $\triangle ABC$ , y si  $AD$ ,  $BE$ ,  $CF$  son concurrentes, entonces  $AD'$ ,  $BE'$ ,  $CF'$  también son concurrentes.

**Problema 3.6** Sean  $OX$  y  $OX'$  rayos que pasan por el vértice  $O$  del ángulo  $\angle MON$  simétricos con respecto a la bisectriz del ángulo  $\angle MON$ . Entonces  $OX$  y  $OX'$  se llaman un par de rectas isogonales para el ángulo  $\angle MON$ . Demuestra que si  $AD$  y  $AD'$ ,  $BE$  y  $BE'$ ,  $CF$  y  $CF'$ , son cevianas isogonales para los ángulos  $A$ ,  $B$ ,  $C$  del triángulo  $\triangle ABC$ , y si  $AD$ ,  $BE$ ,  $CF$  son concurrentes, entonces  $AD'$ ,  $BE'$ ,  $CF'$  también son concurrentes.

**Problema 3.7** Sean  $AD$ ,  $BE$ ,  $CF$  tres cevianas concurrentes del triángulo  $\triangle ABC$ , y sea la circunferencia que pasa por  $D$ ,  $E$ ,  $F$  tal que corte a los lados  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$  nuevamente en  $D'$ ,  $E'$ ,  $F'$ . Demuestra que  $AD'$ ,  $BE'$ ,  $CF'$  son concurrentes.

**Problema 3.8** Demuestra que las bisectrices de los ángulos externos de un triángulo cortan a los lados opuestos en tres puntos colineales.

**Problema 3.9** Dos paralelogramos  $ACBD$  y  $A'CB'D'$  tienen un ángulo común en  $C$ . Demuestra que  $DD'$ ,  $A'B$ ,  $AB'$  son concurrentes.

**Problema 3.10** Sea  $A$  la proyección del centro de una circunferencia sobre una recta dada  $l$ . Consideremos los puntos  $B$  y  $C$  en  $l$  de manera que  $AB = AC$ . Por  $B$  y  $C$  se trazan dos secantes arbitrarias a la circunferencia las cuales la cortan en los puntos  $P$ ,  $Q$  y  $M$ ,  $N$ , respectivamente. Supongamos que las rectas  $NP$  y  $MQ$  cortan la recta  $l$  en los puntos  $R$  y  $S$ . Demuestra que  $RA = AS$ .

**Problema 3.11** Sea  $ABCD$  un paralelogramo y  $P$  un punto cualquiera. Por  $P$  trácense rectas paralelas a  $BC$  y a  $AB$  hasta que corten a  $BA$  y a  $CD$  en  $G$  y  $H$ , y a  $AD$  y  $BC$  en  $E$  y  $F$ . Demuestra que las rectas diagonales  $EG$ ,  $HF$ ,  $DB$  son concurrentes.

**Problema 3.12** Sean  $\triangle ABC$  y  $\triangle DEF$  dos triángulos tales que las líneas  $AD$ ,  $BE$  y  $CF$  concurren. Sean  $P$ ,  $Q$  y  $R$ , los puntos de intersección de los pares de líneas  $AB$  y  $DE$ ,  $BC$  y  $EF$ ,  $AC$  y  $DF$ , respectivamente. Demuestra que  $P$ ,  $Q$  y  $R$  son colineales.


## 3.2. Teoremas de Euler y Simson

En esta sección veremos tres resultados clásicos en geometría Euclidiana: *la Línea de Simson*, *la Línea de Euler* y *la Circunferencia de los 9 puntos*. Estos tres teoremas, además de la gran belleza que poseen, se pueden demostrar de manera muy sencilla utilizando argumentos desarrollados en las primeras secciones del presente libro.

### 3.2.1. Línea de Simson

**Teorema 3.2.1** Línea de Simson. Sea  $P$  un punto sobre la circunferencia circunscrita a un triángulo. Entonces, los pies de las perpendiculares desde  $P$  hacia los lados del triángulo son colineales.


*Demostración.* Sea  $\triangle ABC$  el triángulo y sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  las proyecciones de  $P$  sobre los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Tenemos que los cuadriláteros  $PABC$ ,  $PFAE$  y  $PEDC$  son cíclicos. Además, como  $\angle PAF = \angle PCD$  tenemos que  $\angle APF = \angle CPD = \alpha$ . Ahora, utilizando que los cuadriláteros  $PFAE$  y  $PEDC$  son cíclicos tenemos que  $\angle AEF = \angle APF = \alpha$  y  $\angle CED = \angle CPD = \alpha$ . Con esto, hemos probado que los puntos  $D$ ,  $E$  y  $F$  son colineales.  $\square$



### 3.2.2. Línea de Euler

**Teorema 3.2.2** Línea de Euler. Sean  $H$ ,  $G$  y  $O$  el ortocentro, gravicentro y circuncentro de un triángulo. Entonces  $H$ ,  $G$  y  $O$  son colineales y se cumple que  $HG : GO = 2 : 1$ .

*Demostración.* Sea  $\triangle ABC$  el triángulo dado y sea  $M$  el punto medio del lado  $BC$ . Consideremos un punto  $H'$  sobre el rayo  $OG$  de tal manera que  $H'G = 2 \cdot GO$ . Sabemos además que  $AG = 2 \cdot GM$  y como  $\angle AGH' = \angle MGO$ , tenemos que los triángulos  $\triangle AGH'$  y  $\triangle MGO$  son semejantes y sus lados están en razón  $2 : 1$ . Con esto, tenemos que  $AH'$  es paralela a  $OM$  y por lo tanto, perpendicular a  $BC$ . Análogamente, se demuestra que  $BH' \perp AC$  y que  $CH' \perp AB$ , por lo tanto,  $H' = H$  es el ortocentro del triángulo  $\triangle ABC$ . Concluimos que  $H$ ,  $G$  y  $O$  están alineados y que  $HG : GO = 2 : 1$ .  $\square$




### 3.2.3. Circunferencia de los nueve puntos

**Teorema 3.2.3** Circunferencia de los 9 puntos. *Consideremos los siguientes 9 puntos: los pies de las alturas, los puntos medios de los lados y los puntos medios de los segmentos que unen cada vértice con el ortocentro. Estos 9 puntos están sobre una misma circunferencia cuyo centro es el punto medio del segmento que une el circuncentro y el ortocentro, y su diámetro es igual al circunradio del triángulo.*

*Demostración.* Sean  $H_A$ ,  $D_A$ ,  $M_A$ , el punto medio de  $AH$ , el pie de la altura desde  $A$ , el punto medio de  $BC$ , respectivamente. De manera análoga se definen  $H_B$ ,  $D_B$ ,  $M_B$ ,  $H_C$ ,  $D_C$ , y  $M_C$ . Sea  $N$  el punto medio de  $HO$ . Sabemos que  $AH = 2 \cdot OM_A$ , entonces  $H_AH = OM_A$  y además, como  $H_AH$  y  $OM_A$  son paralelas, tenemos que  $H_A$ ,  $N$  y  $M_A$  son colineales. También sabemos que  $ND_A = NH_A = NM_A$ , además,  $NH_A = \frac{1}{2}OA = R$ , donde  $R$  es el circunradio del triángulo  $\triangle ABC$ . Con esto tenemos que los puntos  $H_A$ ,  $D_A$  y  $M_A$  están a distancia  $\frac{R}{2}$  del punto  $N$ . Análogamente se demuestra que  $H_B$ ,  $D_B$ ,  $M_B$ ,  $H_C$ ,  $D_C$ , y  $M_C$  están a distancia  $\frac{R}{2}$  del punto  $N$ . Por lo tanto, los puntos  $H_A$ ,  $D_A$ ,  $M_A$ ,  $H_B$ ,  $D_B$ ,  $M_B$ ,  $H_C$ ,  $D_C$ , y  $M_C$  están sobre una circunferencia de radio  $\frac{R}{2}$  con centro en el punto medio de  $OH$ .  $\square$





### 3.2.4. Problemas

**Problema 3.13** Demuestra que la proyección del lado  $AB$  de un triángulo  $\triangle ABC$  sobre la recta de Simson que corresponde a un punto  $P$ , es igual a la distancia entre las proyecciones del punto  $P$  sobre los lados  $AC$  y  $BC$ .

**Problema 3.14** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sean  $P$  y  $Q$  dos puntos sobre su circunferencia circunscrita. Demuestra que el ángulo comprendido entre las rectas de Simson correspondientes a  $P$  y  $Q$  es equivalente a la mitad del arco  $\widehat{PQ}$ .

**Problema 3.15** Sea  $P$  un punto sobre la circunferencia circunscrita alrededor de un triángulo  $\triangle ABC$ . La recta perpendicular a  $BC$ , la cual pasa por  $P$ , corta por segunda vez a la circunferencia en el punto  $M$ . Demuestra que la recta de Simson que corresponde al punto  $P$ , es paralela a la recta  $AM$ .

**Problema 3.16** *¿Qué lados corta la recta de Euler en los triángulos acutángulo y obtusángulo?*

**Problema 3.17** *Sea  $K$  un punto simétrico al circuncentro de un triángulo  $\triangle ABC$ , con respecto al lado  $BC$ . Demuestra que la línea de Euler con respecto al punto  $K$  divide el segmento  $AK$  por la mitad.*

**Problema 3.18** *Sea  $\triangle ABC$  un triángulo tal que  $\angle BAC = 120^\circ$ . Demuestra que la línea de Euler del triángulo es paralela a la bisectriz del ángulo  $\angle BAC$ .*

**Problema 3.19** *Sea  $P$  un punto interior a un triángulo acutángulo  $\triangle ABC$ , tal que los ángulos  $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ$ . Demuestra que las líneas de Euler en los triángulos  $\triangle APB$ ,  $\triangle BPC$  y  $\triangle CPA$  se cortan en un punto.*

**Problema 3.20** *Demuestra que las perpendiculares trazadas desde los puntos medios de los lados de un triángulo, sobre las tangentes al circuncírculo en el vértice opuesto respectivo, concurren en el centro de la Circunferencia de los Nueve Puntos del triángulo.*

**Problema 3.21** *Sean  $H$  el ortocentro de un triángulo  $\triangle ABC$ ,  $D$  el punto medio del lado  $BC$  y  $P$  uno de los puntos de intersección de la recta  $HD$  con el circuncírculo del triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $D$  es el punto medio de  $HP$ .*

**Problema 3.22** *En un triángulo  $\triangle ABC$ , sean  $BD$  la altura,  $BM$  la mediana, y  $P$  y  $Q$  las proyecciones de los puntos  $A$  y  $C$  sobre la bisectriz del ángulo  $\angle ABC$ . Demuestra que los puntos  $D$ ,  $M$ ,  $P$  y  $Q$  están sobre una circunferencia cuyo centro está sobre la circunferencia de los nueve puntos del triángulo  $\triangle ABC$ .*

### 3.3. Las simedianas

Las líneas que analizaremos en esta sección quizá son un poco menos populares que las vistas en el Capítulo 2. Sin embargo, los resultados concernientes con

ellas resultan de gran utilidad al resolver problemas en los cuales es necesario probar que alguna línea divide por la mitad algún segmento. Estas líneas llevan el nombre de *simedianas* y son definidas de la siguiente manera:

**Definición 3.3.1** *Una recta simétrica a la mediana de un triángulo, con respecto a la bisectriz del mismo ángulo del cual parte la mediana, se llama simediana.*

**Lema 3.3.1** *Sean  $l$  y  $m$  dos líneas isogonales (que forman ángulos iguales con respecto a la bisectriz del ángulo) con respecto al ángulo  $\angle BAC$  de un triángulo  $\triangle ABC$ . Sean  $P$  y  $Q$ , puntos sobre  $l$  y  $m$ , respectivamente. Entonces las distancias desde  $P$  hacia  $AB$  y  $AC$  son inversamente proporcionales a las respectivas distancias desde  $Q$  hacia  $AB$  y  $AC$ .*

*Demostración.* Sean  $x$  e  $y$  las distancias desde  $P$  hacia  $AB$  y  $AC$ , respectivamente; y sean  $r$  y  $s$  las distancias desde  $Q$  hacia  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. Sean también,  $D$  y  $E$  los pies de las perpendiculares desde  $P$  y sean  $F$  y  $G$  los pies de las perpendiculares desde  $Q$  como se muestra en la figura. Para demostrar el lema basta con probar que

$$\frac{x}{y} = \frac{s}{r}.$$

Para esto, tenemos que  $\triangle ADP \sim \triangle AQG$  y con esto


$$\frac{DP}{QG} = \frac{AP}{AQ},$$

también, como  $\triangle APE \sim \triangle AQF$  tenemos que

$$\frac{PE}{FQ} = \frac{AP}{AQ},$$

entonces

$$\frac{x}{y} = \frac{s}{r}. \quad \square$$



Tenemos ahora el siguiente teorema, el cual resulta de gran utilidad al trabajar con simedias:

**Teorema 3.3.1** *Supongamos que la simediana que parte del vértice A del triángulo  $\triangle ABC$  corta a  $BC$  en el punto  $K$ . Entonces se cumple que*

$$\frac{BK}{KC} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

*Demostración.* Sea  $M$  el punto medio del lado  $BC$  y sean  $x$ ,  $y$ ,  $r$  y  $s$  perpendiculares a los lados  $AB$  y  $AC$  como se muestra en la figura. Sabemos que

$$\frac{BK}{KC} = \frac{|ABK|}{|AKC|} = \frac{AB \cdot x}{AC \cdot y}.$$

Por otro lado, de la igualdad  $|ABM| = |AMC|$  tenemos que


$$\frac{s}{r} = \frac{AB}{AC}.$$

Además, por el lema anterior tenemos que

$$\frac{x}{y} = \frac{s}{r}.$$

Con esto tenemos que

$$\frac{BK}{KC} = \frac{AB^2}{AC^2}. \quad \square$$



Ahora, ya estamos listos para demostrar el siguiente teorema sobre concurrencia de las simedianas:

**Teorema 3.3.2** *Las tres simedianas de un triángulo concurren en un punto llamado punto simedianano*


*Demostración.* Sea  $P$  el punto donde las simedianas desde los vértices  $B$  y  $C$  se intersecan. Sean  $x$ ,  $y$  y  $z$  las longitudes de las perpendiculares desde  $P$  sobre los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente. Del razonamiento en la demostración anterior tenemos que

$$\frac{z}{x} = \frac{AB}{BC} \quad \text{y} \quad \frac{x}{y} = \frac{BC}{AC}.$$

Multiplicando ambas expresiones tenemos que

$$\frac{z}{y} = \frac{AB}{AC},$$


lo que significa que el punto  $P$  pertenece a la simediana desde el vértice  $A$ .  $\square$




Ahora daremos una caracterización de la simediana de un triángulo, la cual en muchas ocasiones resulta ser de gran utilidad cuando interviene el circuncírculo del triángulo.

**Ejemplo 3.3.1** *Las tangentes a la circunferencia circunscrita de un triángulo  $\triangle ABC$  en los puntos  $B$  y  $C$  se intersectan en un punto  $P$ . Entonces tenemos que  $AP$  es la simediana del lado  $BC$ .*

*Demostración.* Por  $P$  trazamos una línea de manera que intersecte a la línea  $AB$  en un punto  $D$  tal que  $DP = BP$ . Esta misma línea intersecta a la línea  $AC$  en un punto  $E$ . Como  $\angle PBD = \angle ACB = \alpha$ , tenemos que  $\angle BDP = \alpha$ , lo cual implica que  $BDEC$  es un cuadrilátero cíclico. Entonces,  $\angle CEP = \angle ABC = \angle PCE = \beta$ , es decir,  $\triangle CPE$  es isósceles. Como  $BP = PC$ , tenemos que  $DP = PE$ , es decir,  $AP$  es la mediana del triángulo  $\triangle ADE$  y como  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$  tenemos que  $AP$  es la simediana del triángulo  $\triangle ABC$  trazada hacia el lado  $BC$ .  $\square$



**Ejemplo 3.3.2** *Demuestra que las cuerdas comunes de la circunferencia circunscrita con las circunferencias de Apolonio de un triángulo dado son simedianas de este triángulo.*



*Demostración.* Sabemos que la circunferencia de Apolonio del vértice  $A$  pasa por los pies de las bisectrices exterior e interior del mismo vértice. Sea  $E$  el pie de la bisectriz exterior y sea  $D$  el pie de la bisectriz interior, además, sea  $L$  el punto donde la bisectriz interior interseca a la circunferencia circunscrita. Desde  $L$  trazamos la perpendicular a  $BC$ , la cual interseca  $BC$  en el punto  $M$  y a la circunferencia circunscrita en  $N$ . La línea  $ND$  interseca de nuevo al circuncírculo en un punto  $S$ . Sabemos que el cuadrilátero  $DMNA$  es cíclico, entonces  $\angle DNM = \angle DAM = \alpha$ , además  $\angle SAL = \angle SNL = \alpha$ . Con esto tenemos que  $AS$  es simediana del triángulo  $\triangle ABC$ , sólo falta probar que el cuadrilátero  $AESD$  es cíclico. Para esto, tenemos que  $\angle EAS = 90^\circ - \alpha$  y como  $\angle EDS = \angle MDN = 90^\circ - \alpha$ , tenemos que  $AESD$  es cíclico. Con esto hemos probado que  $AS$  es la cuerda común de la circunferencia de Apolonio y la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABC$ .  $\square$

### 3.3.1. Problemas

**Problema 3.23** En un triángulo  $\triangle ABC$  sea  $D$  el punto donde la simediana, trazada hacia el lado  $BC$ , interseca al circuncírculo de éste. Demuestra que la línea  $CB$  es simediana del triángulo  $\triangle ADC$ .

**Problema 3.24** Las tangentes en  $B$  y  $C$  al circuncírculo de un triángulo

$\triangle ABC$  se cortan en  $X$ . Sea  $M$  el punto medio de  $BC$ . Demuestra que

$$\frac{AM}{AX} = \cos(\angle BAC).$$

**Problema 3.25** La recta  $\ell$  es perpendicular al segmento  $AB$  y pasa por  $B$ . La circunferencia con el centro situado en  $\ell$  pasa por  $A$  y corta  $\ell$  en los puntos  $C$  y  $D$ . Las tangentes a la circunferencia en los puntos  $A$  y  $C$  se intersecan en  $N$ . Demuestra que la recta  $DN$  divide el segmento  $AB$  por la mitad.

**Problema 3.26** Sean  $P$  y  $Q$  dos puntos sobre el segmento  $BC$  de un triángulo acutángulo  $\triangle ABC$  de manera que  $\angle PAB = \angle BCA$  y  $\angle CAQ = \angle ABC$ . Sean  $M$  y  $N$  los puntos sobre  $AP$  y  $AQ$ , respectivamente, los cuales cumplen que  $P$  es el punto medio de  $AM$  y  $Q$  es el punto medio de  $AN$ . Prueba que  $BM$  y  $CN$  se intersecan sobre la circunferencia circunscrita del triángulo  $\triangle ABC$ .

**Problema 3.27** Sean  $M$  y  $N$  las proyecciones de los vértices  $B$  y  $C$  de un triángulo  $\triangle ABC$  sobre la bisectriz interior del ángulo  $\angle BAC$ . La paralela a  $AB$  por  $M$  y la paralela a  $AC$  por  $N$  se intersecan en un punto  $P$ . Demuestra que  $AP$  es simediana del triángulo  $\triangle ABC$ .

**Problema 3.28** El cuadrilátero  $ABCD$  es cíclico. Los pies de las perpendiculares desde  $D$  hacia las líneas  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ , son  $P, Q, R$ , respectivamente. Demuestra que las bisectrices de los ángulos  $\angle ABC$  y  $\angle CDA$  se intersecan sobre la línea  $AC$  si y sólo si  $RP = RQ$ .

**Problema 3.29** La tangente a la circunferencia circunscrita de un triángulo  $\triangle ABC$  por el punto  $A$  interseca a la línea  $BC$  en un punto  $P$ . Se traza la otra tangente a la circunferencia desde  $P$  y ésta la interseca en un punto  $Q$ . Demuestra que  $AQ$  es simediana del triángulo  $\triangle ABC$ .

**Problema 3.30** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero con  $AD$  paralelo a  $BC$ , los ángulos en  $A$  y  $B$  rectos y tal que el ángulo  $\angle CMD$  es recto, donde  $M$  es el punto medio de  $AB$ . Sean  $K$  el pie de la perpendicular a  $CD$  que pasa por  $M$ ,  $P$  el



punto de intersección de  $AK$  con  $BD$  y  $Q$  el punto de intersección de  $BK$  con  $AC$ . Demuestra que el ángulo  $\angle AKB$  es recto y que

$$\frac{KP}{PA} + \frac{KQ}{QB} = 1.$$

**Problema 3.31** Sea  $N$  el punto de intersección de las tangentes a la circunferencia circunscrita de un triángulo  $\triangle ABC$  trazadas por los puntos  $B$  y  $C$ . Sea  $M$  un punto en la circunferencia de tal manera que  $AM$  es paralelo a  $BC$  y sea  $K$  el punto de intersección de  $MN$  con la circunferencia. Demuestra que  $KA$  divide  $BC$  por la mitad.

**Problema 3.32** Desde un punto  $A$  exterior a una circunferencia están trazadas las tangentes  $AM$  y  $AN$ . También desde  $A$  se traza una secante que corta la circunferencia en los puntos  $K$  y  $L$ . Trazamos una recta arbitraria  $l$  paralela a  $AM$ . Supongamos que  $KM$  y  $LM$  cortan  $l$  en los puntos  $P$  y  $Q$ . Demuestra que la recta  $MN$  divide el segmento  $PQ$  por la mitad.

**Problema 3.33** Dos circunferencias se intersecan en dos puntos. Sea  $A$  uno de los puntos de intersección. Desde un punto arbitrario que se halla en la prolongación de la cuerda común de las circunferencias dadas, están trazadas hacia una de éstas dos tangentes que tienen contacto con ésta en los puntos  $M$  y  $N$ . Sean  $P$  y  $Q$  los puntos de intersección de las rectas  $MA$  y  $NA$ , respectivamente, con la segunda circunferencia. Demuestra que la recta  $MN$  parte el segmento  $PQ$  por la mitad.

**Problema 3.34** Sea  $AD$  una altura de un triángulo  $\triangle ABC$ . Consideremos  $AD$  como diámetro de una circunferencia que corta los lados  $AB$  y  $AC$  en  $K$  y  $L$ , respectivamente. Las tangentes a la circunferencia en los puntos  $K$  y  $L$  se intersecan en un punto  $M$ . Demuestra que la recta  $AM$  divide  $BC$  por la mitad.

**Problema 3.35** En un cuadrilátero convexo  $ABCD$  se cumple que  $AD = CD$  y  $\angle DAB = \angle ABC < 90^\circ$ . La línea a través de  $D$  y el punto medio de  $BC$ , interseca a la línea  $AB$  en un punto  $E$ . Demuestra que  $\angle BEC = \angle DAC$ .

**Problema 3.36** Se considera el triángulo  $\triangle ABC$  y su circunferencia circunscrita. Si  $D$  y  $E$  son puntos sobre el lado  $BC$  tales que  $AD$  y  $AE$  son, respectivamente, paralelas a las tangentes en  $C$  y en  $B$  a la circunferencia circunscrita. Demuestra que

$$\frac{BE}{CD} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

**Problema 3.37** Dado un triángulo  $\triangle ABC$  y su circuncírculo  $\Omega$ , denotaremos con  $A'$  el punto de intersección de las tangentes a  $\Omega$  en  $B$  y  $C$ . Definimos  $B'$  y  $C'$  de manera similar.


- (a) Demuestra que las líneas  $AA'$ ,  $BB'$  y  $CC'$  concurren.
- (b) Sea  $K$  el punto de concurrencia en (a) y sea  $G$  el centroide del triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $KG$  es paralela a  $BC$ , si y sólo si  $2a^2 = b^2 + c^2$ , donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son las longitudes de los lados del triángulo  $\triangle ABC$ .

### 3.4. Polígonos circunscritos a una circunferencia

Del mismo modo que vimos que no todo cuadrilátero tiene sus cuatro vértices sobre una circunferencia, se puede ver que no todo cuadrilátero posee una circunferencia inscrita, es decir, una circunferencia que sea tangente a sus cuatro lados al mismo tiempo. En el caso que un cuadrilátero si tenga una circunferencia inscrita diremos que el cuadrilátero es *circunscrito*. De manera similar al caso de los cuadriláteros cíclicos, los cuadriláteros circunscritos gozan de muchas propiedades interesantes que los distinguen del resto de los cuadriláteros.

El siguiente teorema nos proporciona un criterio sencillo para saber si un cuadrilátero es circunscrito.

**Teorema 3.4.1** El cuadrilátero  $ABCD$  tiene una circunferencia inscrita si y sólo si  $AB + CD = BC + AD$ .



*Demostración.* Supongamos primero que el cuadrilátero posee una circunferencia inscrita y sean  $M$ ,  $N$ ,  $P$  y  $Q$  los puntos de tangencia de los lados del cuadrilátero con la circunferencia, como se muestra en la figura. Dado que  $AQ = AM$ ,  $QD = DP$ ,  $PC = CN$  y  $NB = BM$ , tenemos que

$$AD + BC = AQ + QD + BN + NC = AM + DP + MB + CP = AB + DC.$$


Ahora, supongamos que se cumple que

$$AB + CD = BC + AD \quad (3.1)$$

pero que no existe una circunferencia que sea tangente a los cuatro lados del cuadrilátero. Consideremos la circunferencia  $\Gamma$  que es tangente a  $AB$ ,  $AD$  y  $BC$ . Sea  $C'$  el punto en el rayo  $BC$  el cual cumple que  $DC'$  es tangente a la circunferencia  $\Gamma$ . Tenemos entonces que

$$AB + C'D = BC' + AD, \quad (3.2)$$

entonces, restando (3.2) de (3.1) obtenemos que  $CD - C'D = BC - BC'$ , es decir,  $|CD - C'D| = CC'$ . Esto último contradice la desigualdad del triángulo en el triángulo  $\triangle DC'C$ , entonces debe cumplirse que  $C' = C$ . Concluimos que  $\Gamma$  debe ser tangente a todos los lados del cuadrilátero  $ABCD$ .  $\square$




**Ejemplo 3.4.1** (Teorema de Brianchon). Si un hexágono convexo posee una circunferencia inscrita, entonces las diagonales principales son concurrentes.


*Demostración.* Sea  $ABCDEF$  el hexágono dado y sean  $R, Q, T, S, P$  y  $U$ , los puntos en los cuales la circunferencia toca a los lados  $AB, BC, CD, DE, EF$  y  $FA$ , respectivamente. Prolongamos los segmentos  $EF, CB, AB, ED, CD$  y  $AF$  (como se muestra en la figura siguiente) hasta los puntos  $P', Q', R', S', T'$  y  $U'$ , de manera que

$$PP' = QQ' = RR' = SS' = TT' = UU'.$$

Sea  $\Gamma_1$  la circunferencia tangente a las líneas  $PP'$  y  $QQ'$  en los puntos  $P'$  y  $Q'$ , sea  $\Gamma_2$  la circunferencia tangente a  $RR'$  y  $SS'$  en los puntos  $R'$  y  $S'$  y sea  $\Gamma_3$  la circunferencia tangente a  $TT'$  y  $UU'$  en los puntos  $T'$  y  $U'$ . Como  $AR = AU$  y  $RR' = UU'$ , tenemos que  $AR' = AU'$ ; además, como  $DT = DS$  y  $TT' = SS'$  tenemos que  $DT' = DS'$ . De lo anterior se sigue que  $A$  y  $D$  están sobre el eje radical de  $\Gamma_2$  y  $\Gamma_3$ , es decir, la línea  $AD$  es el eje radical de  $\Gamma_2$  y  $\Gamma_3$ . Análogamente, se demuestra que la línea  $BE$  es el eje radical de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$ , y que la línea  $CF$  es el eje radical de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_3$ . Como los ejes radicales de tres circunferencias son concurrentes, tenemos entonces que las líneas  $AD, BE$  y  $CF$  concurren.  $\square$



Como corolario del Teorema de Brianchon se obtiene el siguiente resultado el cual es interesante en sí mismo. De hecho, pueden suceder cualesquiera de las dos situaciones mostradas en la siguiente figura.



**Corolario 3.4.1** *Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito y sean  $M$  y  $N$  los puntos de contacto de dos lados opuestos con la circunferencia inscrita. Entonces  $AC$ ,  $BD$  y  $MN$  concurren.*


**Ejemplo 3.4.2** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia y sean  $M, N, P$  y  $Q$  los puntos de tangencia con ésta. Designemos con  $a = AM = AQ$ ,  $b = BM = BN$ ,  $c = CN = CP$  y  $d = DP = DQ$ . Si  $T$  es el punto donde se cortan las diagonales del cuadrilátero, entonces se cumple que

$$\frac{|ATB|}{ab} = \frac{|BTC|}{bc} = \frac{|CTD|}{cd} = \frac{|ATD|}{ad}.$$

*Demostración.* Sea  $h$  la altura del triángulo  $\triangle ABC$  desde el vértice  $B$ . Como  $|ATB| = AT \cdot h/2$  y  $|BTC| = TC \cdot h/2$ , tenemos que  $\frac{|ATB|}{|BTC|} = \frac{AT}{TC}$ . Por el resultado del Problema 3.39, tenemos que  $\frac{AT}{TC} = \frac{a}{c} = \frac{ab}{bc}$ , de aquí se obtiene que

$$\frac{|ATB|}{ab} = \frac{|BTC|}{bc}.$$

De manera análoga, se calculan las razones  $\frac{|BTC|}{|CTD|}$ ,  $\frac{|CTD|}{|DTA|}$  y  $\frac{|DTA|}{|ATB|}$ . De estas razones se obtiene la conclusión del problema.  $\square$



**Ejemplo 3.4.3** Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de las diagonales  $AC$  y  $BD$  de un cuadrilátero circunscrito  $ABCD$ . Sea  $O$  el centro de la circunferencia inscrita en el cuadrilátero. Entonces  $M, N$  y  $O$  son colineales.


*Demostración.* La demostración del problema hace uso del siguiente lema:

**Lema 3.4.1** Sean  $DE$  y  $FG$  segmentos sobre los lados  $AB$  y  $AC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  y sea  $P_0$  un punto en el interior del triángulo. Entonces el lugar geométrico de los puntos  $P$  en el triángulo  $\triangle ABC$ , tales que  $|DEP| + |FGP| = |DEP_0| + |FGP_0|$ , es un segmento.


*Demostración.* Consideremos los puntos  $X$  en  $AB$  e  $Y$  en  $AC$  de manera que  $AX = DE$  y  $AY = FG$ . Como  $|AXP_0| = |DEP_0|$  y  $|AYP_0| = |FGP_0|$  entonces  $|AXP_0Y| = |DEP_0| + |FGP_0|$ , además, como  $|AXP_0Y| = |AXY| + |XP_0Y|$  y el triángulo  $\triangle AXY$  es fijo, tenemos que

$$|DEP| + |FGP| = |DEP_0| + |FGP_0|$$

si y sólo si  $|XPY| = |XP_0Y|$ . Esto último se cumple si y sólo si los puntos  $P$  están sobre la línea paralela a  $XY$  a través de  $P_0$ . Por lo tanto, el lugar geométrico de los puntos  $P$  tales que  $|DEP| + |FGP| = |DEP_0| + |FGP_0|$  es el segmento  $RS$  paralelo a  $XY$ .  $\square$



Continuando con la demostración del ejemplo, observemos que  $|AOB| + |COD| = \frac{|ABCD|}{2}$ , que  $|AMB| + |CMD| = \frac{|ABC|}{2} + \frac{|ADC|}{2} = \frac{|ABCD|}{2}$  y que  $|ANB| + |CND| = \frac{|ABD|}{2} + \frac{|BCD|}{2} = \frac{|ABCD|}{2}$ . Si  $AB$  es paralelo a  $CD$  entonces se cumple directamente que los puntos  $M, N$  y  $O$  son colineales. Supongamos que las líneas  $AB$  y  $CD$  se cortan en un punto  $T$ , de manera que  $B$  está en el interior del segmento  $AT$ . Aplicamos el lema anterior al triángulo  $\triangle ATD$  con los segmentos  $AB$  y  $DC$  y obtenemos que  $M, N$  y  $O$  son colineales.  $\square$



### 3.4.1. Problemas

**Problema 3.38** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito. Prueba que los círculos inscritos en los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle ADC$  son tangentes entre sí.


**Problema 3.39** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero cíclico y sean  $P, Q, R, S$  los pies de las perpendiculares desde el punto de intersección de las diagonales  $AC$  y  $BD$  sobre  $AB, BC, CD, DA$ , respectivamente. Demuestra que el cuadrilátero  $PQRS$  tiene circunferencia inscrita.

**Problema 3.40** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito. La longitud del segmento tangente a la circunferencia desde  $A$  es igual a  $x$  y la longitud del segmento tangente a la circunferencia desde  $C$  es igual a  $y$ . Demuestra que la razón en que la diagonal  $BD$  divide a la diagonal  $AC$  es  $\frac{x}{y}$ .

**Problema 3.41** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito y sea  $T$  el punto de intersección de las diagonales  $AC$  y  $BD$ . Sean  $I_1, I_2, I_3, I_4$ , los incentros de los triángulos  $\triangle ABT, \triangle BCT, \triangle CDT$  y  $\triangle DAT$ , respectivamente. Demuestra que el cuadrilátero  $I_1I_2I_3I_4$  es cíclico.

**Problema 3.42** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito y sea  $T$  un punto en el segmento  $AD$ . Demuestra que los círculos inscritos en los triángulos  $\triangle ABT, \triangle BTC$  y  $\triangle DCT$  tienen una línea tangente común.





**Problema 3.43** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito y sea  $\ell$  una línea la cual divide el perímetro y el área de  $ABCD$  a la mitad. Prueba que  $\ell$  pasa por el centro de la circunferencia inscrita en  $ABCD$ .

**Problema 3.44** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero circunscrito con diagonales de longitudes  $AC = u$  y  $BD = v$ . Sean  $a, b, c$  y  $d$  las longitudes de las tangentes desde los vértices  $A, B, C$  y  $D$ . Demuestra que el cuadrilátero  $ABCD$  es cíclico si y sólo si

$$\frac{u}{v} = \frac{a+c}{b+d}.$$

**Problema 3.45** Sea  $N$  el punto de intersección de las diagonales  $AC$  y  $BD$  de un cuadrilátero circunscrito  $ABCD$ . Las longitudes de las perpendiculares desde  $N$  hacia los lados  $AB, BC, CD$  y  $DA$  son  $a, b, c$  y  $d$ , respectivamente. Demuestra que

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{b} + \frac{1}{d}.$$

**Problema 3.46** Las diagonales de un cuadrilátero circunscrito se intersectan en un punto  $T$ . Los radios de los círculos inscritos en los triángulos  $\triangle ATD$ ,  $\triangle ATB$ ,  $\triangle BTC$  y  $\triangle CTD$ , son iguales a  $r_1, r_2, r_3$  y  $r_4$ , respectivamente. Prueba que

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_4}.$$

**Problema 3.47** *Un cuadrilátero  $ABCD$  es circunscrito y sus diagonales se intersecan en  $T$ . Los exradios de los triángulos  $\triangle TAB$ ,  $\triangle TBC$ ,  $\triangle TCD$ ,  $\triangle TDA$ , con respecto al vértice  $T$  son  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ ,  $r_4$ , respectivamente. Demuestra que*

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_4}.$$

**Problema 3.48** *En un cuadrilátero convexo  $ABCD$ , los rayos  $BA$  y  $CD$  se intersecan en  $P$ , y los rayos  $BC$  y  $AD$  se intersecan en  $Q$ . Sea  $H$  la proyección de  $D$  sobre  $PQ$ . Demuestra que existe un círculo inscrito en  $ABCD$  si y sólo si los incírculos de los triángulos  $\triangle ADP$  y  $\triangle CDQ$  son visibles desde  $H$  bajo el mismo ángulo.*

**Problema 3.49** *Sea  $ABCD$  un cuadrilátero convexo con  $AB \neq BC$ . Denotemos por  $\omega_1$  y  $\omega_2$  los incírculos de los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle ADC$ . Supongamos que existe un círculo  $\omega$  inscrito en el ángulo  $\angle ABC$ , tangente a las extensiones de los segmentos  $AD$  y  $CD$ . Demuestra que las tangentes comunes externas de  $\omega_1$  y  $\omega_2$  se intersecan sobre  $\omega$ .*

---

## Capítulo 4

# Algunas estrategias en Geometría

---


El objetivo en este capítulo es mostrar como algunos trazos pueden simplificar la solución de un problema que aparentemente es complicado. De hecho, algunas veces el trazo dibujado nos muestra cuál es el camino hacia la solución (o al menos uno de los caminos). Al principio, muchos de estos trazos pueden parecer artificiales y como decimos comúnmente *sacados de la manga*, sin embargo, hay ciertos grupos de problemas para los cuales el mismo tipo de construcción resulta muy útil. Es por esto que en este capítulo se ha tratado de mostrar algunas de estas estrategias y se han agrupado algunos problemas que se resuelven con esas mismas estrategias. Esto, con la finalidad de que se logre cierta familiaridad con los *trucos* y dejen de ser eso precisamente y se conviertan en *técnicas* rutinarias. De lograr este objetivo, se habrá logrado el verdadero objetivo del libro completo. Como última recomendación quizá debería decir lo siguiente: *recordemos que ninguna idea está aislada de las demás, es decir, si combinamos varias estrategias las posibilidades de éxito serán mayores.*

## 4.1. Prolongar segmentos

La primer *estrategia* o *truco* que veremos es la *prolongación de segmentos*. Algunas veces al prolongar ciertos segmentos podemos encontrar algunos detalles que nos facilitan la solución del problema al que nos estamos enfrentando:

**Ejemplo 4.1.1** En un triángulo  $\triangle ABC$  sea  $\ell$  la bisectriz del ángulo  $\angle BAC$ . Sean  $P$  y  $Q$  puntos sobre  $\ell$  de manera que  $BP$  y  $CQ$  son perpendiculares a  $\ell$ . Si  $M$  es el punto medio de  $BC$ , demuestra que  $MP = MQ$ .

*Demostración.* Prolongamos  $BP$  y  $CQ$  hasta que intersecten a  $AC$  y  $AB$  en  $E$  y  $D$ , respectivamente. Sabemos que los triángulos  $\triangle ABE$  y  $\triangle ADC$  son isósceles, entonces  $BD = EC$ . Como  $P$  y  $M$  son puntos medios de los segmentos  $BE$  y  $BC$ , respectivamente, tenemos que  $PM$  es paralela a  $EC$  y además  $PM = \frac{1}{2}EC$ . Análogamente, tenemos que  $MQ = \frac{1}{2}BD$  y con esto tenemos que  $PM = MQ$ .  $\square$




En ocasiones nos conviene prolongar los segmentos hasta obtener una longitud, la cual es mencionada en el problema:

**Ejemplo 4.1.2** Sean  $a$ ,  $b$  y  $c$  los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , de un triángulo  $\triangle ABC$ . Sea  $I$  el incentro y  $D$  el punto donde la bisectriz del  $\angle BAC$  corta al lado  $BC$ . Demuestra que

$$\frac{AI}{ID} = \frac{b+c}{a}.$$




*Demostración.* Prolongamos el lado  $BA$  hasta el punto  $T$  de manera que  $AT = AC$ . Sea  $\angle BAD = \angle DAC = \alpha$ . Como el triángulo  $\triangle TAC$  es isósceles tenemos que  $\angle ATC + \angle ACT = \angle BAC = 2\alpha$ , entonces  $\angle ATC = \angle ACT = \alpha$ . De lo anterior, tenemos que  $CT$  es paralela a  $AD$ , además, como  $BP = PA + AC = PA + AT = PT$  tenemos que  $PM$  es paralela a  $TC$  y por lo tanto paralela a  $AD$ .  $\square$



También puede ocurrir que resulte más útil considerar un punto en el interior de un segmento de tal manera que se nos forme algún triángulo isósceles:

**Ejemplo 4.1.4** En un triángulo  $\triangle ABC$  se cumple que  $\angle BAC = 100^\circ$  y  $AB = AC$ . Se elige un punto  $D$  en el lado  $AC$  de modo que  $\angle ABD = \angle CBD$ . Demuestra que  $AD + DB = BC$ .


*Demostración.* Consideremos un punto  $E$  sobre  $BC$  de tal manera que  $BE = BD$ . Como  $\angle BED = \angle ECD + \angle EDC = 80^\circ$  tenemos que  $\angle EDC = 40^\circ$ , entonces  $DE = EC$ . Basta probar que  $AD = DE$ . Como tenemos que el cuadrilátero  $ABED$  es cíclico y  $\angle ABD = \angle EBD = 20^\circ$ , entonces  $AD = DE$  y así  $BD + AD = BD + DE = BE + EC = BC$ .  $\square$




Otra forma de prolongar de manera útil un segmento, es hasta cortar algún otro segmento o alguna circunferencia. Por ejemplo:

**Ejemplo 4.1.5** Sea  $\Omega$  la circunferencia circunscrita al triángulo acutángulo  $\triangle ABC$ . Los puntos  $D$  y  $E$  están en los segmentos  $AB$  y  $AC$ , respectivamente, y son tales que  $AD = AE$ . Las mediatrices de  $BD$  y  $CE$  cortan a los arcos menores  $\widehat{AB}$  y  $\widehat{AC}$  de  $\Omega$  en los puntos  $F$  y  $G$ , respectivamente. Demuestra que las rectas  $DE$  y  $FG$  son paralelas (o son la misma recta).

*Demostración.* Prolongamos  $FD$  y  $GE$  hasta cortar a la circunferencia de nuevo en los puntos  $M$  y  $N$ , respectivamente. Como  $FB = FD$  tenemos que  $\angle FBD = \angle FDB = \alpha$ . Observemos que  $\angle AMF = \angle ABF = \alpha$ , y como también  $\angle ADM = \alpha$  tenemos que  $AD = AM$ . De manera análoga se demuestra que  $AE = AN$ , entonces los puntos  $N, D, E, M$  están sobre una misma circunferencia, es decir, el cuadrilátero  $NDEM$  es cíclico.



Del cuadrilátero cíclico  $NDEM$  tenemos que  $\angle NMD = \angle NED = \beta$ , pero como  $\angle NMD = \angle NMF = \angle NGF = \beta$ , tenemos que  $\angle NED = \angle NGF = \beta$ , es decir,  $DE$  es paralela a  $GF$ .  $\square$



□

### 4.1.1. Problemas

**Problema 4.1** Lo mismo que en el Ejemplo 4.1.1 pero ahora  $\ell$  es una línea arbitraria que pasa por el vértice  $A$ .


**Problema 4.2** En un triángulo escaleno  $\triangle ABC$  se traza la bisectriz interior  $BD$ , con  $D$  sobre  $AC$ . Sean  $E$  y  $F$ , respectivamente, los pies de las perpendiculares trazadas desde  $A$  y  $C$  hacia la recta  $BD$ , y sea  $M$  el punto sobre el lado  $BC$  tal que  $DM$  es perpendicular a  $BC$ . Demuestra que  $\angle EMD = \angle DMF$ .

**Problema 4.3** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo equilátero. Por  $A$  se traza una línea  $\ell$  paralela a  $BC$ . Sea  $D$  un punto en el lado  $BC$  y sea  $P$  el punto donde la perpendicular a  $BC$  por  $D$  corta a  $\ell$ . La circunferencia con centro en  $P$  y radio




$PD$  corta a los lados  $AB$  y  $AC$  en  $M$  y  $N$ , respectivamente. Demuestra que  $\angle MPN = 60^\circ$ .

**Problema 4.4** En un triángulo  $\triangle ABC$  se trazan las bisectrices de los ángulos  $\angle ABC$  y  $\angle ACB$  y éstas intersectan los lados  $AC$  y  $AB$  en los puntos  $E$  y  $D$ , respectivamente. Consideramos los puntos  $P$  y  $Q$  sobre las líneas  $CD$  y  $BE$ , respectivamente, de manera que  $AP \perp CD$  y  $AQ \perp BE$ . Demuestra que  $PQ$  es paralelo a  $BC$ .



**Problema 4.5** En un paralelogramo  $ABCD$ ,  $M$  es el punto medio de  $BC$ .  $DT$  es dibujada desde  $D$  y perpendicular a  $MA$ , como se muestra en la figura. Demuestra que  $CT = CD$ .



**Problema 4.6** En un trapecio  $ABCD$  ( $AB$  paralelo a  $DC$ ) sea  $AB = a$  y  $DC = b$ . Supongamos que  $\angle ADC + \angle BCD = 90^\circ$ . Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de  $AB$  y  $DC$ , respectivamente. Demuestra que

$$MN = \frac{b - a}{2}.$$


**Problema 4.7** Sea  $M$  un punto sobre el arco  $\widehat{CB}$  (el cual no contiene a  $A$ ) de la circunferencia circunscrita al triángulo equilátero  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $BM + CM = AM$ .

**Problema 4.8** Sea  $XY$  una cuerda de longitud constante la cual se desliza sobre un semicírculo. Sea  $M$  el punto medio de la cuerda,  $C$  y  $D$  las proyecciones de los puntos  $X$  y  $Y$  sobre el diámetro  $AB$ . Prueba que el triángulo  $\triangle MCD$  es isósceles y nunca cambia su forma.

**Problema 4.9** En un triángulo  $\triangle ABC$ , se tiene que  $AB > AC$ . La bisectriz exterior del ángulo  $\angle BAC$  interseca al circuncírculo de  $\triangle ABC$  en  $E$ . Sea  $F$  la proyección de  $E$  sobre la línea  $AB$ . Demuestra que  $2AF = AB - AC$ .

**Problema 4.10** En la siguiente figura,  $ABCD$  es un cuadrado y el triángulo  $\triangle ABP$  es rectángulo con ángulo recto en  $P$ . Demuestra que

$$MN^2 = AM \cdot BN.$$



**Problema 4.11** Está dada la circunferencia  $\Omega$ . Desde un punto exterior  $P$  se trazan dos líneas tangentes a  $\Omega$  las cuales la tocan en  $A$  y  $B$ . También por  $P$  se traza una secante  $\ell$  a  $\Omega$ . Desde el centro de  $\Omega$  se traza una recta perpendicular a  $\ell$  la cual corta a  $\Omega$  en el punto  $K$  y a  $\ell$  en  $C$  (el segmento  $BK$  corta a  $\ell$ ). Demuestra que  $BK$  bisecta el ángulo  $\angle ABC$ .

**Problema 4.12** Sobre los lados  $AB$  y  $AC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  se construyen hacia afuera los cuadrados  $ABNM$  y  $CAPQ$ . Sea  $D$  el punto medio del lado  $BC$ . Demuestra que  $PM = 2 \cdot AD$ .

**Problema 4.13** En el triángulo  $\triangle ABC$  con  $AB > AC$ ,  $D$  es el punto medio del lado  $BC$ ;  $E$  está sobre el lado  $AC$ . Los puntos  $P$  y  $Q$  son los pies de las perpendiculares desde  $B$  y  $E$  a la línea  $AD$ . Demuestra que  $BE = AE + AC$  si y sólo si  $AD = PQ$ .

**Problema 4.14** Una circunferencia tiene su centro en el lado  $AB$  de un cuadrilátero cíclico  $ABCD$ . Los otros tres lados son tangentes a la circunferencia. Demuestra que  $AD + BC = AB$ .


**Problema 4.15** El ángulo  $\angle BAC$  es el menor de los ángulos del triángulo  $\triangle ABC$ . Los puntos  $B$  y  $C$  dividen a la circunferencia circunscrita del triángulo en dos arcos. Sea  $U$  un punto interior del arco  $\widehat{BC}$  que no contiene a  $A$ . Las mediatrices de  $AB$  y  $AC$  cortan a la recta  $AU$  en  $V$  y  $W$ , respectivamente. Las rectas  $BV$  y  $CW$  se cortan en  $T$ . Demuestra que  $AU = TB + TC$ .

**Problema 4.16** En un triángulo  $\triangle ABC$  sea  $AP$  la bisectriz de  $\angle BAC$  con  $P$  sobre  $BC$ , y sea  $BQ$  la bisectriz de  $\angle ABC$  con  $Q$  sobre  $CA$ . Se sabe que  $BAC = 60^\circ$  y que  $AB + BP = AQ + QB$ . ¿Cuáles son los posibles valores de los ángulos del triángulo  $\triangle ABC$ ?

## 4.2. Trazar perpendiculares y paralelas


En muchas ocasiones, al trazar una línea perpendicular o una paralela a algún segmento, obtenemos triángulos (o figuras en general) que poseen propiedades útiles en la solución de un problema.

**Ejemplo 4.2.1** Sean  $E$  y  $D$  puntos sobre la hipotenusa  $AB$  de un triángulo rectángulo  $\triangle ABC$ , con ángulo recto en  $C$ . Los puntos  $F$  y  $G$  están sobre los lados  $CB$  y  $CA$  de tal manera que  $BD = BC$ ,  $AE = AC$ ,  $EF \perp BC$ , y  $DG \perp AC$ . Demuestra que  $DE = EF + DG$ .




*Demostración.* Se traza la perpendicular a  $AB$  desde  $C$  y supongamos que ésta interseca a  $AB$  en  $H$ . Sean  $\angle CAB = 2\alpha$  y  $\angle ABC = 2\beta$ . Como el triángulo  $\triangle CAE$  es isósceles tenemos que  $\angle CEA = 90^\circ - \alpha$ , por lo que  $\angle HCE = \alpha$ . Por suma de ángulos en el triángulo  $\triangle ABC$  obtenemos que  $\angle ECB = \alpha$ . Además, tenemos que el cuadrilátero  $CHEF$  es cíclico y como  $\angle HCE = \angle ECF = \alpha$ , se sigue que  $HE = EF$ . Análogamente se obtiene que  $GD = DH$ , por lo tanto,  $DE = EF + DG$ .  $\square$

**Ejemplo 4.2.2** *Un grupo de piratas roba el tesoro de un barco y se dirige a una isla desierta a enterrar el tesoro. En la isla había dos palmeras y un roble, como se muestra en la siguiente figura. Para enterrar el tesoro, los piratas hicieron lo siguiente: contaron los pasos del roble hasta la palmera  $P_1$ , giraron  $90^\circ$  en contra de las manecillas del reloj y caminaron la misma cantidad de pasos que habían recorrido entre el roble y la palmera. Ahí pusieron una marca (el punto  $A$ ). Después hicieron lo mismo con la palmera  $P_2$  pero ahora la rotación fué en el sentido de las manecillas del reloj. De este modo marcaron una segunda posición (el punto  $B$ ). El tesoro lo enterraron a la mitad del camino entre las dos marcas (punto  $X$ ). Después de algún tiempo, el paso de un huracán se llevó el roble pero las palmeras siguieron en su lugar. Cuando los piratas llegan de nuevo a la isla para recuperar el tesoro se encuentran con la sorpresa de que solo existen las palmeras. ¿Cómo localizaron el lugar dónde estaba enterrado el tesoro?*



*Demostración.* Por alguna razón, entre los piratas había un aficionado a la Geometría y fué este pirata quien resolvió el problema. La solución es la siguiente:



Se trazan perpendiculares a  $P_1P_2$  desde los puntos  $A$ ,  $X$ ,  $R$  y  $B$ , las cuales cortan al segmento en los puntos  $P$ ,  $S$ ,  $T$  y  $Q$ , respectivamente. Observemos las igualdades de ángulos  $\angle P_1AP = \angle RP_1T$  y  $\angle P_2BQ = \angle RP_2T$ , además, de las igualdades de longitudes  $AP_1 = P_1R$  y  $BP_2 = P_2R$ , se tiene que  $\triangle AP_1P$  es congruente a  $\triangle P_1RT$  y que  $\triangle BP_2Q$  es congruente a  $\triangle P_2RT$ . De estas congruencias se tiene que  $P_1P = RT$  y  $QP_2 = RT$ , entonces se cumple que  $S$  es el punto medio de los segmentos  $PQ$  y  $P_1P_2$ . También de estas congruencias de triángulos se tiene que  $AP = P_1T$  y  $BQ = TP_2$ , entonces  $AP + BQ = P_1T + TP_2 = P_1P_2$ . Por otro lado, sabemos que  $XS = \frac{AP+BQ}{2}$  lo que implica que  $XS = \frac{P_1P_2}{2}$ .

La solución para el problema es la siguiente: se cuentan los pasos entre las palmeras, se recorre la mitad de esa distancia empezando en la palmera  $P_1$  y en dirección de la palmera  $P_2$ , se gira  $90^\circ$  en contra de las manecillas del reloj y se camina esa misma cantidad de pasos. El punto al que se llega es donde está enterrado el tesoro.  $\square$

**Ejemplo 4.2.3** En los lados opuestos  $BC$  y  $DA$  de un cuadrilátero convexo se toman los puntos  $M$  y  $N$ , de tal manera que  $BM : MC = AN : ND = AB :$

*CD.* Demuestra que la recta  $MN$  es paralela a la bisectriz del ángulo formado por los lados  $AB$  y  $CD$ .


*Demostración.* Por  $B$  y  $D$  se trazan paralelas a  $AD$  y  $AB$ , respectivamente, las cuales se intersecan en el punto  $P$ . Por  $M$  se traza una paralela a  $BP$  la cual interseca a  $PC$  en el punto  $Q$ . Tenemos que

$$\frac{MQ}{BP} = \frac{CM}{CB} = \frac{DN}{DA}$$


y como  $BP = AD$  entonces  $MQ = ND$ , además  $MQ$  es paralelo a  $ND$  y con esto tenemos que  $NMQD$  es un paralelogramo. También tenemos que

$$\frac{PQ}{QC} = \frac{BM}{MC} \implies \frac{PQ}{QC} = \frac{AB}{DC} = \frac{DP}{DC}.$$

Por el Teorema de la Bisectriz tenemos que  $DQ$  bisecta el ángulo  $\angle PDC$  y como  $NM$  es paralela a  $DQ$ , concluimos que  $NM$  es paralela a la bisectriz del ángulo formado por las rectas  $AB$  y  $DC$ .  $\square$



**Ejemplo 4.2.4** El incírculo del triángulo  $\triangle ABC$  toca los lados  $AB$ ,  $BC$  y  $CA$  en los puntos  $F$ ,  $D$  y  $E$ , respectivamente. El diámetro del incírculo, el cual pasa por el punto  $D$ , interseca al segmento  $EF$  en el punto  $N$ . Demuestra que la línea  $AN$  divide al lado  $BC$  por la mitad.



*Demostración.* Por  $N$  trazamos el segmento  $PQ$  paralelo a  $BC$ , como se muestra en la figura. Bastará entonces demostrar que el triángulo  $\triangle PIQ$  es isósceles. Como  $ID$  es perpendicular a  $BC$  ( $I$  es el incentro del triángulo) tenemos que  $\angle DNP = \angle DNQ = 90^\circ$ , además, como los ángulos  $\angle IFP$  e  $\angle IEQ$  también son rectos, tenemos que los cuadriláteros  $IFPN$  e  $INEQ$  son cíclicos. De aquí obtenemos que  $\angle IPN = \angle IFN = \alpha$  e  $\angle IQN = \angle IEN = \alpha$ , es decir,  $\angle IPN = \angle IQN = \alpha$ . Esto implica que el triángulo  $\triangle PIQ$  es isósceles. Lo cual queríamos demostrar.  $\square$


### 4.2.1. Problemas

**Problema 4.17** En un triángulo  $\triangle ABC$ , la altura  $CE$  es extendida hasta  $G$  de tal manera que  $EG = AF$ , donde  $AF$  es la altura trazada hacia  $BC$ . Una línea a través de  $G$  y paralela a  $AB$  interseca  $CB$  en  $H$ . Demuestra que  $HB = AB$ .

**Problema 4.18** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero convexo. Tomando como diámetros los lados del cuadrilátero y con centro en los puntos medios de éstos, se construyen cuatro circunferencias. Demuestra que estas cuatro circunferencias

cubren completamente al cuadrilátero.

**Problema 4.19** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo rectángulo con ángulo recto en  $A$ . Se construyen los cuadrados  $ABDE$  y  $CAPQ$  como se muestra en la figura siguiente. Se trazan las perpendiculares  $DM$  y  $QN$  hacia el lado  $BC$ . Demuestra que  $DM + QN = BC$ .



**Problema 4.20** En un triángulo isósceles  $\triangle ABC$ , con  $AB = AC$ , se extiende  $CB$  a través de  $B$  hasta un punto  $P$ . Una línea desde  $P$ , paralela a la altura  $BF$ , interseca  $AC$  en  $D$ . Se dibuja  $PE$  perpendicular a  $AB$ , con  $E$  sobre la línea  $AB$ . Demuestra que  $BF + PE = PD$ .

**Problema 4.21** Sean  $AB$  y  $CD$  dos cuerdas perpendiculares en una circunferencia de radio  $R$ . Demuestra que  $AC^2 + BD^2 = 4R^2$ .

**Problema 4.22** Un trapecio  $ABCD$ , con  $AB$  paralelo a  $CD$ , tiene sus diagonales  $AC$  y  $BD$  mutuamente perpendiculares. Demuestra que

$$AC^2 + BD^2 = (AB + DC)^2.$$

**Problema 4.23** Sea  $O$  un punto en el interior de un triángulo equilátero  $\triangle ABC$  con lados de longitud  $a$ . Las líneas  $AO$ ,  $BO$  y  $CO$  intersecan los lados en los puntos  $A_1$ ,  $B_1$  y  $C_1$ . Demuestra que  $OA_1 + OB_1 + OC_1 < a$ .



**Problema 4.24** Sea  $P$  un punto en el interior de un triángulo equilátero  $\triangle ABC$ . Desde  $P$  se bajan las perpendiculares  $PD$ ,  $PE$  y  $PF$  a los lados  $BC$ ,  $CA$  y  $AB$ , respectivamente.

(a) Demuestra que  $BD + CE + AF = DC + EA + FB$ .

(b) Encuentra el valor de

$$\frac{PD + PE + PF}{BD + CE + AF}$$

**Problema 4.25** Los lados opuestos de un hexágono  $ABCDEF$  son paralelos. Si  $BC - EF = ED - AB = AF - CD > 0$ , demuestra que todos los ángulos de  $ABCDEF$  son iguales.

**Problema 4.26** Se toma un punto  $P$  en el interior de un rectángulo  $ABCD$  de tal manera que  $\angle APD + \angle BPC = 180^\circ$ . Encuentra la suma de los ángulos  $\angle DAP$  y  $\angle BCP$ .

**Problema 4.27** Sean  $MN$ ,  $PQ$ ,  $RS$  tres segmentos iguales en los lados de un triángulo equilátero. Demuestra que en el triángulo formado por las líneas  $QR$ ,  $SM$  y  $NP$ , los segmentos  $QR$ ,  $SM$  y  $NP$ , son proporcionales a los lados en los que están contenidos.

**Problema 4.28** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero en el que  $AD = BC$  y en el que las líneas  $AD$  y  $BC$  se cortan en un punto  $T$  de modo que  $B$  está en el segmento  $TC$  y  $A$  está en el segmento  $TD$ . Sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de los lados  $DC$  y  $AB$ , respectivamente. Supongamos que la línea  $MN$  corta a las líneas  $CB$  y  $DA$  en los puntos  $P$  y  $Q$ , respectivamente. Demuestra que  $\angle DQM = \angle CPM$ .


**Problema 4.29** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero tal que los inradios de los triángulos  $\triangle ABC$ ,  $\triangle ABD$ ,  $\triangle CDA$  y  $\triangle CDB$  son iguales. Demuestra que  $ABCD$  es un rectángulo.

**Problema 4.30** Se escogen seis puntos sobre los lados de un triángulo equilátero  $\triangle ABC$ :  $A_1, A_2$  en  $BC$ ,  $B_1, B_2$  en  $CA$ ,  $C_1, C_2$  en  $AB$ , de manera que ellos son los vértices de un hexágono convexo  $A_1A_2B_1B_2C_1C_2$  con lados iguales. Prueba que las líneas  $A_1B_2$ ,  $B_1C_2$  y  $C_1A_2$  son concurrentes.


### 4.3. Trazar tangentes y cuerdas comunes

Cuando tenemos dos circunferencias tangentes, ya sea la tangencia interior o exterior, en ocasiones es muy útil trazar la línea tangente a las dos circunferencias la cual pasa por el punto común de ellas:

**Ejemplo 4.3.1** Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son tangentes en el punto  $A$ , como se muestra en la figura. A partir del punto  $A$  se trazan dos rectas las cuales intersecan a  $C_1$  y  $C_2$  en los puntos  $B, C, D$  y  $E$  como se muestra en la figura. Demuestra que los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle ADE$  son semejantes.



*Demostración.* Sea  $\ell$  la tangente común a  $C_1$  y  $C_2$  por el punto  $A$ , y sea  $\alpha$  el ángulo formado por  $\ell$  y  $AD$ . De esta manera se han formado dos ángulos semi-inscritos que intersecan los arcos  $\widehat{BA}$  y  $\widehat{DA}$  en  $C_1$  y  $C_2$ , respectivamente. Como los ángulos  $\angle ACB$  y  $\angle AED$  intersecan los arcos  $\widehat{BA}$  y  $\widehat{DA}$ , tenemos que  $\angle ACB = \angle AED = \alpha$ . De aquí se sigue que  $BC \parallel DE$ , por lo tanto, los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle ADE$  son semejantes.  $\square$



Un trazo que podríamos considerar obligatorio es el siguiente: siempre que tengamos dos circunferencias que se cortan en dos puntos, debemos trazar *la cuerda común*.

**Ejemplo 4.3.2** *Dos circunferencias se intersectan en los puntos A y B. Por el punto A se han trazado los segmentos AC y AD, cada uno de los cuales, siendo cuerda de una circunferencia, es tangente a la segunda circunferencia. Demuestra que  $AC^2 \cdot BD = AD^2 \cdot BC$ .*


*Demostración.* Trazamos la cuerda común AB. Con esto obtenemos que  $\angle ACB = \angle DAB = \alpha$ , ya que ambos ángulos interceptan el arco  $\widehat{AB}$  en la primera circunferencia. Análogamente, obtenemos que  $\angle ADB = \angle CAB = \beta$ . Con estas dos igualdades de ángulos obtenemos que los triángulos  $\triangle ACB$  y  $\triangle DAB$  son semejantes. Tenemos entonces que

$$\frac{AC}{DA} = \frac{AB}{DB} = \frac{CB}{AB}.$$

De aquí se deriva que:

$$\left(\frac{AC}{DA}\right)^2 = \frac{AB \cdot CB}{DB \cdot AB} = \frac{CB}{DB},$$

de donde se obtiene fácilmente la igualdad deseada. □




**Ejemplo 4.3.3** Sean  $C_1$  y  $C_2$  dos circunferencias las cuales son tangentes exteriormente en un punto  $I$ , y sea  $\Gamma$  una circunferencia la cual es tocada internamente por  $C_1$  y  $C_2$  en los puntos  $R$  y  $S$ , respectivamente. Sea  $AB$  la cuerda de  $\Gamma$  la cual es tangente exterior a  $C_1$  y  $C_2$  en  $T$  y  $U$ , respectivamente. La tangente común en  $I$  a  $C_1$  y  $C_2$  interseca a  $\Gamma$  en  $C$  y  $D$ , con  $C$  sobre el mismo lado de  $AB$  que  $I$ .


(a) Demuestra que los puntos  $R, T, D$  son colineales.

(b) Demuestra que  $I$  es el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ .

*Demostración.* Sea  $D'$  el punto medio del arco  $\widehat{BA}$ , y observemos que el punto  $D$  está sobre el eje radical de  $C_1$  y  $C_2$ . Entonces bastará con demostrar que  $D'$  tiene la misma potencia con respecto a  $C_1$  y  $C_2$  y así de esta manera coincidirá con  $D$ . Por el resultado del problema 3.3.3 tenemos que  $R, T$  y  $D'$  son colineales, asimismo,  $S, U$  y  $D'$  son colineales. Observemos que  $\angle RTA = \frac{\widehat{AR} + \widehat{BD'}}{2} = \frac{\widehat{AR} + \widehat{D'A}}{2} = \angle RSD'$ , se sigue entonces que el cuadrilátero  $RTUS$  es cíclico. Por potencia del punto  $D'$  con respecto a la circunferencia circunscrita a  $RTUS$  obtenemos que  $D'T \cdot D'R = D'U \cdot D'S$ . Esto a su vez implica que  $D'$  tiene la misma potencia con respecto a  $C_1$  y  $C_2$ , por lo que concluimos que  $D' = D$ .



Ahora, para el inciso (b) recordemos que para que  $I$  sea el incentro del triángulo  $\triangle ABC$  es suficiente que se cumpla que  $DI = DB = DA$ . Notemos que  $\angle BSD = \angle ABD = \alpha$ , ya que intersecan arcos de la misma longitud. Tenemos entonces que los triángulos  $\triangle DSB$  y  $\triangle DBU$  son semejantes. De aquí se obtiene que  $DU \cdot DS = DB^2$ , que es precisamente la potencia de  $D$  con respecto a  $C_2$ . Recordemos además que la potencia de  $D$  con respecto a  $C_2$  es también  $DI^2$ , por lo tanto,  $DB = DI$ .  $\square$




### 4.3.1. Problemas


**Problema 4.31** Dos circunferencias son tangentes exteriormente en un punto  $A$ .  $BC$  es una tangente común externa. Demuestra que  $\angle BAC = 90^\circ$ .

**Problema 4.32** Dos circunferencias de centros  $O_1$  y  $O_2$  se intersecan en los puntos  $A$  y  $B$ , como se muestra en la figura. La línea  $CD$  es tangente a ambas circunferencias. Demuestra que


$$\angle CAD = \frac{1}{2} \angle O_1AO_2.$$




**Problema 4.33** Dos circunferencias se cortan en dos puntos  $A$  y  $B$ . Se escogen dos puntos  $C, E$  sobre una de las circunferencias; se trazan los rayos  $\overrightarrow{CA}$  y  $\overrightarrow{EA}$  que cortan a la segunda circunferencia en los puntos  $D$  y  $F$ , respectivamente. Demuestra que los triángulos  $\triangle BCE$  y  $\triangle BDF$  son semejantes.



**Problema 4.34** Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son tangentes interiormente a  $C_3$  en los puntos  $A$  y  $B$ , respectivamente. Se traza una tangente exterior común a  $C_1$  y  $C_2$  la cual toca a las circunferencias en los puntos  $C$  y  $D$ , respectivamente. Demuestra que las rectas  $AC$  y  $BD$  se intersecan en un punto sobre la circunferencia  $C_3$ .



**Problema 4.35** Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son tangentes interiormente a la circunferencia  $C_3$  en los puntos  $A$  y  $B$ , como se ve en la figura. La tangente interior común a  $C_1$  y  $C_2$  toca a estas circunferencias en  $P$  y  $Q$ , respectivamente. Demuestra que las rectas  $AP$  y  $BQ$  intersecan a la circunferencia  $C_3$  en puntos diametralmente opuestos.




**Problema 4.36** Dos circunferencias  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  están dentro de la circunferencia  $\Gamma$ , y son tangentes a  $\Gamma$  en puntos distintos  $M$  y  $N$ , respectivamente. La circunferencia  $\Gamma_1$  pasa por el centro de la circunferencia  $\Gamma_2$ . La recta que pasa por los

dos puntos de intersección de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  corta a  $\Gamma$  en los puntos  $A$  y  $B$ . Las rectas  $MA$  y  $MB$  cortan a  $\Gamma_1$  en los puntos  $C$  y  $D$ , respectivamente. Demuestra que  $CD$  es tangente a  $\Gamma_2$ .

**Problema 4.37** Dos circunferencias  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  se cortan en  $M$  y  $N$ . Sea  $l$  la tangente común a  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  tal que  $M$  está más cerca de  $l$  que  $N$ . La recta  $l$  es tangente a  $\Gamma_1$  en  $A$  y a  $\Gamma_2$  en  $B$ . La recta paralela a  $l$  que pasa por  $M$  corta de nuevo a  $\Gamma_1$  en  $C$  y a  $\Gamma_2$  en  $D$ . Las rectas  $CA$  y  $DB$  se intersecan en  $E$ ; las rectas  $AN$  y  $CD$  se intersecan en  $P$ ; las rectas  $BN$  y  $CD$  se intersecan en  $Q$ . Demuestra que  $EP = EQ$ .

**Problema 4.38** Sean  $S_1$  y  $S_2$  dos circunferencias de centros  $O_1$  y  $O_2$ , respectivamente, secantes en  $M$  y  $N$ . La recta  $t$  es la tangente común a  $S_1$  y  $S_2$  más cercana a  $M$ . Los puntos  $A$  y  $B$  son los respectivos puntos de contacto de  $t$  con  $S_1$  y  $S_2$ ;  $C$  el punto diametralmente opuesto a  $B$  y  $D$  el punto de intersección de la recta  $O_1O_2$  con la recta perpendicular a la recta  $AM$  que pasa por  $B$ . Demuestra que  $M$ ,  $D$  y  $C$  están alineados.

**Problema 4.39** Una circunferencia  $\Omega$  es tangente en un punto  $P$  interiormente a una circunferencia  $\Gamma$ . Dos cuerdas de  $\Gamma$ ,  $AD$  y  $BC$  son tangentes a  $\Omega$  en  $E$  y  $F$ , como se muestra en la figura. Sea  $I$  el punto donde la bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  y la línea  $EF$  se cortan. Demuestra que  $I$  es el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ .





**Problema 4.40** Teorema de Thébault. Sean  $AD$  y  $BC$  dos cuerdas de una circunferencia  $\Gamma$  las cuales se intersecan en un punto  $K$ . Sean  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  las circunferencias que son tangentes a  $\Gamma$  por el interior y a los pares de segmentos  $AK, BK$  y  $AK, CK$ , respectivamente. Sean  $I, I_1, I_2$  los centros de la circunferencia inscrita en el triángulo  $\triangle ABC$ , de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$ . Demuestra que  $I_1, I$  e  $I_2$  son colineales.

## 4.4. Construir un ángulo

Al igual que se hizo con segmentos, en ocasiones conviene construir un ángulo el cual es mencionado en el problema. En el siguiente ejemplo queda clara esta idea:

**Ejemplo 4.4.1** Se escoge un punto  $D$  en el interior de un triángulo escaleno  $\triangle ABC$  de tal manera que el ángulo  $\angle ADB = \angle ACB + 90^\circ$  y  $AC \cdot BD = AD \cdot BC$ . Encuentra


$$\frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD}.$$

*Demostración.* Se traza el segmento  $CE$  de la misma longitud que  $AC$  y de tal manera que  $CE$  es perpendicular a  $AC$  (aquí hemos formado el ángulo  $\angle ACB + 90^\circ$ ). Tenemos que  $\angle BCE = \angle BDA$ , además  $\frac{BD}{BC} = \frac{AD}{AC} = \frac{AD}{EC}$  lo cual implica que  $\triangle ABD \sim \triangle EBC$ . Por otro lado, como  $\angle ABE = \angle DBC$  y  $\frac{AB}{BE} = \frac{BD}{BC}$  tenemos que

$$\triangle ABE \sim \triangle DBC \implies \frac{AB}{BD} = \frac{AE}{CD}.$$

Esto a la vez implica que

$$\frac{AB}{BD} = \frac{\sqrt{2}AC}{CD} \implies \frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD} = \sqrt{2}. \quad \square$$



Si en un problema se sabe que uno de los ángulos mide el doble que otro, entonces conviene duplicar el ángulo más pequeño o trazar la bisectriz del ángulo más grande. De este modo se obtienen triángulos isósceles que pueden ayudarnos a descubrir una solución.

**Ejemplo 4.4.2** En un triángulo  $\triangle ABC$  tenemos que  $\angle BCA$  es obtuso y  $\angle BAC = 2 \cdot \angle ABC$ . La línea a través de  $B$  y perpendicular a  $BC$  interseca a la línea  $AC$  en  $D$ . Sea  $M$  el punto medio de  $AB$ . Entonces  $\angle AMC = \angle BMD$ .


*Demostración.* Sea  $\alpha = \angle ABC$ . Construiremos el ángulo  $2 \cdot \angle ABC$ , para esto, consideremos el punto  $F$  sobre la línea  $CD$  de manera que  $\angle CBF = \alpha$ . sea  $H$  el punto donde la bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  interseca al segmento  $BF$ . Dado que  $\angle DBC = 90^\circ$  tenemos que  $BD$  es bisectriz exterior del ángulo  $\angle DBF$ , entonces se cumple que  $\frac{FD}{DA} = \frac{BF}{BA}$ . Por otro lado, por el Teorema de la bisectriz en el triángulo  $\triangle ABF$  con la bisectriz  $AH$  tenemos que  $\frac{BH}{HF} = \frac{AB}{AF}$ . De todo esto se sigue que

$$\frac{BH}{HF} \cdot \frac{FD}{DA} \cdot \frac{AM}{MB} = \frac{AB}{AF} \cdot \frac{BF}{AB},$$

además, como  $BF = AF$  tenemos que

$$\frac{AB}{BF} \cdot \frac{BF}{AB} = 1.$$


Entonces, por el Teorema de Menelao, tenemos que  $D$ ,  $H$  y  $M$  son colineales. Se sigue que  $\angle HMB = \angle DMB = \angle CMA$ .  $\square$



También es útil reflejar algún punto con respecto a los lados de un triángulo ó cuadrilátero, además, si en el problema aparece  $\sqrt{3}$  ó algún ángulo de  $60^\circ$ , entonces puede ser de utilidad trazar algún triángulo equilátero.


**Ejemplo 4.4.3** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo equilátero y sea  $P$  un punto en su interior de manera que  $PA = 3$ ,  $PB = 4$ ,  $PC = 5$ . Encuentra el área del triángulo  $\triangle ABC$ .

*Solución.* Reflejamos el punto  $P$  con respecto a los lados del triángulo y obtenemos los puntos  $P_A$ ,  $P_B$  y  $P_C$  como se muestra en la figura. Notemos que los triángulos  $\triangle AP_C P_B$ ,  $\triangle B P_A P_C$  y  $\triangle C P_B P_A$  son isósceles y tienen un ángulo igual a  $120^\circ$ . La suma de sus áreas es entonces  $\frac{\sqrt{3}}{4}(3^2 + 4^2 + 5^2) = \frac{25\sqrt{3}}{2}$ . Además, notemos que los lados del triángulo  $\triangle P_A P_B P_C$  miden  $3\sqrt{3}$ ,  $4\sqrt{3}$  y  $5\sqrt{3}$ , entonces es un triángulo rectángulo cuya área es  $\frac{(3\sqrt{3})(4\sqrt{3})}{2} = 18$ . Por otro lado, el área del hexágono  $AP_C B P_A C P_B$  es el doble del área del triángulo  $\triangle ABC$ , se sigue que el área de  $\triangle ABC$  es  $\frac{1}{2}(\frac{25\sqrt{3}}{2} + 18)$ .  $\square$




**Observación 4.4.1** Este problema también se puede resolver si construimos triángulos equiláteros de lados 3, 4 y 5. Se forman además de los triángulos equiláteros, triángulos rectángulos de lados 3, 4 y 5. De este modo es sencillo calcular el área del triángulo.

**Ejemplo 4.4.4** Sea  $ABCD$  un cuadrado con lado de longitud 1 y sean  $M$ ,  $N$ ,  $P$  y  $Q$ , puntos sobre sus lados como se muestra en la figura. Demuestra que el perímetro de  $MNPQ$  es mayor o igual que  $2\sqrt{2}$ .



*Demostración.* Dibujamos cuadrados congruentes a  $ABCD$  de manera que el recorrido formado por los segmentos  $QM$ ,  $MN$ ,  $NP$ ,  $PQ$ , ahora se obtiene con los segmentos  $QM$ ,  $MN'$ ,  $N'P'$ ,  $P'Q'$ , donde  $MN' = MN$ ,  $N'P' = NP$  y  $P'Q' = PQ$  (como se observa en la siguiente figura). Como tenemos la igualdad  $Q'D' = QD$ , se sigue que  $TQ' = TQ = 2$ , donde  $T$  está sobre la línea  $Q'A'$  y  $TQ$  es paralelo a  $AB$ . Del triángulo rectángulo isósceles  $\triangle Q'TQ$  tenemos que  $QQ' = 2\sqrt{2}$ , se sigue entonces que  $QM + MN' + N'P' + P'Q' \geq 2\sqrt{2}$ , es decir, el perímetro del cuadrilátero  $MNPQ$  es mayor o igual que  $2\sqrt{2}$ .  $\square$



## 4.4.1. Problemas

**Problema 4.41** Sea  $ABCD$  un cuadrado y sean  $P$  y  $Q$  puntos sobre los lados  $AB$  y  $BC$  de manera que  $\angle PDQ = 45^\circ$ . Demuestra que  $AP + QC = PQ$ .

**Problema 4.42** Encuentra el valor del lado de un decágono regular en función del radio de la circunferencia circunscrita a éste.

**Problema 4.43** Sea  $AD$  la mediana del triángulo  $\triangle ABC$ . Sabemos que  $\angle DAC + \angle ABC = 90^\circ$ . Halla el  $\angle BAC$  si se sabe que  $AB \neq AC$ .

**Problema 4.44** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo con  $\angle BCA = 60^\circ$  y  $AC < BC$ . El punto  $D$  está sobre el lado  $BC$  y cumple que  $BD = AC$ . El lado  $AC$  es extendido hasta el punto  $E$  de manera que  $AC = CE$ . Demuestra que  $AB = DE$ .

**Problema 4.45** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero en el que  $AD = DC = CB$  y  $\angle DAB + \angle CBA = 120^\circ$ . Demuestra que los circuncentros de los triángulos  $\triangle ABC$  y  $\triangle ABD$  y el punto  $P$  de intersección de las diagonales  $DB$  y  $AC$ , son colineales.

**Problema 4.46** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo equilátero con lado de longitud  $\lambda$  y sea  $M$  un punto en su interior a distancia  $d$  de su circuncentro. Demuestra que con tres segmentos de longitudes  $MA$ ,  $MB$ ,  $MC$  se puede formar un triángulo y que su área es

$$\frac{\sqrt{3}}{12}(\lambda^2 - 3d^2).$$

**Problema 4.47** Sea  $M$  el punto medio del lado  $BC$  de un triángulo  $ABC$ . Se sabe que  $\angle BAM = \frac{1}{2}\angle MAC$ . Se extiende  $AM$  a través de  $M$  hasta un punto  $D$  de tal manera que  $\angle ABD = 90^\circ$ . Demuestra que

$$AC = \frac{1}{2}AD.$$

**Problema 4.48** En el triángulo  $\triangle ABC$ ,  $AB = AC$  y  $\angle BAC = 80^\circ$ . En el interior del triángulo se toma el punto  $M$  de tal manera que  $\angle MBC = 30^\circ$  y  $\angle MCB = 10^\circ$ . Halla el ángulo  $\angle AMC$ .

**Problema 4.49** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo en el que  $\angle ABC = 60^\circ$ . Sea  $D$  el punto donde la bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  corta al lado  $BC$  y sea  $O$  el circuncentro del triángulo  $\triangle ADC$ . Finalmente, sea  $K$  el punto sobre  $AC$  tal que  $\angle KDA = 30^\circ$ . Encuentra el valor del ángulo  $\angle OKC$ .

**Problema 4.50** Sean  $P$  y  $Q$  puntos en el interior de un triángulo  $\triangle ABC$  tales que  $\angle PAB = \angle QAC$  y  $\angle PBA = \angle QBC$ . Encuentra

$$\frac{PA \cdot QA}{AB \cdot AC} + \frac{PB \cdot QB}{AB \cdot BC} + \frac{PC \cdot QC}{BC \cdot AC}.$$

**Problema 4.51** Sea  $P$  un punto interior al triángulo  $\triangle ABC$  tal que  $\angle APB - \angle ACB = \angle APC - \angle ABC$ . Sean  $D$  y  $E$  los incentros de los triángulos  $\triangle APB$  y  $\triangle APC$ , respectivamente. Demuestra que  $AP$ ,  $BD$  y  $CE$  son concurrentes.


## 4.5. Circunferencias auxiliares

En algunos problemas, trazar la circunferencia que pasa por algunos de los puntos puede ser útil, ya que de este modo aparecen más puntos sobre esa circunferencia los cuales nos dan información útil para descubrir una solución. No siempre es claro que tenemos que trazar alguna circunferencia auxiliar, sin embargo, algunos detalles del problema nos pueden hacer sospechar que el trazo puede ser útil: si se mencionan dos segmentos de la misma longitud unidos por un punto, si en el problema aparece un cuadrilátero cíclico entonces conviene trazar su circunferencia circunscrita y observar la intersecciones de ésta con algunos segmentos, si aparece un producto de longitudes de segmentos que se parece a la potencia de un punto, trazar la circunferencia circunscrita del triángulo.

Nuestro primer ejemplo, aunque ya lo estudiamos en la sección de simedias, es un buen ejemplo de como la circunferencia auxiliar es un trazo útil.

**Ejemplo 4.5.1** Las tangentes a la circunferencia circunscrita de un triángulo  $\triangle ABC$  en los puntos  $B$  y  $C$  se intersectan en un punto  $P$ . Entonces tenemos que  $AP$  es la simediana del lado  $BC$ .

*Demostración.* Tracemos la circunferencia con centro en  $P$  y radio  $BP$  y consideremos los puntos  $D$  y  $E$  donde ésta interseca a las líneas  $AB$  y  $AC$ . Sean  $\angle BAC = \theta$ ,  $\angle ABC = \beta$  y  $\angle ACB = \alpha$ , entonces tenemos que  $\angle BPD = 180^\circ - 2\alpha$ ,  $\angle BPC = 180^\circ - 2\theta$  y  $\angle CPE = 180^\circ - 2\beta$ . Se sigue que  $\angle BPD + \angle BPC + \angle CPE = 540^\circ - 2(\alpha + \theta + \beta) = 180^\circ$ , es decir, los puntos  $D$ ,  $P$  y  $E$  son colineales. Ahora, como  $\angle BDE = \angle ACB = \alpha$ , tenemos que  $BDEC$  es un cuadrilátero cíclico. Dado que  $DP = PE$ , tenemos que  $AP$  es la mediana del triángulo  $\triangle ADE$  y como  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ , pero tienen diferente orientación, tenemos que  $AP$  es la simediana del triángulo  $\triangle ABC$  trazada hacia el lado  $BC$ .  $\square$




También la siguiente demostración ya fue analizada previamente, sin embargo, la incluimos en esta sección ya que es un ejemplo muy representativo de cómo trazando circunferencias auxiliares se pueden desarrollar demostraciones elegantes.

**Ejemplo 4.5.2** (Teorema de Brianchon). Si un hexágono convexo posee una circunferencia inscrita, entonces las diagonales principales son concurrentes.

*Demostración.* Sea  $ABCDEF$  el hexágono dado y sean  $R, Q, T, S, P$  y  $U$ , los puntos en los cuales la circunferencia toca a los lados  $AB, BC, CD, DE, EF$  y  $FA$ , respectivamente. Prolongamos los segmentos  $EF, CB, AB, ED, CD$  y  $AF$  (como se muestra en la figura siguiente) hasta los puntos  $P', Q', R', S', T'$  y  $U'$ , de manera que

$$PP' = QQ' = RR' = SS' = TT' = UU'.$$

Sea  $\Gamma_1$  la circunferencia tangente a las líneas  $PP'$  y  $QQ'$  en los puntos  $P'$  y  $Q'$ , sea  $\Gamma_2$  la circunferencia tangente a  $RR'$  y  $SS'$  en los puntos  $R'$  y  $S'$  y sea  $\Gamma_3$  la circunferencia tangente a  $TT'$  y  $UU'$  en los puntos  $T'$  y  $U'$ . Como  $AR = AU$  y  $RR' = UU'$ , tenemos que  $AR' = AU'$ ; además, como  $DT = DS$  y  $TT' = SS'$  tenemos que  $DT' = DS'$ . De lo anterior se sigue que  $A$  y  $D$  están sobre el eje radical de  $\Gamma_2$  y  $\Gamma_3$ , es decir, la línea  $AD$  es el eje radical de  $\Gamma_2$  y  $\Gamma_3$ . Análogamente, se demuestra que la línea  $BE$  es el eje radical de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$ , y que la línea  $CF$  es el eje radical de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_3$ . Como los ejes radicales de tres circunferencias son concurrentes, tenemos entonces que las líneas  $AD, BE$  y  $CF$  concurren.  $\square$



**Ejemplo 4.5.3** Sea  $ABCD$  un paralelogramo. Una línea a través de  $A$  corta a



los rayos  $\overrightarrow{CB}$  y  $\overrightarrow{CD}$  en los puntos  $E$  y  $F$ , respectivamente. Entonces se cumple que  $CB \cdot CE + CD \cdot CF = AC^2 + AE \cdot AF$ .

*Demostración.* Trazamos la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle FCE$  y prolongamos el segmento  $CA$  hasta que corte a la circunferencia en un punto  $T$ . Aplicamos el Teorema de Ptolomeo al cuadrilátero  $FCET$  y obtenemos que

$$CF \cdot TE + CE \cdot FT = CT \cdot FE.$$

Como  $\triangle FTE$  es semejante al triángulo  $\triangle CBA$ , obtenemos que


$$\frac{FE}{CA} = \frac{FT}{CB} = \frac{TE}{AB} = \lambda,$$

para algún número  $\lambda$  positivo. De aquí se sigue que  $CF \cdot \lambda AB + CE \cdot \lambda CB = CT \cdot \lambda CA$ , es decir,

$$CF \cdot AB + CE \cdot CB = (CA + AT) \cdot CA = CA^2 + CA \cdot AT.$$

Por potencia del punto  $A$  tenemos que  $CA \cdot AT = AE \cdot AF$ , concluimos entonces que


$$CB \cdot CE + CD \cdot CF = AC^2 + AE \cdot AF. \quad \square$$



### 4.5.1. Problemas

**Problema 4.52** Sea  $AB$  una cuerda de una circunferencia  $\Gamma$  con longitud menor al diámetro de la circunferencia y sea  $X$  un punto sobre la cuerda  $AB$ . Encuentra el punto  $P$  sobre el arco  $\widehat{AB}$  (menor que una semicircunferencia) para el cual la longitud del segmento  $PX$  es la menor posible.

**Problema 4.53** En la siguiente figura  $AB = AD = 5$ ,  $BC = 9$  y  $AC = 7$ . Encuentra  $\frac{BD}{DC}$ .



**Problema 4.54** Demuestra que si la altura y la mediana, trazadas desde uno de los vértices de un triángulo escaleno, se encuentran dentro del triángulo y forman con sus lados laterales ángulos iguales, dicho triángulo es rectángulo.

**Problema 4.55** Sea  $D$  un punto sobre el lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  de manera que  $AD$  bisecta el ángulo  $\angle BAC$ . Demuestra que

$$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC.$$

**Problema 4.56** Sea  $D$  un punto sobre la extensión del lado  $BC$ , de un triángulo  $\triangle ABC$ , de manera que  $AD$  bisecta el ángulo exterior  $\angle BAC$ . Demuestra que

$$AD^2 = BD \cdot DC - AB \cdot AC.$$

**Problema 4.57** En una galería de arte una persona está observando un cuadro que se encuentra a una altura mayor que la altura a la que se encuentran sus ojos. ¿Dónde debe pararse para observar el cuadro bajo el mayor ángulo posible? Podemos suponer que el mundo es bidimensional y que el cuadro es un segmento sobre una línea perpendicular al piso.

**Problema 4.58** Sea  $P$  un punto en el interior de un ángulo de rayos  $\overrightarrow{OA}$  y  $\overrightarrow{OB}$ . ¿Cómo deben ser elegidos los puntos  $M$  en  $\overrightarrow{OA}$  y  $N$  en  $\overrightarrow{OB}$ , de manera que  $M, N, P$ , sean colineales y que el perímetro del triángulo  $\triangle OMN$  sea mínimo.

**Problema 4.59** Sean  $D$  y  $E$  puntos sobre el lado  $BC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  tal que  $\angle BAD = \angle CAE$  y de manera que  $D$  es el punto más cercano a  $B$  y  $E$  es el punto más cercano a  $C$ . Demuestra que

$$\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{BD \cdot BE}{CE \cdot CD}.$$

**Problema 4.60** Sea  $ABCD$  un cuadrilátero cíclico en el que  $AD + BC = AB$ . Demuestra que las bisectrices de los ángulos  $\angle ADC$  y  $\angle BCD$  se intersectan sobre la línea  $AB$ .

**Problema 4.61** La bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  de un triángulo  $\triangle ABC$  intersecta al lado  $BC$  en  $L$  y al circuncírculo en  $N$ . Sean  $K$  y  $M$  las proyecciones de  $L$  sobre los lados  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. Demuestra que  $|ABC| = |AKNM|$ .

**Problema 4.62** Teorema de Haruki. Sean  $AB$  y  $CD$  dos cuerdas sobre una circunferencia las cuales no se intersectan y sea  $P$  un punto variable sobre el arco  $\widehat{AB}$ , el cual no contiene los puntos  $C$  y  $D$ . Sean  $E$  y  $F$  las intersecciones de las cuerdas  $PC, AB$ , y  $PD, AB$ , respectivamente. Entonces el valor de  $\frac{AE \cdot BF}{EF}$  no depende de la posición del punto  $P$ .

**Problema 4.63** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo acutángulo no isósceles. La bisectriz del ángulo agudo entre las alturas desde  $A$  y  $C$  intersecta a  $AB$  en  $P$  y a  $BC$  en  $Q$ . La bisectriz del ángulo  $\angle ABC$  intersecta a la línea  $HN$  en  $R$ , donde  $H$  es el ortocentro y  $N$  el punto medio de  $AC$ . Demuestra que los puntos  $B, R, P$  y  $Q$  son concíclicos.



---

## Capítulo 5

# Sugerencias para los problemas propuestos

---

En este capítulo encontrarás sugerencias que pueden ser útiles en la demostración y/o solución de algunos de los problemas. Siéntete libre de enviar tus críticas, comentarios, sugerencias, etc... En fin, todo aquello que pueda ayudar a mejorar la claridad de exposición y comprensión del contenido del libro. Todo comentario será bienvenido y considerado con mucho agradecimiento de mi parte. Mis correos electrónicos son los siguientes:

jeronimo@cimat.mx y jesusjero@hotmail.com

### Sugerencias para los problemas del Capítulo 1.

**Problema 1.2** Prolonga  $BP$  hasta intersectar al segmento  $AC$  y considera los triángulos que se forman.

**Problema 1.4** Sea  $M$  el punto medio del lado  $CD$ . Observa que el triángulo  $\triangle AMD$  es equilátero.

**Problema 1.5** Considera primero el caso de un cuadrilátero. Divídelo en triángulos trazando las diagonales desde uno de los vértices. Aplica lo mismo para el caso general.

**Problema 1.6** Si una de las líneas corta a la circunferencia en los puntos  $A, B$  y la otra en los puntos  $C, D$ , traza una de las diagonales del cuadrilátero  $ABCD$  y usa la igualdad de ángulos alternos internos, que en este caso son inscritos.

**Problema 1.7** Si  $\ell$  es la línea tangente a la circunferencia en el punto  $A$  y el ángulo semi-inscrito se forma con  $\ell$  y la secante  $AB$ , traza la cuerda  $CB$  paralela a  $\ell$  y utiliza el resultado del problema anterior.

**Problema 1.8** Sean  $A, B, C, D$  los puntos de división de la circunferencia considerados en el orden de las manecillas del reloj y sean  $M, N, P, Q$  los puntos medios de los arcos  $\widehat{AB}, \widehat{BC}, \widehat{CD}, \widehat{DA}$ , respectivamente. Demuestre que  $MP$  es perpendicular a  $NQ$ .

**Problema 1.9** Traza la cuerda  $AB$  y observa los ángulos semi-inscritos que se forman.

**Problema 1.10** Traza la recta tangente común de las circunferencias y considera el punto donde ésta intersecta al segmento  $BC$ .

**Problema 1.12** Traza un diámetro el cual pase por uno de los vértices del lado en cuestión y traza el segmento que une el otro vértice del lado con el otro extremo del diámetro trazado.

**Problema 1.13** Observa que  $CD$  es tangente al círculo con centro en  $B$  y radio  $BC$ , utiliza el ángulo semi-inscrito que se forma.

**Problema 1.14** Observa que la medida del ángulo  $\angle ACB$  no depende de la elección del punto  $C$ . Después prueba que la medida del arco  $\widehat{ED}$  es constante.

**Problema 1.15** Observa que los triángulos  $\triangle AO_1C$  y  $\triangle AO_2D$  son isósceles y que  $O_1C$  y  $O_2C$  son perpendiculares a  $CD$ .

**Problema 1.16** Traza la cuerda  $BE$ . Observa que el triángulo  $\triangle BEC$  es rectángulo y utiliza los ángulos semi-inscritos.

**Problema 1.17** Traza la línea  $\ell$  tangente a la circunferencia en el punto  $M$ , prolonga el segmento  $RQ$  hasta que intersecte a  $\ell$  en un punto  $T$ . Después utiliza las igualdades entre ángulos inscritos y semi-inscritos.

**Problema 1.18** Completa el paralelogramo  $ABCD$  con los vértices considerados en ese orden, y prolonga los segmentos  $b, c$  y  $d$ , hasta que intersecten al lado  $AD$  del paralelogramo.

**Problema 1.19** Sean  $P$  y  $Q$  los puntos donde  $LC$  y  $AM$  intersectan a  $BD$ . Traza una recta paralela a  $LC$  a través del punto  $B$  y utiliza el Teorema de Tales para probar que  $BP = PQ$ . De manera análoga prueba que  $DQ = QP$ .

**Problema 1.20** Sea  $T$  un punto tal que  $ABTD$  es un paralelogramo y sean  $P$  y  $Q$  los puntos medios de los lados  $BT$  y  $DT$ . Prueba que  $PM$  debe ser paralelo a  $TC$ , lo cual es una contradicción.

**Problema 1.21** Traza líneas paralelas a  $BQ$  a través de  $M$  y a través del punto medio del segmento  $AP$ . Considera los puntos donde estas paralelas intersectan a  $AC$ .

**Problema 1.22** Sea  $T$  el punto medio del lado  $BC$ . Usa que  $MNTB$  es un paralelogramo.

**Problema 1.23** Por  $B$  y  $N$  traza paralelas a  $AD$ .

**Problema 1.25** Utiliza el resultado del problema anterior.

**Problema 1.26** Observa que el cuadrilátero formado por los puntos medios de las diagonales y por los dos puntos medios de los lados es un paralelogramo.

**Problema 1.27** Utiliza la semejanza de los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle ABC$ .

**Problema 1.28** Observa las igualdades de ángulos entre los ángulos semi-inscritos y los ángulos inscritos que se forman. De ahí se obtiene la semejanza de los triángulos  $\triangle ACB$  y  $\triangle ADB$ .

**Problema 1.29** Prolonga el segmento  $AD$ , más allá del punto  $D$ , hasta un punto  $X$  de manera que se cumpla que  $AX = 2 \cdot AD$ . Después, demuestre que los triángulos  $\triangle ACX$  y  $\triangle APM$  son congruentes.

**Problema 1.30** Utiliza las semejanzas de los triángulos  $\triangle AHE \sim \triangle EBC$  y  $\triangle FGC \sim \triangle FBA$ .

**Problema 1.31** Considera los segmentos que unen los puntos medios de las bases del trapecio con el punto de intersección de las diagonales. Después, usa semejanza para ver que estos segmentos forman ángulos iguales con respecto a alguna de las diagonales.

**Problema 1.32** Traza por  $D$  el segmento  $DE'$  paralelo a  $BC$  con  $E'$  en el lado  $AC$ . Sea  $N$  el punto medio de  $DE'$ . Por el problema anterior tenemos que  $M$ ,  $N$  y el punto de intersección de  $CD$  con  $BE'$ , son colineales. También se puede ver que  $A$  es colineal con  $M$  y  $N$ . De aquí es fácil deducir que  $E' = E$ .

**Problema 1.36** Prolonga los segmentos  $AD$  y  $BC$  hasta que se intersecten para formar un triángulo rectángulo.

**Problema 1.38** Considera dos lados adyacentes del paralelogramo y los centros de los cuadrados contruídos sobre ellos. Con estos dos centros y el vértice en común de estos dos lados, se obtienen los vértices de un triángulo. Considera los otros tres triángulos formados así de esta manera. Prueba que esos triángulos son congruentes. Observa los ángulos que forman entre sí sus lados respectivos.

**Problema 1.39** Sea  $P$  el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero. De la semejanza  $\triangle APD \sim \triangle KPB$  se obtiene la relación  $\frac{AP}{PK} = \frac{PD}{PB}$ . De manera análoga se obtiene  $\frac{BP}{PM} = \frac{PC}{AP}$ . Al multiplicar estas dos igualdades se obtiene la conclusión del problema.

**Problema 1.40** Sea  $N$  el punto medio del segmento  $AM$ . Prueba que el triángulo  $\triangle BNP$  es semejante al triángulo  $\triangle BAM$  y al triángulo  $\triangle BMH$ . Utiliza además que  $NP$  es paralelo a  $AH$ .

**Problema 1.41** Demuestra que los triángulos  $\triangle B_2A_1C$  y  $\triangle A_2B_1C$  son congruentes y observa que sus lados respectivos forman ángulo de  $90^\circ$  entre sí.

**Problema 1.42** Prueba que los triángulos  $\triangle MBE$  y  $\triangle NFC$  son semejantes. Los lados correspondientes son paralelos.

**Problema 1.43** Sean  $P$  y  $Q$  los puntos de intersección de los pares de líneas  $NE, AB$  y  $BC, ME$ . Por el Teorema de Tales tenemos que  $\frac{PN}{PE} = \frac{NB}{BM}$  y  $\frac{QE}{MQ} =$



$\frac{NB}{BM}$ . De esto se obtiene que  $PN \cdot MQ = PE \cdot QE$ . De manera análoga se obtiene que  $PA \cdot QC = PB \cdot BQ$ . Ahora utiliza que  $BPEQ$  es un paralelogramo. De aquí se puede concluir fácilmente que los triángulos  $\triangle NPA$  y  $\triangle CQM$  son semejantes.

**Problema 1.44** Sean  $M$  sobre  $BC$  de manera que  $BM = \frac{1}{2}MC$  y sea  $N$  el punto sobre  $\Gamma$  el cual es colineal con  $A$  y  $M$ . Sea  $P$  el punto medio del lado  $BC$ . Demuestra que los triángulos  $\triangle ABM$  y  $\triangle NPM$  son semejantes. Utiliza el criterio de semejanza *lla* para triángulos no acutángulos.

**Problema 1.45** Demuestra que los triángulos  $\triangle RBT$  e  $\triangle IBS$  son semejantes. Para hacer esto utiliza que  $BM \cdot BK = BT \cdot BI$ .

**Problema 1.46** Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  los vértices del triángulo. Si el ángulo  $\angle ACB \neq 90^\circ$  entonces considera el punto  $A'$  tal que  $\angle A'CB = 90^\circ$ . Luego demuestra que  $A' = A$ .

**Problema 1.48** Traza la altura desde  $A$  sobre el lado  $BC$  y aprovecha todos los triángulos rectángulos que se forman.

**Problema 1.49** Observa que el punto de tangencia de las circunferencias y los dos centros, son colineales.

**Problema 1.50** Sin pérdida de generalidad se puede suponer que la longitud de  $AB$  es 2. Después calcula las longitudes de los segmentos  $BT$  y  $TA$ . Verifica que los segmentos  $BT$ ,  $TA$  y  $AB$  cumplen el Teorema de Pitágoras.

**Problema 1.52** Por  $C$  traza la línea paralela a  $AB$  y sea  $T$  el punto donde ésta corta a la circunferencia. Después observa que el triángulo  $\triangle TBD$  es rectángulo y que  $TB = AC$ .

**Problema 1.53** Sea  $T$  un punto sobre la línea  $CD$  de manera que  $AT \parallel BD$ . Observa que  $ABDT$  es un paralelogramo.

**Problema 1.54** Utiliza el Lema 1.5.1.

**Problema 1.57** Sean  $X$  y  $Y$  los puntos donde los rayos  $PA$  y  $PB$  intersectan la línea  $DC$ , y sea  $T$  sobre  $DC$  tal que  $BT \parallel PX$ . Observa que  $BC^2 = TC \cdot CY = XD \cdot CY$ . Después utiliza la semejanza de  $\triangle PAB$  con  $\triangle PXY$ .

**Problema 1.58** Utiliza el Teorema de Carnot.

**Problema 1.59** Utiliza el Teorema de Carnot.

**Problema 1.60** Sea  $I$  el incentro del triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $IN^2 - IM^2 = KN^2 - KM^2$ .

**Problema 1.61** Sean  $O$  y  $r$  el centro y radio de la circunferencia dada. Observa que  $MO^2 - MA^2 = r^2$ .

**Problema 1.63** Prueba que los triángulos  $\triangle RQP$  y  $\triangle SQP$  son semejantes.

**Problema 1.64** Observa la igualdad de los ángulos  $\angle AQR = \angle RPQ$ .

**Problema 1.65** Observa que  $\triangle MCB \sim \triangle DAB$ .

**Problema 1.66** Utiliza las igualdades de ángulos en los cuadriláteros cíclicos  $ABCE$  y  $BADF$ .

**Problema 1.67** Sea  $T$  el punto donde se intersectan las circunferencias circunscritas de los triángulos  $\triangle APN$  y  $\triangle BMP$ . Demuestra que los puntos  $C$ ,  $N$ ,  $M$  y  $T$ , son concíclicos.

**Problema 1.68** Recuerda que la línea que une los centros de dos circunferencias que se cortan en dos puntos, es ortogonal a la cuerda común de éstas.

**Problema 1.69** Utiliza el Teorema de Miquel dos veces, para dos ternas de triángulos.

**Problema 1.70** Sea  $X$  el punto de Miquel del triángulo  $\triangle ABC$  con respecto a los puntos  $M$ ,  $N$  y  $P$ . Demuestra que los puntos  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$ ,  $T'$  y  $X$  son concíclicos. Conviene demostrar esto para dos cuartetos de puntos, en cada una de las cuales esté incluido el punto  $X$ .

**Problema 1.72** Traslada el triángulo  $\triangle APD$  de manera que el vértice  $A$  se vaya al vértice  $B$  y el vértice  $D$  se vaya al vértice  $C$ . Tenemos que el punto  $P$  se traslada en el punto  $P'$ . Aprovecha que el cuadrilátero  $BPCP'$  es cíclico.

**Problema 1.73** Sea  $ABCD$  el cuadrilátero dado y sea  $T$  el punto donde se intersectan sus diagonales. Consideremos el par de cuadrados opuestos  $ADMN$

y  $BXYC$ , y sean  $O_1$  y  $O_2$  sus centros. Observa que los cuadriláteros  $ATDO_1$  y  $BO_2CT$  son cíclicos.

**Problema 1.74** Observa que el cuadrilátero  $MKDC$  es cíclico, de lo cual se sigue que  $\angle KDM = \angle KCM$ .

**Problema 1.76** Observa que el cuadrilátero  $PBQR$  es cíclico y que  $\angle QPR = 45^\circ$ .

**Problema 1.77** Sea  $P$  el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero  $ABCD$  y sea  $M$  el punto donde la perpendicular a  $AD$  desde  $P$  intersecta al lado  $BC$ . Prueba que  $\angle MPB = \angle MBP$ . Después, utiliza el hecho que dice: el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices.

**Problema 1.78** Sea  $ABCD$  el cuadrilátero, sean  $M$  y  $N$  los puntos medios de  $AB$  y  $DC$ , respectivamente, y sea  $T$  el punto de intersección de las diagonales. Usando el resultado del Problema 1.75, demuestra que  $MTNO$  es un paralelogramo.

**Problema 1.80** Sea  $O$  el centro de la circunferencia. Observa que los puntos  $P, A, C, O$  y  $B$  son concíclicos. Demuestra que  $\angle BCO = \angle OBA$ .

**Problema 1.81** Sea  $M$  la intersección de  $OC$  y  $AE$ , y sea  $N$  la intersección de  $DE$  y  $BC$ . Demuestra que  $CMNE$  es un cuadrilátero cíclico, de donde se obtiene que  $MN \parallel AB$ .

**Problema 1.82** Sea  $M$  la intersección de  $BE$  y  $CD$ , y sea  $O$  el centro de la circunferencia. Demuestra que  $PAMB$  es un cuadrilátero cíclico y con esto se obtiene que  $P, A, M, O$  y  $B$  son concíclicos.

**Problema 1.83** La demostración es idéntica a la demostración del Teorema de la Línea de Simson. Puedes ver esta demostración en el Capítulo 4.

**Problema 1.84** Demuestra que  $\triangle IDJ$  es semejante al triángulo  $\triangle BAC$ . Con esto, después demuestra que  $AMJD$  es un cuadrilátero cíclico.

**Problema 1.85** Este problema está resuelto en el Ejemplo 4.2.1.

**Problema 1.86** Recuerda que  $ACMD$  es un cuadrilátero cíclico, de aquí se obtiene que  $\angle ABD = \angle ACM$ . Luego demuestra que  $AKBN$  es un cuadrilátero cíclico.

**Problema 1.87** Observa que  $PJCQ$  es cíclico ya que  $\angle PQJ = \angle PCJ = \angle ABP$ . Entonces  $PJ \parallel AC$  si y sólo si  $PJCQ$  es un trapecio isósceles.

**Problema 1.88** Aplica el Teorema de Ptolomeo al cuadrilátero  $TCBA$ .

**Problema 1.89** Utiliza que  $LB = LC = LI$  y el Teorema de Ptolomeo.

**Problema 1.91** Demuestra y utiliza la semejanza de los triángulos  $\triangle PQR$  y  $\triangle ADC$ .

**Problema 1.93** Aplica el Teorema de Ptolomeo en el cuadrilátero  $ACDE$ .

**Problema 1.94** Observa que  $\frac{x}{y} = \frac{AD}{AC}$  y  $\frac{x}{z} = \frac{AB}{AC}$ , después utiliza el Teorema de Ptolomeo.

**Problema 1.95** Utiliza el resultado del Ejemplo 1.7.2 y el comentario que se menciona después de su demostración.

**Problema 1.96** Consideremos dos circunferencias  $\Gamma_A$  y  $\Gamma_B$  de centros  $O_A$  y  $O_B$  y radios  $r_a$  y  $r_b$ , tangentes interiormente a una circunferencia dada  $\Gamma$ , de radio  $r$ , en los puntos  $A$  y  $B$ , respectivamente. Una línea tangente exterior común a  $\Gamma_A$  y  $\Gamma_B$  hace contacto con éstas en los puntos  $S$  y  $T$ , respectivamente. Los rayos  $\overrightarrow{AS}$  y  $\overrightarrow{BT}$  se intersectan sobre un punto  $M$  en  $\Gamma$  (ver Ejemplo 4.3.3 (a) o el Problema 4.29), de manera que la línea tangente a  $\Gamma$  por  $M$  es paralela a  $ST$ . Observa que los triángulos  $\triangle MST$  y  $\triangle MBA$  son semejantes, de ahí se obtiene que

$$\left(\frac{BA}{ST}\right)^2 = \frac{MB \cdot MA}{MS \cdot MT} = \frac{OA}{OO_A} \cdot \frac{OB}{OO_B},$$

es decir,

$$AB = \frac{r}{\sqrt{(r - r_A)(r - r_B)}} \cdot ST.$$

De aquí la demostración de la primera parte del Teorema de Casey se obtiene fácilmente aplicando el Teorema de Ptolomeo al cuadrilátero  $ABCD$ , donde  $A, B, C$  y  $D$  son los puntos de contacto de las circunferencias  $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$  y  $\mathcal{C}_4$  con  $\Gamma$ .

**Problema 1.98** Sean  $A, B, C, D$  los vértices del cuadrado nombrados en el sentido de las manecillas del reloj y sea  $M$  el punto de tangencia mostrado en la figura del problema. Prolonga el segmento  $AD$  hasta que intersecte de nuevo a la circunferencia en el punto  $T$ . Usa la potencia de  $A$  con respecto a la circunferencia y el Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo  $\triangle DTC$ .

**Problema 1.99** Traza la circunferencia con centro en  $A$  y radio  $AB$ . Utiliza la potencia desde  $C$ .

**Problema 1.103** Sean  $C_1$  y  $C_2$  las circunferencias circunscritas a los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle BDC$ . Calcula la potencia de  $A$  con respecto a  $C_2$  y la potencia de  $C$  con respecto a  $C_1$ . Utiliza también el Teorema de la Bisectriz.

**Problema 1.104** Observa que la línea  $DD_1$  pasa por  $P$ , es decir,  $P$  es el centro radical de las tres circunferencias.

**Problema 1.105** Sea  $T$  el punto donde se intersectan la línea  $AC$  y la línea  $KN$ . Es fácil ver que  $T$  es el centro radical de las circunferencias circunscritas a los triángulos  $\triangle BKN$ ,  $\triangle ABC$ , y a la circunferencia circunscrita al cuadrilátero  $ACNK$ . Por el Teorema de Miquel tenemos que  $TMNC$  es un cuadrilátero cíclico. Utiliza la potencia desde  $B$  y  $T$  con respecto a algunas de las circunferencias.

**Problema 1.106** Primero demuestra que  $DE$  es tangente al círculo. Después, usa el mismo razonamiento que en el Ejemplo 1.8.1.

**Problema 1.108** Como el cuadrilátero  $DECF$  es cíclico, tenemos que  $HE \cdot HF = HG^2$ .

**Problema 1.109** Sea  $\Omega$  la circunferencia que pasa por  $P$  y es tangente a  $DC$  en  $M$ . Como  $M$  es punto medio de  $DC$ , calculando a potencia desde  $D$  y  $C$  con respecto a  $\Omega$ , tenemos que  $DQ \cdot DP = CR \cdot CP$ , de donde se obtiene que  $\frac{DQ}{CR} = \frac{CP}{DP}$ . Ahora calcula  $\frac{SB}{TA}$  usando que  $ST \parallel AB$ .

**Problema 1.111** Sean  $S$  y  $T$  los puntos de tangencia de la circunferencia con el arco  $\widehat{BD}$  y la cuerda  $CD$ , respectivamente. Demuestra que  $A, T$  y  $S$  son colineales. Usa que  $\angle ASD = \angle ADT$ .

**Problema 1.112** Sea  $X$  el punto donde la línea tangente al circuncírculo del

triángulo  $\triangle ABC$ , a través de  $A$ , corta a la línea  $BC$ . Como  $\angle XAN = \angle AMN = 90^\circ$ , tenemos que  $XM \cdot XN = XB \cdot XC$ .

**Problema 1.113** Se resuelve de manera similar al Ejemplo 1.8.3.

**Problema 1.114** Observa que  $d^2 - R^2$  es la potencia de  $P$  con respecto al circuncírculo del triángulo  $\triangle ABC$ . Prolonga  $BP$  hasta intersectar de nuevo al circuncírculo en un punto  $T$ . Nota que  $BP \cdot PT = R^2 - d^2$ . Usa Ley de Senos para relacionar el área  $\triangle DEF$  con los lados de  $\triangle PTC$ .

**Problema 1.115** Demuestra que el cuadrilátero  $BNMC$  es cíclico. Usa esto para probar que el cuadrilátero  $ANMD$  también es cíclico. Después, usa que los tres ejes radicales de tres circunferencias, tomadas por pares, concurren en un punto.

**Problema 1.116** Sea  $Z$  el segundo punto de intersección entre  $\omega_1$  y  $\omega_2$ . Observen que los puntos  $B$ ,  $C$ ,  $M$  y  $N$  están en una misma circunferencia a la cual llamaremos  $\omega_3$ . Noten que  $A$  es el centro radical de  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  y  $\omega_3$ . Con esto podrán demostrar que  $X$ ,  $H$ ,  $Z$ , y  $Y$  son colineales.

**Problema 1.118** Dibuja el paralelogramo  $PQRS$ . Observa que  $a + c$  es equivalente a la mitad del área del paralelogramo más la cuarta parte del área de  $ABCD$ .

**Problema 1.119** Su solución es análoga a la del Ejemplo 1.9.4.

**Problema 1.120** Sea  $I$  el incentro del triángulo. Divide al triángulo en los tres triángulos  $\triangle BIC$ ,  $\triangle AIB$  y  $\triangle AIC$ , cada uno de los cuales tiene altura  $r$ .

**Problema 1.121** Su demostración es similar a la del Teorema de Brahmagupta (Ejemplo 1.9.3).

**Problema 1.122** Divide al triángulo en tres triángulos mediante los segmentos que unen al punto dado con los vértices del triángulo equilátero.

**Problema 1.123** Observa que

$$\frac{|DBCG|}{|FBCE|} = \frac{BD + CG}{FB + CE},$$

después, considera los puntos  $X$  y  $Y$  sobre los rayos  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$  de manera que  $BX = CG$  y  $CY = FB$ . Demuestra que  $XY$  es paralelo a  $DE$ .

**Problema 1.124** Calcula el área del triángulo de varias maneras, utilizando la fórmula *base por altura sobre 2* y con la demostrada en el Problema 1.119.

**Problema 1.125** Sea  $P$  el punto donde  $LB$  intersecta a  $AC$  y sea  $Q$  el punto donde  $AN$  intersecta a  $BC$ . Usando semejanza de triángulos, demuestra que

$$\frac{CP}{AC} + \frac{CQ}{BC} = 1.$$

Después utiliza el Teorema de los Tapetes.

**Problema 1.127** La línea  $BM$  intersecta a  $HG$  en un punto  $X$  y la línea  $AL$  intersecta a  $HE$  en un punto  $Y$ . Se cumple que  $|HCBX| = |BCFG|$ ,  $|HCAY| = |ACDE|$  y  $|XBAY| = |ABML|$ . De aquí el problema se deduce fácilmente.

**Problema 1.129** Aplica el Teorema de los Tapetes.

**Problema 1.130** Demuestra que  $|ADE| + |ABF| = |AFCE|$ . Después usa el Teorema de los Tapetes.

**Problema 1.131** Sea  $ABCDEF = \mathcal{H}$ . Observa que existe un cuadrilátero de área máxima inscrito en  $\mathcal{H}$  cuyos vértices son vértices de  $\mathcal{H}$ , supongamos que éste es  $BCEF$ . Considera un punto  $T$  en el interior del paralelogramo de manera que  $AT$  es paralela a  $BC$  y de la misma longitud que  $BC$ . Usa las áreas de los paralelogramos obtenidos.

**Problema 1.132** Sea  $T$  el punto donde se cortan las tangentes exteriores comunes de  $C_1$  y  $C_2$ , y sea  $J$  el punto donde la línea  $TB$  corta de nuevo a  $C_1$ . Demuestra que  $DJ$  es paralela a  $BE$  y que el triángulo  $\triangle TEB$  es semejante al triángulo  $\triangle TBD$ . Calcula la razón entre las áreas de estos últimos dos triángulos.

**Problema 1.133** Sea  $O$  el centro de  $\Gamma$ . Demuestra que los triángulos  $\triangle ARO$  y  $\triangle AOQ$  son semejantes. Además utiliza que  $\triangle APQ$  y  $\triangle ARS$  son semejantes.

**Sugerencias para los problemas del Capítulo 2.**

**Problema 2.1** Sean  $A, B, C$ , los vértices del triángulo y sea  $M$  el punto medio de  $BC$ . Para cualquier punto  $X$  en la recta  $AM$ , observa que los triángulos  $\triangle XBM$  y  $\triangle XCM$  tienen la misma altura desde  $X$  y las bases  $BM$  y  $CM$  son de la misma longitud, por lo que poseen áreas iguales. Aplica esta propiedad para demostrar que si  $G$  es el gravicentro, entonces los triángulos  $\triangle AGB$  y  $\triangle AGC$  tienen la misma área. Juega con las áreas de los seis triángulos en cuestión para obtener el resultado deseado.

**Problema 2.2** Considera la siguiente figura, donde  $\triangle ABC$  es un triángulo,  $M, N, P$  los puntos medios de sus lados,  $G$  es el gravicentro y  $R$  es el punto tal que el cuadrilátero  $MBNR$  es un paralelogramo. Prueba que también los cuadriláteros  $NRCM$  y  $ARCP$  son paralelogramos. Concluye que el triángulo  $\triangle AMR$  es un triángulo cuyos lados tienen la misma longitud que las medianas del triángulo. Finalmente, demuestre que el área de  $\triangle AMR$  es igual a  $3/4$  del área de  $\triangle ABC$ .

**Problema 2.3** Sea  $M$  el punto medio de  $BC$ , y sea  $D$  el punto tal que  $M$  es punto medio de  $AD$ . Demuestra que el cuadrilátero  $ABDC$  es un paralelogramo. Aplica la Ley del Paralelogramo (ver Teorema 1.5.2) y utiliza las igualdades  $AB = CD$ ,  $AC = BD$ ,  $AM = AD/2$  para concluir el resultado.

**Problema 2.4** Es inmediato utilizando el resultado del Problema 2.3. Otra manera, también bastante rápida de resolverlo, es la siguiente: Suponga que las medianas desde  $B$  y  $C$  son iguales, y sean  $G$  el gravicentro y  $M$  el punto medio de  $BC$ . Como el gravicentro divide a las medianas en razón  $2 : 1$ , y  $m_B = m_C$ , se sigue que  $BG = CG$ . Concluye que la mediana  $AM$  es mediatriz de  $BC$ .

**Problema 2.5** Sea  $M$  el punto medio de  $AB$ , y sea  $W$  el pie de la perpendicular de  $M$  sobre  $XY$ . Observa que  $MW$  es la recta media del trapecio  $ABYX$ , por lo que su longitud es el promedio de  $AX$  y  $BY$ . Utiliza la semejanza de los triángulos  $\triangle CGZ$  y  $\triangle MGW$  para concluir.

**Problema 2.6** Sean  $ABCD$  el cuadrilátero,  $M$  el punto medio de  $CD$ ,  $G$  y  $H$  los gravicentros de  $\triangle ACD$  y  $\triangle BCD$ , respectivamente. Sea también  $P$  la intersección de las medianas  $AH$  y  $BG$ . Prueba que  $GH$  y  $AB$  son paralelas.

**Problema 2.7** Aplica la desigualdad del triángulo para demostrar que  $AB + BD > AD$ . Repite el uso de la desigualdad del triángulo para probar que  $3/2s > m$ . Para probar la otra desigualdad, considera el gravicentro  $G$  del triángulo



$\triangle ABC$ . Por la desigualdad del triángulo,  $AG + GB > AB$ . Repite el uso de la desigualdad del triángulo y utiliza el hecho de que el gravicentro divide a cada mediana en razón 2 : 1 para concluir.

**Problema 2.8** Utiliza el resultado del Problema 2.3 y concluye con el Teorema de Pitágoras.

**Problema 2.9** Sean  $M$  el punto medio de  $C_1C_2$  y sea  $C'$  tal que  $M$  es punto medio de  $C'C$ . Prueba que el triángulo  $\triangle CC'C_1$  es congruente al triángulo  $\triangle ABC$ . Muestra que los lados correspondientes de dichos triángulos son perpendiculares entre sí.

**Problema 2.10** Considera el triángulo equilátero  $\triangle A_2BC$ , con  $A_2$  distinto de  $A_1$ . Muestra que  $AC_1A_2B_1$  es un paralelogramo y que el punto medio  $M$  de  $BC$  también es punto medio de  $A_1A_2$ . Demuestra además, que si  $P$  es el punto medio de  $A_1C_1$ , entonces  $MP = 1/2AC$ . Repite lo anterior para demostrar que si  $O$  es el punto medio de  $AB$ , entonces  $PO = 1/2AC$ , y por lo tanto,  $\triangle MPO$  es equilátero. Concluye que  $BB_1$  y  $NP$  son paralelas y que  $BB_1 = 2NP$ .

**Problema 2.11** Sea  $D$  el punto medio de  $BC$ . Utiliza el resultado del Problema 2.3 para obtener que  $MD^2 = (2MB^2 + 2MC^2 - BC^2)/4$ . Después, utiliza el Teorema de Stewart (ver Problema 1.44) para probar que  $MG^2 = MA^2/3 + 2MD^2/3 - 2AD^2/9$ . Vuelve a utilizar el resultado del Problema 2.3 para expresar  $AD^2$  por medio de los lados del triángulo  $\triangle ABC$ . Repite lo anterior para los puntos medios los lados  $CA$  y  $AB$ .

**Problema 2.12** Considera el punto medio de  $BC$  y prueba que pertenece al eje radical de las dos circunferencias iniciales. Concluye que el cuadrilátero  $MNAB$  es cíclico. Si  $P$  y  $Q$  son las intersecciones de la recta  $MN$  con los circuncírculos de  $\triangle BEN$  y  $\triangle AEM$ , respectivamente, prueba que  $PB$  es paralela a  $AC$  y que  $QA$  es paralela a  $BC$ . Finalmente, usa que  $MC$  es paralela a  $PB$  para probar que los circuncírculos de  $\triangle MNC$  y  $\triangle PNB$  son tangentes.

**Problema 2.13** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo rectángulo con hipotenusa  $BC$ . Sea  $D$  el pie de la altura desde  $A$  y  $M$  el punto medio de  $BC$ . ¿Cuál es la relación entre los ángulos  $\angle BAD$ ,  $\angle CAM$  y  $\angle ACB$ ?

**Problema 2.14** Sean  $\angle CBA = \beta$  y  $\angle BCA = \theta$ . Expresa los ángulos  $\angle IBC$ ,  $\angle ICB$  en función de  $\beta$  y  $\theta$ , y compruebe que su suma, más  $90^\circ + \alpha/2$ , es igual

a  $180^\circ$ .

**Problema 2.15** Sean  $P, Q, R, S$  los puntos donde la circunferencia es tangente a  $AB, BC, CD, DA$ , respectivamente. Nota que  $\angle AOB = \angle AOP + \angle POB$  y exprésalo en términos de los ángulos  $\angle A$  y  $\angle B$  del cuadrilátero  $ABCD$ .

**Problema 2.16** Sea  $M$  el punto medio de  $BC$  y sea  $I$  la intersección del segmento  $AM$  con la circunferencia. Utiliza el Teorema del ángulo semi-inscrito para probar que  $\angle IBC = \angle ICA$  y que  $\angle ICB = \angle IBA$ . Concluye con el hecho de que  $AM$  es mediatriz de  $BC$  y que  $I$  pertenece a  $AM$ .

**Problema 2.17** Utiliza el hecho de que  $D, M$  y  $L$  pertenecen a una recta paralela a  $BC$  para demostrar que los triángulos  $\triangle MBD$  y  $\triangle LCD$  son isósceles.

**Problema 2.18** Utilizando repetidamente que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a  $180^\circ$ , demuestra que el problema es equivalente a demostrar que  $\angle EBC + \angle ECB + \angle DBC + \angle DCB = 2\angle FBC + 2\angle FCB$ . Para probar esta última igualdad, verifica por separado que  $\angle EBC + \angle DBC = 2\angle FBC$  y que  $\angle ECB + \angle DCB = 2\angle FCB$ .

**Problema 2.19** Sean  $X, Y$  y  $Z$  los puntos de tangencia del incírculo en los lados  $CA, CB$  y  $AB$ , respectivamente. Sea  $I$  el incentro. Muestra que  $AXIY$  es un cuadrado, en el cual dos de sus lados son iguales a  $r$ , y los otros dos lados son iguales a  $(a + b - c)/2$ .

**Problema 2.20** Demuestra el siguiente resultado:  $P$  es el punto de tangencia del incírculo de  $\triangle XYZ$  en el lado  $YZ$  si y sólo si  $YP - PZ = YX - XZ$ . Posteriormente, aplica dicho resultado repetidamente en los triángulos  $\triangle ABD, \triangle ACD$  y  $\triangle ABC$ .

**Problema 2.21** Demuestra el siguiente resultado:  $P$  es el punto de tangencia del incírculo de  $\triangle XYZ$  con el lado  $YZ$  si y sólo si  $YP - PZ = YX - XZ$ . Posteriormente, aplique dicho resultado repetidamente en los triángulos  $\triangle BAM$  y  $\triangle BCM$ .

**Problema 2.22** Este resultado se conoce como . Tiene muchas posibles demostraciones. Con algo de esfuerzo encontrarás tu propia demostración.

**Problema 2.23** Calcula el área de  $\triangle ABC$  de dos maneras distintas:

$$|ABC| = \frac{a \cdot b \cdot \operatorname{sen}(2\alpha)}{2}$$

y como

$$|CBD| + |CDA| = \frac{a \cdot l \cdot \operatorname{sen} \alpha}{2} + \frac{b \cdot l \cdot \operatorname{sen} \alpha}{2}.$$

**Problema 2.24** Utiliza el hecho de que  $ABLC$  es un cuadrilátero cíclico para probar que los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle ALC$  son semejantes.

**Problema 2.25** Utiliza el resultado del Ejemplo 2.2.2 y que el gravicentro divide a las medianas en razón 2 : 1.

**Problema 2.26** Demuestra que existe un punto  $F$  sobre  $BC$  tal que  $BD = BF$  y  $AE = AF$ . Demuestra después que los triángulos  $\triangle BDI$  y  $\triangle BFI$  son congruentes, al igual que  $\triangle AEI$  y  $\triangle AFI$ . Concluye que los ángulos  $\angle DIB$ ,  $\angle FIB$  y  $\angle FIA$  son iguales a  $60^\circ$ . Usa esto para concluir que  $\angle BCA = 60^\circ$ .

**Problema 2.27** Por el resultado del Problema 2.14 tenemos que  $\angle BIC = 120^\circ$ , de aquí se sigue que el cuadrilátero  $AC'IB'$  es cíclico. Después usa que a ángulos inscritos iguales les corresponden cuerdas iguales.

**Problema 2.28** Sea  $P$  la proyección a alguna de las bisectrices del ángulo  $\angle B$ . Sea  $X$  la intersección de  $AP$  con  $BC$ . Demuestra que  $\triangle ABX$  es isósceles y que  $P$  es punto medio de  $AX$ .

**Problema 2.29** Este problema está demostrado en el Ejemplo 4.2.1.

**Problema 2.30** Sean  $I$  el incentro y  $O$  el circuncentro de  $\triangle ABC$ . Considera los excírculos relativos a los vértices  $A$  y  $C$  del triángulo  $\triangle ABC$ , y sean  $P$  y  $Q$  los puntos de tangencia en los lados  $BC$  y  $AB$ , respectivamente. Sea  $R$  la reflexión de  $I$  respecto de  $O$ . Prueba que  $RP$  es perpendicular a  $BC$  y  $RQ$  es perpendicular a  $AB$ . Después prueba que  $MNQP$  es un trapecio isósceles. Concluye que los cuadriláteros  $BPRQ$  y  $MNQP$  son cíclicos y que  $BR$  es perpendicular a  $MN$ . Prueba también que  $KI$  es paralela a  $BR$ .

**Problema 2.31** Por construcción,  $EF$  es mediatriz de  $AO$ . Por ello, y por ser  $O$  el centro de  $\Gamma$ , prueba que  $A$  es el punto medio del arco  $EF$ . Siguiendo el

Ejemplo 2.2.4, basta probar que  $AJ = AF$ . Pruebe que  $AF = AO$ , y que los triángulos  $\triangle AOD$  y  $\triangle OAJ$  son congruentes.

### Problema 2.32

- (a) Sean  $M$ ,  $N$  y  $P$  los puntos donde los segmentos  $FE$ ,  $FD$  y  $DE$  cortan a los segmentos  $AI$ ,  $BI$  y  $CI$ , respectivamente, donde  $I$  es el incentro de  $\triangle ABC$ . Observa que  $\triangle MNP$  es semejante a  $\triangle ABC$  y sus lados están en la razón  $\frac{1}{2}$ . Ahora usa el resultado del Problema 1.113.
- (b) Observa que  $\triangle MNP$  es el triángulo órtico del triángulo  $\triangle DEF$  y entonces por el Teorema de Fagnano sabemos que es el triángulo inscrito en  $\triangle DEF$  con el menor perímetro el cual es menor que la mitad del perímetro de  $\triangle DEF$ .
- (c) Usa el Teorema de Ptolomeo en el cuadrilátero  $ABDC$  para probar que  $AB + AC \leq 2 \cdot AD$ . De manera análoga demuestra que  $BC + BA \leq 2 \cdot BE$  y que  $CB + CA \leq 2 \cdot CF$ .

**Problema 2.33** Usa el Teorema generalizado de la bisectriz varias veces.

**Problema 2.34** Sea  $\triangle ABC$  un triángulo de ortocentro  $H$ , sea  $L$  el pie de la altura sobre  $BC$  y sea  $D$  la reflexión de  $H$  con respecto a  $BC$ . Demuestra que  $\angle LHC = \angle ABC$ . Después, demuestra que los triángulos  $\triangle LDC$  y  $\triangle LHC$  son congruentes.

**Problema 2.35** Sea  $P$  la reflexión de  $H$  con respecto a  $BC$ . Por el Problema 2.35,  $P$  pertenece al circuncírculo de  $\triangle ABC$ . Calcula de dos formas diferentes la potencia de  $D$  con respecto al circuncírculo de  $\triangle ABC$ .

**Problema 2.36** Sea  $\triangle ABC$  el triángulo,  $H$  su ortocentro y  $E$ ,  $F$  los pies de las alturas desde  $B$ ,  $C$ , respectivamente. Calcula de dos maneras diferentes la potencia de  $H$  con respecto a la circunferencia de diámetro  $BC$ . Repite lo anterior con la circunferencia de diámetro  $AC$ .

**Problema 2.37** Prueba que  $\angle BAC + \angle BHC = 180^\circ$ . Utiliza la Ley de Senos y concluye que los circuncírculos de  $\triangle BAC$  y  $\triangle BHC$  tienen el mismo radio. Repite lo anterior para los circuncírculos restantes.

**Problema 2.38** Sean  $D, E, F$  los pies de las alturas desde  $A, B, C$  y sea  $H$  el ortocentro del triángulo  $\triangle ABC$ . Demuestra que los cuadriláteros  $HDBF$  y  $HDCE$  son cíclicos, y que  $\angle HBA = \angle HCA = 90^\circ - \angle BAC$ .

**Problema 2.39** Observa que los triángulos  $\triangle ABK, \triangle ABH$  y  $\triangle ABC$  tienen la base  $AB$  en común. A partir de ello, muestra que la igualdad a demostrar es equivalente a  $KF^2 = CF \cdot HF$ , donde  $F$  es el pie de la altura desde  $A$ . Utiliza el resultado del Problema 2.36 y la semejanza entre los triángulos  $\triangle KAF$  y  $\triangle BKF$ .

**Problema 2.40** Utiliza los cuadriláteros cíclicos  $BFEC, AFDC, ABDE$  y las igualdades entre los ángulos de los triángulos  $\triangle IAB, \triangle IBC, \triangle ICA$  para expresar los ángulos internos de los triángulos  $\triangle IDE, \triangle IEF, \triangle IFE$ .

**Problema 2.41** Sea  $M$  el punto medio de  $BC$ . Prueba que  $\angle MXH = 90^\circ$ , al igual que  $\angle MYH$  y  $\angle MDH$ . Concluye que  $M, H, X, Y, D$  pertenecen a una misma circunferencia. Prueba que  $\angle DYX = \angle HDX = \angle DBA$ .

**Problema 2.42** Sin pérdida de generalidad, supongamos que el triángulo  $\triangle ABC$  es acutángulo. En este caso, el ortocentro  $H$  es un punto interior del triángulo, por lo que la recta  $\ell$  debe intersectar a dos lados del triángulo y al tercero en su prolongación. Supongamos que  $\ell$  intersecta a  $BC$  en el punto  $P$  que está en su prolongación, mientras que intersecta a los segmentos  $AB$  y  $AC$  en  $Q$  y  $R$ , respectivamente. Por el Problema 2.34, si  $D, E, F$ , son las reflexiones de  $H$  respecto de  $BC, CA, AB$ , entonces,  $D, E, F$  están sobre el circuncírculo de  $\triangle ABC$ . Sea  $X$  la intersección de  $PD$  con el circuncírculo. Prueba que  $X$  es el punto de concurrencia, mostrando que  $F, Q, X$  y  $E, R, X$  son colineales. Para ello, juega con los ángulos internos del triángulo  $\triangle XBC$ .

**Problema 2.43** Observa que los cuadriláteros  $DFMA$  y  $ANEB$  son cíclicos. Prueba que  $P$  es el ortocentro del triángulo  $\triangle AEF$ .

**Problema 2.44** Sin pérdida de generalidad, suponga que  $P$  está en el arco menor  $CD$ . Observa que  $\angle CPA = 90^\circ$ . Prueba que el ángulo formado por las rectas  $CP$  y  $AP$  es el mismo que el formado por las rectas  $YZ$  y  $WX$ .

**Problema 2.45** Sean  $X$  y  $Y$  las proyecciones de  $N$  y  $M$  sobre  $BC$  y sean  $T = BM \cap NX, S = NC \cap MY$ . Observa que los triángulos  $\triangle NTP$  y  $\triangle SMP$  son semejantes y prueba que  $\triangle NXD$  y  $\triangle MYD$  son semejantes.

**Problema 2.46** Demuestra que  $P$  es el circuncentro del triángulo  $\triangle ABC$ .

**Problema 2.47** Sea  $O$  el circuncentro de  $\triangle ABC$ . Por  $O$  traza tres rectas, cada una paralela a cada lado del triángulo, y considera los puntos de intersección de dichas rectas con los lados del triángulo. Observe que los puntos  $K$  y  $M$  son parte de esos puntos.

**Problema 2.48** Utiliza el Ejemplo 1.9.1, la Ley de Senos, y concluye con el resultado del Problema 1.117.

**Problema 2.49** Utiliza el resultado del Ejemplo 2.4.1.

**Problema 2.50** Sean  $D$  y  $E$  los pies de las alturas desde  $A$  y  $C$ . Muestra que  $B, H, M, N, D, E$  están sobre una misma circunferencia, y que además,  $M$  y  $N$  son los puntos medios de los arcos  $DE$  de dicha circunferencia. Concluye con el hecho de que  $ACDE$  es cíclico y la mediatriz de  $DE$  pasa por su circuncentro.

**Problema 2.51** Sea  $D$  la intersección de  $AH$  con  $BC$ , y sea  $P$  el punto en el circuncírculo de  $\triangle ABC$  diametralmente opuesto a  $A$ . Muestra que  $\triangle BDA$  y  $\triangle PCA$  son semejantes.

**Problema 2.52** Utiliza el resultado del Problema 2.52 para probar que, en general, los triángulos  $\triangle AFP$  y  $\triangle AEH$  son semejantes. Concluye con el hecho de que  $\triangle AEF$  y  $\triangle ABC$  son semejantes.

**Problema 2.53** Sea  $P$  la intersección del circundiámetro a través de  $A$  con la mediatriz del segmento  $AU$ . Para probar que  $PU$  es perpendicular a  $BC$ , utiliza el resultado del Problema 2.52.

**Problema 2.54** Muestra que  $A$  y  $B$  pertenecen a la circunferencia de diámetro  $HC_1$ . Sea  $O_1$  el circuncentro del triángulo  $\triangle ABC_1$ . Prueba que  $O_1$  es el punto medio de  $HC_1$  y que  $M$  es el punto medio de  $OO_1$ .

**Problema 2.55** Observa que los cuadriláteros  $AHED'$  y  $AHDE'$  son paralelogramos. Concluye con el resultado del Problema 2.49.

**Problema 2.56** Nota que la bisectriz del ángulo  $\angle MON$  es la mediatriz de  $MN$ . Concluye que  $R$  pertenece al circuncírculo del triángulo  $\triangle AMN$  y es el punto medio del arco  $\widehat{MN}$ . Sea  $D$  la intersección de la bisectriz de  $\angle BAC$  con

el lado  $BC$ . Prueba que  $BMRD$  y  $CDRN$  son cuadriláteros cíclicos.

**Problema 2.57** Prueba que en cada vértice del triángulo  $\triangle ABC$  la bisectriz interior es perpendicular a la bisectriz exterior.

**Problema 2.58** Procede como en la solución del Ejemplo 2.5.1.

**Problema 2.59** Multiplica toda la ecuación por el área del triángulo  $\triangle ABC$  y utiliza el resultado del Problema 1.118 y el del Problema 2.58.

**Problema 2.60** La solución es análoga a la del problema anterior.

**Problema 2.61** Sea  $I$  el incentro de  $\triangle ABC$ . Demuestra que  $\triangle AIB$  es semejante a  $\triangle QCP$ .

**Problema 2.62** Sea  $2\alpha = \angle BAC$ . Calcula el valor de  $\tan \alpha$  considerando un par de triángulos que tienen como catetos opuestos a  $r$  y a  $r_A$ , respectivamente. Después prueba que  $(s - b)(s - c) = rr_A$ .

**Problema 2.63** Sean  $D, E, F$  los puntos donde el excírculo asociado al vértice  $A$  toca a los lados  $BC, AB, AC$ , respectivamente. Denotemos con  $r_A$  el exradio correspondiente. Demuestra que  $\frac{S}{S_A} = \frac{IC}{IAC} \cdot \frac{IB}{IAB}$ , donde  $I$  e  $I_A$  son el incentro y excentro de  $\triangle ABC$ . Después demuestra que  $\frac{S}{S_A} = \frac{r}{r_A}$ . Encuentra las relaciones análogas para los otros triángulos y usa el resultado del Problema 2.59.

**Problema 2.64** Utiliza el resultado del Problema 2.62.

**Problema 2.65** Utiliza el resultado del problema anterior para probar el caso  $n = 2$ . Después usa inducción para probar el caso general.

**Problema 2.66** Nota que  $F$  es excentro del triángulo  $\triangle DAC$ . El resto del problema se resuelve calculando ángulos en función de los ángulos del triángulo  $\triangle DAC$ .

**Problema 2.67** Para el inciso (b) observa que por el inciso (a) ya se tiene que  $BD$  es altura, entonces sólo falta ver que  $\angle ODO' = 180^\circ - \angle OBO'$ . Para el inciso (c) nota que la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ODO'$  es la reflexión de la circunferencia circunscrita del triángulo  $\triangle OBO'$  con respecto a la línea  $OO'$ . Usa la potencia desde  $F$ .

**Problema 2.68** Sea  $I$  el incentro de  $\triangle ABC$ . Observa que  $A_1$ ,  $B_1$  y  $C_1$  son los puntos medios de los segmentos  $II_A$ ,  $II_B$  e  $II_C$ , respectivamente. Además, se cumple que  $|AC_1BA_1CB_1| = 2|A_1B_1C_1|$ . Utiliza el inciso (a) del Problema 2.32.

### Sugerencias para los problemas del Capítulo 3.

**Problema 3.2** Aplica tres veces el Teorema de la bisectriz.

**Problema 3.3** Sea  $D'$  el punto donde el incírculo de  $\triangle ABC$  toca al lado  $BC$ . Recuerda que  $BD' = DC$ . Ahora usa el resultado del problema anterior.

**Problema 3.4** Aplica la versión trigonométrica del Teorema de Ceva y usa la Ley de Senos como se menciona en el Problema 1.12.

**Problema 3.6** Aplica la versión trigonométrica del Teorema de Ceva.

**Problema 3.7** Usa las potencias de los puntos  $A$ ,  $B$  y  $C$  con respecto a la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle DEF$ .

**Problema 3.8** Usa el Teorema de la bisectriz aplicado a las bisectrices externas.

**Problema 3.9** Sea  $T$  el punto donde se cortan las líneas  $BD$  y  $A'D'$  y sean  $P$  y  $Q$  los puntos donde las líneas  $DD'$  y  $AB'$  cortan a la línea  $A'B$ . Aplica el Teorema de Menelao en el triángulo  $\triangle A'TB$  con los puntos colineales  $D$ ,  $D'$  y  $P$ ; también aplica el Teorema de Menelao en el triángulo  $\triangle CBA'$  con los puntos  $B'$ ,  $A$  y  $Q$ .

**Problema 3.10** Sea  $T$  el punto donde se intersecan las líneas  $BQ$  y  $CN$ . Aplica el Teorema de Menelao dos veces en el triángulo  $\triangle TBC$ , con los puntos  $N$ ,  $P$ ,  $R$  y  $Q$ ,  $M$ ,  $S$ . Para simplificar, usa que la potencia desde  $B$  y  $C$  es igual.

**Problema 3.11** La solución de este problema es análoga a la del problema anterior.

**Problema 3.13** Usa de manera adecuada la Ley de Senos .

**Problema 3.14** Primero notemos que hay un lado del triángulo de manera que los puntos  $P$  y  $Q$  quedan en el mismo semiplano cuya frontera es la línea que contiene ese lado. Sin pérdida de generalidad, supongamos que esa línea es  $BC$ .



Sean  $D$  y  $F$  las proyecciones de  $P$  sobre  $AC$  y  $BC$ , respectivamente, y sean  $E$  y  $J$  las proyecciones de  $Q$  sobre  $AC$  y  $BC$ , respectivamente. Observa que la diferencia entre los ángulos  $\angle DFP$  y  $\angle EJQ$  es igual al ángulo entre las rectas de Simson.

**Problema 3.15** Sean  $Q$  y  $R$  las proyecciones de  $P$  sobre  $AC$  y  $BC$ . Utiliza las igualdades de ángulos en el cuadrilátero cíclico  $PQRC$ .

**Problema 3.17** Usa el resultado del Problema 2.49.

**Problema 3.18** Sea  $D$  el punto, en distinto lado que  $A$  con respecto a la línea  $BC$ , tal que  $\triangle BCD$  es equilátero. Observa que  $ABDC$  es un cuadrilátero cíclico. Sean  $G$  y  $O$  el gravicentro y circuncentro de  $\triangle ABC$ , observa que  $GO$  es paralela a  $AD$ .

**Problema 3.19** Usa el resultado del problema anterior.

**Problema 3.20** Sean  $H$  y  $O$  el ortocentro y circuncentro de  $\triangle ABC$  y sean  $J$  y  $E$  los puntos medios de  $HO$  y  $BC$ . Nota que  $JE$  es paralelo a  $AO$ .

**Problema 3.21** Recuerda que  $OD = 1/2AH$ , considera el punto  $P'$  donde se cortan  $HD$  y  $AO$ . Demuestra que  $P' = P$ .

**Problema 3.22** Observa que  $MP$  es paralela a  $BC$  y que  $MP = MQ$ . Utiliza las igualdades de ángulos en los cuadriláteros cíclicos  $BADP$  y/o  $BDQC$ . Con esto, demuestra que el cuadrilátero  $DNPMQ$  es cíclico.

**Problema 3.23** Nota que  $AD$  también es simediana del triángulo  $\triangle BDC$ , entonces se cumple que  $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ , lo que implica que  $\frac{AC}{CD} = \frac{AB}{BD}$ . De aquí puedes deducir fácilmente que  $BC$  es simediana del triángulo  $\triangle ADC$ .

**Problema 3.24** Sea  $T$  un punto sobre el rayo  $\overrightarrow{AB}$  tal que  $XB = XT$ . Demuestra que los triángulos  $\triangle AMC$  y  $\triangle AXT$  son semejantes.

**Problema 3.25** Observa que  $DN$  es simediana del triángulo  $\triangle ACD$  y que  $\angle ACD = \angle BAD$ .

**Problema 3.26** Sea  $T$  el punto donde la simediana de  $\triangle ABC$ , desde el vértice  $A$ , corta al circuncírculo. Por el problema anterior, se tiene que  $CB$  es simediana

del triángulo  $\triangle ATC$ . Sea  $N'$  el punto donde la línea  $CT$  corta a la línea  $AE$ . Como  $\angle N'AC = \angle ATC$ , tenemos que  $CB$  es mediana del triángulo  $\triangle AN'C$ , se sigue que  $N' = N$ . De manera análoga se demuestra que  $B$ ,  $T$  y  $M$  son colineales.

**Problema 3.27** Sean  $D$  y  $E$  los puntos donde las líneas  $NP$  y  $MP$  cortan a los lados  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. Observa que  $ADPE$  es un paralelogramo y prueba que  $\triangle ADE$  es semejante a  $\triangle ABC$  con  $\angle ADE = \angle ACB$ .

**Problema 3.28** Recuerda que  $BD$  es simediana del triángulo  $\triangle ACD$  si y sólo si  $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$ , es decir, si y sólo si las bisectrices de los ángulos  $\angle ABC$  y  $\angle ADC$  se cortan sobre  $AC$ . Observa que los triángulos  $\triangle ACD$  y  $\triangle PQD$  son semejantes, además recuerda que  $P$ ,  $R$  y  $Q$  son colineales.

**Problema 3.29** Observa que por la construcción de las tangentes,  $BC$  es simediana del triángulo  $\triangle AQC$ .

**Problema 3.30** Utiliza los cuadriláteros cíclicos  $ADKM$  y  $BCKM$  para probar que  $\angle AKC = 90^\circ$ . Demuestra que  $\angle DAK = \angle DKA = \angle ABK$ , de donde se obtiene que  $BD$  es simediana de  $\triangle ABK$ . Análogamente se demuestra que  $AC$  es simediana de  $\triangle ABK$ .

**Problema 3.31** Observa que  $MK$  es simediana del triángulo  $\triangle BMC$  y que  $\triangle ABC$  y  $\triangle MBC$  son simétricos con respecto a la mediatriz de  $BC$ .

**Problema 3.32** Observa que  $MN$  es simediana de  $\triangle MKL$  y que  $\angle MPQ = \angle AMK = \angle MLK$ .

**Problema 3.33** Sea  $B$  el otro punto de intersección de las circunferencias. Sea  $S$  el punto donde el rayo  $\overrightarrow{MB}$  interseca a la otra circunferencia. Usa que  $MN$  es simediana del triángulo  $\triangle BMA$  y por tanto es mediana del triángulo  $\triangle MSP$ . Después prueba que  $SQ$  es paralelo a  $MN$ .

**Problema 3.34** Observa que  $AM$  es simediana del triángulo  $\triangle AKL$  y que  $\angle AKL = \angle ACB$ .

**Problema 3.36** Sea  $T$  el punto donde se cortan las tangentes en  $B$  y  $C$ , y sea  $K$  el punto donde  $AT$  corta a  $BC$ . Usa las semejanzas de los triángulos  $\triangle ADK$  con  $\triangle TCK$  y  $\triangle AEK$  con  $\triangle TBK$ .

**Problema 3.37** Para el inciso (a) usa el resultado mostrado al inicio de la sección de simedias. La prueba del inciso (b) es igual a la prueba del Problema 2.25.

**Problema 3.38** Usa el Teorema 3.4.1 y el siguiente hecho (el cual es sugerencia del Problema 2.21):  $P$  es el punto de tangencia del incírculo de  $\triangle XYZ$  con el lado  $YZ$  si y sólo si  $YP - PZ = YX - XZ$ .

**Problema 3.39** Utiliza los ángulos de los cuadriláteros cíclicos que aparecen en el problema.

**Problema 3.40** Sean  $E$  y  $F$  los puntos de tangencia del incírculo con los lados  $AB$  y  $DC$ , respectivamente. Si  $T$  es el punto donde se cortan  $AC$  y  $BD$ , usa que  $E$ ,  $T$  y  $F$  son colineales. Considera el punto  $Q$  sobre la línea  $FE$  tal que  $AQ$  es paralelo a  $DC$ . Usa la semejanza de los triángulos  $\triangle ATQ$  y  $\triangle CTF$ .

**Problema 3.42** Usa el Teorema 3.4.1 y las igualdades de segmentos tangentes a las circunferencias.

**Problema 3.43** Observa que el área del cuadrilátero se calcula como  $s \cdot r$ , donde  $s$  es el semiperímetro del cuadrilátero y  $r$  el radio del círculo inscrito.

**Problema 3.44** Sea  $P$  el punto de intersección de las diagonales. Designemos con  $x = AP$ ,  $y = CP$ ,  $z = BP$ ,  $w = DP$ . Utiliza el resultado del Problema 3.39 para probar que

$$\frac{u}{v} = \frac{x+y}{z+w} = \frac{(a+c)dy}{(b+d)cw}.$$

Después usa el Teorema de Brianchon en el caso de cuadriláteros circunscritos.

**Problema 3.45** Usa el resultado del Ejemplo 3.4.2

**Problema 3.46** Usa el resultado del Problema 3.45 y el resultado del Problema 1.124.

**Problema 3.47** Usa el resultado del Problema 3.45 y el resultado del Problema 2.60.

**Problema 3.48** Sean  $\Gamma_P$  y  $\Gamma_Q$  los incírculos de los triángulos  $\triangle PAD$  y  $\triangle QCD$ , con centros  $O_P$  y  $O_Q$ . Si los círculos se ven desde  $H$  bajo el mismo ángulo, entonces  $HD$  es bisectriz del ángulo  $\angle O_P H O_Q$  lo que implica que el punto  $R$

donde se cortan las líneas  $O_QO_P$  y  $PQ$ , es el centro de homotecia exterior de  $\Gamma_P$  y  $\Gamma_Q$ . De aquí se puede probar que  $Q$  es el centro de homotecia exterior entre la circunferencia tangente a los segmentos  $AD$ ,  $AB$ ,  $DC$  y la circunferencia  $\Gamma_Q$ .

**Problema 3.49** Primero observa que se cumple que  $AB+AD = CB+CD$ . Sean  $M$  y  $N$  los puntos de contacto de  $\omega_1$  y  $\omega_2$  con  $AC$ . Demuestra que  $AM = NC$  (Ejemplo 2.5.2). Sea  $N'$  el punto diametralmente opuesto a  $N$  en la circunferencia  $\omega_2$  y sea  $T'$  el punto correspondiente en  $\omega$  mediante la homotecia con centro en  $D$  que manda  $\omega_2$  en  $\omega$ . Si  $T$  es el centro de homotecia exterior de  $\omega_1$  y  $\omega_2$ , demuestra que  $T = T'$ .

### Sugerencias para los problemas del Capítulo 4.

**Problema 4.1** Usa los mismo trazos que en el Ejemplo 4.1.1.

**Problema 4.2** Prolonga  $AE$  hasta cortar a  $BC$  en un punto  $T$ . Observa que los cuadriláteros  $EMTD$  y  $DMCF$  son cíclicos.

**Problema 4.3** Prolonga  $NA$  y  $MA$  hasta que corten de nuevo a la circunferencia en los puntos  $M'$  y  $N'$ , respectivamente. Observa que los arcos  $\widehat{M'N'}$  y  $\widehat{NM}$  tienen la misma longitud.

**Problema 4.4** Prolonga  $AP$  y  $AQ$  hasta intersectar a  $BC$ .

**Problema 4.5** Prolonga  $TM$  hasta cortar a la línea  $CD$ . Usa el triángulo rectángulo que se forma.

**Problema 4.6** Prolonga  $DA$  y  $CB$  hasta que se intersequen en un punto.

**Problema 4.7** Prolonga  $BM$  mas allá del punto  $M$  hasta un punto  $T$  tal que  $MT = MC$ . Demuestra que los triángulos  $\triangle BTC$  y  $\triangle AMC$  son congruentes.

**Problema 4.8** Prolonga el segmento  $XC$  hasta cortar de nuevo a la circunferencia en un punto  $T$ . Observa que  $CM$  es paralelo a  $YT$ .

**Problema 4.9** Prolonga el segmento  $BA$  más allá del punto  $A$  de manera que  $AT = AC$  ( $A$  queda en el segmento  $BT$ ). Demuestra que  $E$  es el circuncentro del triángulo  $\triangle BCT$ .

**Problema 4.10** Este problema aparece anteriormente como Problema 1.56. Prolonga las líneas  $PA$  y  $PB$  hasta que corten a la línea  $DC$ . Utiliza las semejanzas de triángulos.

**Problema 4.11** Prolonga el segmento  $BC$  hasta cortar a  $\Omega$  de nuevo en un punto  $T$ . Observa que el cuadrilátero  $ABOC$  es cíclico y entonces  $\angle COA = \angle ABT$ .

**Problema 4.12** Prolonga el segmento  $AD$  hasta un punto  $T$  tal que  $D$  es el punto medio de  $AT$ . Demuestra que los triángulos  $\triangle ACT$  y  $\triangle APM$  son congruentes.

**Problema 4.13** Prolonga el segmento  $CA$  hasta un punto  $T$  de manera que  $A$  sea el punto medio de  $TC$ . Observa que  $AD = \frac{1}{2}TB$ , entonces  $PQ = \frac{1}{2}TB$  si y sólo si  $TE = BE$ .

**Problema 4.14** Sea  $T$  el punto en el segmento  $AB$  de modo que  $BT = BC$ . Será suficiente con demostrar que  $TA = AD$ . Observa que el cuadrilátero  $ODCT$  es cíclico.

**Problema 4.15** Prolonga el segmento  $BT$  hasta que corte de nuevo a la circunferencia circunscrita a  $\triangle ABC$  en un punto  $P$ . Como  $AU = BP$ , solo falta demostrar que  $TP = TC$ .

**Problema 4.16** Prolonga el segmento  $AB$  hasta un punto  $T$  de modo que  $BT = BP$  y  $B$  esté en el segmento  $AT$ ; prolonga  $AQ$  hasta un punto  $R$  de modo que  $QR = QB$  y  $Q$  esté en el segmento  $AR$ . Demuestra que los triángulos  $\triangle APT$  y  $\triangle APR$  son congruentes y después demuestra que  $R = C$ .

**Problema 4.17** Ver sugerencia del Problema 1.33.

**Problema 4.18** Traza los segmentos  $AP$  y  $CQ$  perpendiculares a la diagonal  $BD$ , con  $P$  y  $Q$  sobre  $BD$ . Cada uno de los triángulos rectángulos que se obtienen se cubre con alguno de los círculos considerados.

**Problema 4.19** Traza el segmento perpendicular a  $BC$  desde  $A$  y observa los triángulos congruentes que se obtienen.

**Problema 4.20** Traza  $BT$  perpendicular a  $PD$  con  $T$  sobre  $PD$ . Observa los triángulos congruentes que se obtienen.

**Problema 4.21** Sea  $T$  el punto sobre la circunferencia de modo que el segmento  $TA$  es perpendicular a  $AB$ . Nota que  $TD = AC$ .

**Problema 4.22** Sea  $T$  el punto sobre la línea  $DC$  tal que  $BT$  es paralela a  $AC$ . Utiliza el triángulo rectángulo que se obtiene.

**Problema 4.23** Por  $O$  traza paralelas a los lados del triángulo. Se obtienen tres triángulos equiláteros más pequeños, utilízalos para comparar longitudes de segmentos.

**Problema 4.24** Traza líneas paralelas a los lados del triángulo a través del punto  $E$ .

**Problema 4.25** Traza líneas paralelas a  $CD$ ,  $FE$  y  $AB$  a través de los puntos  $B$ ,  $D$  y  $F$ , respectivamente. Con estas tres líneas se forma un triángulo. ¿Cómo es este triángulo?

**Problema 4.26** Ver sugerencia del Problema 1.71.

**Problema 4.27** Sea  $T$  el punto en el interior del triángulo equilátero de modo que  $\triangle STR$  es también un triángulo equilátero. Observa el triángulo  $\triangle PTN$ .

**Problema 4.28** Por  $M$  y  $N$  traza líneas paralelas a  $BC$  y  $AD$  respectivamente. Estas paralelas se cortan sobre la diagonal  $BD$ .

**Problema 4.29** Sean  $M$  y  $N$  los puntos tales que  $ACMN$  es un paralelogramo que contiene en su interior al punto  $D$ . Sea  $P$  el punto donde se cortan las diagonales del paralelogramo. Observa que los inradios de los triángulos  $\triangle APC$ ,  $\triangle CPM$ ,  $\triangle MPN$  y  $\triangle NPA$  son iguales. Si  $D$  no coincide con  $P$ , entonces está contenido en alguno de estos cuatro triángulos. Compara los inradios de los triángulos que se forman con  $D$  y los que se forman con  $P$ , en el paralelogramo.

**Problema 4.30** Considera el punto  $P$  dentro del triángulo de manera que  $\triangle A_1A_2P$  es equilátero. Después demuestra que el triángulo  $\triangle A_1B_1C_1$  es equilátero.

**Problema 4.31** Traza la tangente común por el punto de tangencia.

**Problema 4.32** Ver sugerencia del Problema 1.15.

**Problema 4.33** Traza la cuerda común  $AB$  y persigue ángulos inscritos.

**Problema 4.34** Traza la línea tangente a  $C_3$  paralela a  $CD$ . Si  $M$  es el punto de contacto de esta tangente con  $C_3$ , prueba que  $M$ ,  $C$  y  $A$  son colineales.

**Problema 4.35** Utiliza el resultado del problema anterior.

**Problema 4.36** Sea  $O_2$  el centro de la circunferencia  $\Gamma_2$ . Traza las tangentes comunes de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  y supongamos se cortan en un punto  $T$ . Supongamos  $B$  está más cerca de  $D$  que  $A$ . Usa que  $A$ ,  $C$ ,  $M$  son colineales y también la terna  $B$ ,  $D$ ,  $M$ . Después prueba que  $O_2$  es el incentro del triángulo  $\triangle CDT$ .

**Problema 4.37** Traza la cuerda común  $MN$ . Observa que  $M$  es el punto medio de  $PQ$ . Persigue ángulos para probar que  $EAMB$  tiene sus diagonales perpendiculares entre sí.

**Problema 4.38** Traza la línea  $MN$  y sea  $L$  el punto donde corta a  $AB$ . Prueba que los triángulos  $\triangle AML$  y  $\triangle BDO_2$  son semejantes.

**Problema 4.39** Sean  $M$  y  $L$  los puntos donde los rayos  $\overrightarrow{PE}$  y  $\overrightarrow{PF}$  cortan a la circunferencia  $\Gamma$ . Observa que  $EF$  es paralela a  $LM$  y prueba que  $AEIP$  es un cuadrilátero cíclico. También usa la potencia desde  $L$  con respecto a  $\Omega$ .

**Problema 4.40** Usa el resultado del problema anterior.

**Problema 4.41** Considera el punto  $P$  sobre la prolongación del lado  $BA$  más allá del punto  $A$  de manera que  $\angle TDA = \angle QDC$ .

**Problema 4.42** Lee el Ejemplo 1.4.5.

**Problema 4.43** Sea  $T$  el punto sobre el rayo  $\overrightarrow{AD}$  tal que el ángulo  $\angle ATC = \angle ABC$ . Nota que el cuadrilátero  $ABTC$  es cíclico.

**Problema 4.44** Considera el punto  $D'$  en el segmento  $BC$  tal que  $\angle BD'A = 120^\circ$ .

**Problema 4.45** Sean  $O_1$  y  $O_2$  puntos en el interior de la región que delimita el ángulo  $\angle ATB$ , donde  $T$  es el punto de intersección entre las líneas  $AD$  y  $BC$ , de modo que  $\triangle CO_1B$  y  $\triangle AO_2D$  son equiláteros. Prueba que  $O_1$  y  $O_2$  son los

circuncentros de  $\triangle ABC$  y  $\triangle ABD$ .

**Problema 4.46** La solución de este problema es análoga a la del Ejemplo 4.4.3.

**Problema 4.47** Sea  $D'$  el punto sobre el rayo  $\overrightarrow{AD}$  tal que  $AD' = 2AM$  y sea  $T$  el punto medio de  $AD$ . Observa que  $\angle BTD' = \angle MAC$ .

**Problema 4.48** Considera el punto  $N$  sobre el rayo  $\overrightarrow{BM}$  de modo que  $\angle NCB = 30^\circ$ .

**Problema 4.49** Sea  $N$  el punto sobre el rayo  $\overrightarrow{DK}$  tal que  $\angle DNC = \angle DAC$ . Observa que  $\triangle ANO$  es equilátero.

**Problema 4.50** Primero demuestra que también se cumple que  $\angle PCA = \angle QCB$ . Considera los puntos  $Q_C, Q_A, Q_B$ , reflejados de  $Q$  con respecto a los lados  $AB, BC, CA$ . Usa áreas de triángulos para calcular el valor de la expresión buscada.

**Problema 4.51** Sean  $S$  y  $T$  puntos tales que el segmento  $SP$  corta al segmento  $AB$  y  $\angle SPA = \angle ACB$  y  $\angle SAP = \angle BAC$ ; el segmento  $TP$  corta al segmento  $AC$  y  $\angle TPA = \angle CBA$  y  $\angle TAP = \angle BAC$ . Utiliza las semejanzas de triángulos que se obtienen y el Teorema de la Bisectriz.

**Problema 4.52** Traza el diámetro por  $X$  y considera el punto  $P$  donde corta al arco menor  $\widehat{AB}$ . Traza la circunferencia con centro en  $X$  y radio  $PX$ .

**Problema 4.53** Traza la circunferencia con centro en  $A$  y radio 5. Usa potencia desde  $C$ .

**Problema 4.54** Sea  $\triangle ABC$  el triángulo dado y sean  $M$  y  $D$  el punto medio y el pie de la altura desde  $A$  de modo que  $\angle BAM = \angle CAD$ . Traza la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABC$  y considera los puntos  $T$  y  $L$  donde las líneas  $AM$  y  $AD$  cortan de nuevo a la circunferencia.

**Problema 4.55** Traza la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle ABC$  y considera el punto  $L$  donde la línea  $AD$  corta de nuevo a la circunferencia. Usa la semejanza de los triángulos  $\triangle ABD$  y  $\triangle ALC$ .

**Problema 4.56** La demostración es análoga a la del problema anterior.



**Problema 4.57** Sea  $\ell$  la línea perpendicular a la pared que está a la altura de los ojos de la persona y sean  $A$  y  $B$  los extremos superior e inferior del cuadro. Traza la circunferencia que pasa por  $A$ ,  $B$  y es tangente a  $\ell$ .

**Problema 4.58** Traza la circunferencia que es tangente a los lados del ángulo y que pasa por  $P$ , de manera que el punto  $P$  queda contenido en el triángulo que tiene como vértices a los puntos de tangencia y a  $O$ .

**Problema 4.59** Traza la circunferencia circunscrita del triángulo  $\triangle ADE$ , llámale  $S$  y  $T$  a los puntos donde esta circunferencia corta a los lados  $AB$  y  $AC$ , respectivamente. Usa potencia desde  $B$  y desde  $C$  y prueba que  $ST$  es paralela a  $BC$ .

**Problema 4.60** Sea  $S$  el punto en  $AB$  tal que  $AS = AD$  y  $BS = BC$ . Traza la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle CDS$  y considera el segundo punto de intersección de ésta con  $AB$ .

**Problema 4.61** Traza la circunferencia circunscrita al cuadrilátero  $AKLM$  y considera el segundo punto de intersección de ésta con la línea  $BC$ . Prueba después que  $KT \parallel BN$  y  $MT \parallel CN$ .

**Problema 4.62** Traza la circunferencia circunscrita al triángulo  $\triangle PED$  y considera el segundo punto de intersección,  $T$ , de ésta con la línea  $AB$ . Usa la potencia desde  $F$  con respecto a las dos circunferencias (los puntos  $A$ ,  $E$ ,  $F$ ,  $B$ ,  $T$ , deben estar en ese orden sobre la línea). Nota que la posición del punto  $T$  no depende de la posición del punto  $P$ .



---

## Bibliografía

---

- [1] R. Bulajich, J. A. Gómez Ortega. (2002). *Geometría*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas. Instituto de Matemáticas de la UNAM.
- [2] R. Bulajich, J. A. Gómez Ortega (2002). *Geometría, ejercicios y problemas*, Instituto de Matemáticas de la UNAM
- [3] H.S.M.Coxeter (1988). *Introducción a la geometría*, LIMUSA.
- [4] H.S.M. Coxeter, Samuel L. Greitzer (1994). *Retorno a la geometría*, Euler Col. La tortuga de Aquiles.
- [5] H. Eves (1985). *Estudio de las geometrías*, UTEHA.
- [6] V. Gúsiev, V. Litvinenko, A. Mordkóvich (1989). *Prácticas para resolver problemas matemáticos*, *Geometría*, MIR-Moscú.
- [7] R. Honsberger (1995). *Episodes in nineteenth and twentieth century euclidean geometry*, The Mathematical Association of America.
- [8] A. Illanes Mejía (2001). *Principios de Olimpiada*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas. Instituto de Matemáticas de la UNAM.
- [9] I. Martin Isaacs (2002). *Geometría universitaria*, Thomson Learning.
- [10] Alfred S. Posamentier, Charles T. Salkind (1988). *Challenging problems in geometry*, Dover.

- [11] V. Prasolov, *Problems in plane and solid geometry*, translated and edited by D. Leites, <http://e.math.hr/afine/planeggeo.pdf>
- [12] I. Shariguin (1989). *Problemas de geometría, Planimetría*, Colección Ciencia Popular, MIR-Moscú.
- [13] Levi S. Shively (1984). *Introducción a la geometría moderna*, CECSA.

---

# Índice

---

## Ángulos

- alternos externos, 1
- alternos internos, 1
- centrales, 4
- correspondientes, 1
- inscritos, 4
- opuestos por el vértice, 1
- semi-inscritos, 4
- suplementarios, 1

Altura, 47

Baricentro, 64

Bisectriz, 35, 49, 50, 67

## Círculo

- circunscrito, 50

Catetos, 25

## Centro

- radical, 47

Centroide, 64, 65

ceviana, 85

Circuncírculo, 49, 77

Circuncentro, 40, 76

## Circunferencia

- circunscrita, 19, 32, 47, 49
- de Apolonio, 97
- inscrita, 30, 67

Circunradio, 40

## Cuadrilátero

- cíclico, 31, 39, 49
- inscrita, 50

## cuadrilátero

- circunscrito, 100

Diámetro, 50

## Eje

- radical, 46, 47, 119

## Fórmula

- de Brahmagupta, 54
- de Herón, 54

Gravicentro, 64

Hipotenusa, 24, 28

Incentro, 30, 67, 69

Inradio, 40, 43

## Línea

- de Euler, 92, 93
- de los centros, 48
- de Simson, 91
- secante, 44, 48
- tangente, 48

- Líneas
  - concurrentes, 51
  - isogonales, 94
- Ley
  - de Cosenos, 26
  - de Senos, 8, 52, 82, 150
  - del paralelogramo, 25
- Lugar geométrico, 27, 30
- Media
  - geométrica, 24, 35, 81
- Mediana, 63
- mediana, 13
- Mediatriz, 76
- Ortocentro, 47, 50
- Paralelogramo, 11
- Pentágono, 60
- Polígono
  - convexo, 3
- Potencia
  - de un punto, 43
- Proyección, 18, 50
- Punto
  - de Miquel, 36
- Radián, 4
- Reflexión, 38
- Simedias, 94
- Teorema
  - de Brianchon, 101, 126
  - de Carnot, 27, 81
  - de Casey, 43
  - de Ceva, 85
  - de Euler, 51, 81
  - de Haruki, 49, 129
  - de la Bisectriz, 144
  - de la bisectriz, 108, 115, 158
  - de Leibniz, 67
  - de los tapetes, 56
  - de Menelao, 85
  - de Miquel, 36
  - de Pitágoras, 24, 25
  - de Ptolomeo, 39, 127
  - de Steiner, 36
  - de Stewart, 28
  - de Tales, 10, 14, 63
  - de Thébault, 121
  - de Varignon, 11
  - generalizado de la bisectriz, 89
  - generalizado de Pitágoras, 60
- Trapezio, 22, 23, 60, 111
- Triángulos
  - congruentes, 17
  - rectángulos, 24
  - semejantes, 14, 24
- Triangulación, 43
- Triangulos
  - equiláteros, 17, 24